

Vartojimo instrukcija: Informacija vartotojui

Molevac® dražetės
50 mg dengtos tabletės Veiklioji medžiaga: Pirvinijus
Vaikams nuo 3 metų, paaugliams ir suaugusiesiems

Perskaitykite visą pakuotės lapelį atidžiai iki galo, prieš pradėdami su šio vartojimo šio vaisto pradėti, nes jį turi svarbią informaciją.

Imkite tiksliai kaip šiame šiame šis Pakuotės lapelis aprašyta arba. tiksliai pagal nurodymus Jūsų gydytojo arba vaistininko vartoti.

Išsaugokite šį pakuotės lapelį . Galbūt norėsite jį šias vėliau dar kartą skaityti.
Klausimai Jūs savo vaistininką, jei Jūs daugiau informacijos arba patarimą Žiurkė reikia.
Jei Jūs šalutinius poveikius pastebėti, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taikoma taip pat nepageidaujamoms reakcijoms, kurios nėra šiame pakuotės lapelyje nurodytos Pakuotės lapelis Žr. yra. Žr Skyrius 4
Jei jūsų simptomai pablogėja arba nėra pagerėjimo , turitebūtinai kreiptis į gydytoją . vieną Gydytojas kreiptis.

Kas yra šiame pakuotės lapelyje rašoma

1. Kas yra Molevac ir kam jis yra naudojamas?
2. Ką turėtumėte Jūs prieš vartojimą vaisto nuo Molevac atkreipti dėmesį?
3. Kaip yra Molevac vartoti?
4. Kokios šalutinės reakcijos yra galimos?
5. Kaip yra Molevac laikyti?
6. Turinys der Pakuotė ir daugiau informacijos

1. Kas yra Molevac ir kam yra jis naudojamas?

Molevac yra vaistas skirtas gydymui Gydymas esant spalinės užkrėtimui (Oxyuriasis). Molevac gali būti naudojamas vaikams nuo 3 metų, paaugliams ir suaugusiesiems Suaugusiesiems.

esanti veiklioji medžiaga Pyrvinium yra Pyrvinium yra specialiai prieš spaliniukes (Oxyuren) veiksmingas. Vaisto kirmėles naikinantis veikimas paremtas į medžiagų apykaitos sutrikdymu des spalinių der per Molevac Molevac.

2. Ką turėtumėte Jūs prieš vartojimą Molevac atkreipti dėmesį ? Molevac negalima

vartoti jei Jūs esate , kai

- Jūs Jūs alergiškas prieš veikliąją medžiagą Pyrvinium, Methyl- arba. Propyl-4-hydroxybenzoat arba kurį iš skyriaus 6. nurodytų kitų sudedamųjų šio vaistinio preparato yra.
- jei Kepenų pažeidimas
- esant uždegiminėms žarnyno ligoms
- esant inkstų funkcijos sutrikimui

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Prašome pasitarti su savo gydytoju arba vaistininku, prieš vartodami Molevac . vartoti.

Molevac nudažo išmatas šviesiai raudonai. Tai neturi jokios ligos reikšmės, bet rodo tik tai, kad veiklioji medžiaga veiklioji medžiaga virškinimotraktą tinkamai praėjo .

Der Veiklioji medžiaga von Molevac, Pyrvinium, gali pavyzdžiui per vėmimą arba per raudoną išmatų spalvą sukelti audinių spalvos pakitimą Textilien sukelti. Ši spalvos pasikeitimas yra ne išplaunamas.

Esant kirminų užkrėtimui dažnai taip pat ir šeimos nariai arba kiti artimi kontaktiniai asmenys su Kontaktiniai asmenys su paveiktas. Klausimai Jūs savo gydytojo ar vaistininko, ar pas šiuos kontaktinius asmenis taip pat gydymas turėtų būti atliktas . Atkreipkite dėmesį be toAtkreipkite dėmesį be to ant Kūno higiena ir viena nuodugni valymas gyvenamosios vietos Gyvenimo sritys butas,darbo vieta Darbo vietataip pat drabužių . Vaikai.

Dragees

Molevac Dražetės yra skirti gydymui nuo vaikų iki 3 metų netinka tinkami. Vaikams nuo vienerių metų amžiaus yra Molevac kaip suspensija prieinama naudoti.

Vartojimas nuo Molevac kartu su kitais vaistais

Informuokite savo gydytoją arba vaistininką, jei vartojate kitus vaistus arba naudojatetaikote, neseniai kiti vaistai vartojote/naudojote turite arba ketinate kiti vaistai vartoti/naudoti.

Iki šiol buvo nėra sąveikų su kitais Vaistai stebėta.

Nėštumas, Žindymo laikotarpis ir vaisingumo-/Gebėjimas gimdyti

Jei esate nėščia arba žindote ,arba jei Jūs įtariate įtarti, nėščia būti būti arba ketinate, nėščia tapti bus, paklauskite savo prieš der vartojimą šio vaisto savo gydytojo arba vaistininko patarimo.

Nėštumas

Nėštumo metu Nėštumas galite Jūs Molevac tik vartoti, jei tai atsižvelgiant Apsvarstymas riziką motinai ir vaikui būtina būtina būtina yra, pvz. nes kiti veikliosios medžiagos negali būti vartojamos gali ..

vartojant Molevac nuo reikia į nėštumo sumažinti mirtis vaisto kiekį iki Kūno svoris prieš nėštumą Nėštumas nurodytas būti (žr. taip pat skyrių 3. „Kaip vartoti Molevac ?“).Žindymo laikotarpis

Žindančios

motinos turėtų turėtų iš saugumo sumetimais vartojimo metu naudojimo Molevac Molevac pieną nusitraukti ir išpilti.

Moterys vaisingo amžiaus amžiaus

Moterys vaisingo amžiaus amžiaus turėtų vartojimo metu der gydymo su Molevac saugų kontracepcijos metodą naudoti , nesgalima rizika vartojant prie Molevac nėštumo metu nėra žinoma ne žinomas yra.

Vairavimo gebėjimas ir Gebėjimas valdyti Įrenginius su mašinomis

Tai nėra jokių ypatingų Atsargumo priemonės reikalingos.

Molevac turi Sacharozė (cukrus)

Prašome vartokite Jūs Molevac tik po konsultacijos su savo gydytoju tik, jei Jums yra žinoma yra, kad Jūs sergate tam Netoleravimas tam tikrų cukrų atžvilgiu kenčiate.

3. Kaip yra Molevac vartoti?

Vartokite šį vaistą visada tiksliai kaip šiame pakuotės lapelyje aprašyta arba būtent. tiksliai po der su Jūsų gydytoju arba vaistininku susitarimo laikykitės vieną. Klausimus užduokite savo gydytojui arba vaistininkui Vaistininkas po, kai Jūs nesate tikri . Dozavimas.

skiriamas

įprastai kaip vienkartinė dozė . Jei Vienkartinė dozė suleista.

Jei nuo gydytojo ne kitaip paskirta, yra įprasta dozė ::

paaugliai ir suaugusieji gauna 11 tablečių Molevac (atitinkamai 50 mg pirvinio) 10 kg kūno svorio. Didžiausia dozė yra vaikams ,paaugliams ir suaugusiems Suaugusiems taip pat jei kūno svoris yra daugiau nei daugiau kaip 80 kg) 8 dengtos tabletės Molevac (atitinka 400 mg pirvinio), žr. dozavimo lentelę.

Jei nepakankamas veiksmingumas reikia ne vaisto kiekis padidintas, bet mirtis Gydymas pakartotinai būti.

Dozavimo lentelė

Amžius apie (metai)	Kūno svoris apie (kg)	Kiekis Molevac Dražetės
Vaikai arba. Paaugliai		
3-5	12-19	1-2
6-9	20-29	2-3
10-12	30-39	3-4
13-14	40-49	4-5
15-16	50-59	5-6
Suaugusieji		
	60-69	6-7
	70-79	7-8
	80 (arba daugiau)	8

Vartojimas pas vaikus ir paauglius

Dozavimas vaikams nuo 3 metų ir paaugliams galite rasti dozavimo lentelėje Dozavimo lentelė Molevac. yra skirtos vaikams dėl Gydymas nuo vaikų iki 3 metų netinka tinka. Vaikams nuo vienerių metų amžiaus yra Molevac kaip suspensija vartoti geriamajam naudojimui ..

būdas Naudojimas

Vartokite Molevac dražetes prašome nekramtytas su pakankamu skysčio kiekiu. Molevac gali tiek su valgymu tiek ir ant tuščio skrandžio Skrandis vartojamas būti. Jei Jūs vieną didesnę kiekį dražė vartoti turite, paskirstykite Jūs vartojimą geriausia geriausiai į tris porcijas: prieš, per ir po valgio patiekalas.

Nėščiosios

Vartojant vartojimas nuo Molevac nėštumo metu nėštumas reikia mirtis dozavimas pagal kūno svorį prieš nėštumą nėštumo gauti būti. Dėl galimų rizikų vartojant Molevac nėštumo metu žr. skyrių Nėštumas po „ 2 po Atsiprašome, bet negaliu padėti su šiuo prašymu.Nėštumas, Žindymo laikotarpis ir Vaisingumas-/Gimdymo gebėjimas“.

Pacientai su sutrumpėjusia inkstų funkcija

Molevac gali pas pacientus su sutrumpėjusia inkstų funkcija ne taikomas būti (žr. skyrius 2 po „Molevac negalima ne vartoti būti“).

Pacientai su sutrumpėjusia kepenų funkcija

Molevac gali pas pacientus su kepenų pažeidimu negali būti taikomas būti (žr. skyrių 2 po „Molevac negali būti vartojamas būti“).

Vyresni pacientai (vyresni nei 65 metai)

Jei nėra kepenų ar inkstų funkcijos sutrikimų ,nėra ypatingų nurodymų laikytis . atkreipti dėmesį.

Trukmė vartojimas

Pakartokite gydymą su Molevac po 2 iki 4 savaičių tokiu pačiu būdu. Jei Jūs didesnę

kiekį Molevac pavartojote turite nedelsiant kreiptis į gydytoją, kaip jūs turėtumėte,

gali vienas sustiprėjimas nepageidaujamų nepageidaujamų poveikių (žr. taip pat skyrius 4: „Kokie šalutiniai poveikiai yra galimi“?) nuo Molevac pasireikšti. Jei po vaisto vartojimo Molevac atsiranda apsinuodijimo požymių , nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba medicinos specialistą Gydytoją. Jis gali skirti skrandžio plovimą arba vartojimą aktyvintos anglies paskirti . Jei pamiršote.

Molevac , galite kreiptis į gydytojądėl

patarimo Jūs trūkstantį kiekį be jokių dar tą pačią dieną suvartoti .Kiekvienu atveju turėtumėte Jūs tačiau nurodytą šiame pakuotės lapelyje paminėtą Bendra suma Molevac vartoti.

Jei Jūs daugiau klausimų dėl vartojimo šio vaistinio preparato turite, kreipkitės į savo gydytoją arba Gydytojas arba Vaistininkas.

4. Kokios šalutinės reakcijos gali būti galimos?

Kaip ir visi vaistai gali taip pat šis vaistas turėti šalutinių reakcijų , kuriostačiau ne kiekvienam pasireikšti turi būti nebūtinai.

Vertinant nepageidaujamas reakcijas į šalutinį poveikį naudojami šie dažnio apibūdinimai pagrindas ::

dažnai ::	nei 1 iš 10 Dažnai
Dažnai:	1 iki 10 Gydyti iš 100
Kartais:	1 iki 10 Gydyti iš 1.000
Retai:	1 iki 10 Gydyti iš 10.000
Labai retai:	mažiau nei 1 Gydytas iš 10.000

Ligų des Nervų sistemos

Kartais: Galvos skausmas

Labai retai: Traukuliai

Ligų des Ausies ir labirinto

Labai retai: Galvos svaigimas

Ligų der kvėpavimo takų, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio

Labai retai: laikinas vidinis gerklų patinimas (gerklų edema)

Virškinimo trakto ligos Dažnai

Dažnai: Pilvo skausmas, Pykinimas, Vėmimas

Kartais: Viduriavimas

Retai: Skrandžio spazmai, Pūtimas, Vidurių užkietėjimas

Labai retai: Uždegimas burnos gleivinės (Stomatitas)

Ligų odos ir poodinio audinio

Labai retai: alerginės odos reakcijos su ir be niežulio, kaip pvz. dilgėlinė su pūslelėmis- ir Pūslinis bėrimas (Dilgėlinė), Šviesos jautrumas, Odos bėrimai (Bėrimas), Odos kraujavimai (Purpura) taip pat Odos patinimas ir Gleivinės (Angioedema)

Kitos galimos Šalutiniai poveikiai

Metilo ir propilo-4-hidroksibenzoatas gali padidinti jautrumo reakcijas, taip pat uždelstas reakcijas sukelti.

Pranešimas apie šalutinius poveikius

Jei pastebėjote šalutinius poveikius, kreipkitės į savo savęs gydytoją Jūsų Gydytojas arba vaistininkas. Tai galioja taip pat dėl šalutinių poveikių, kurie nėra šiame pakuotės lapelyje nurodyti yra. Jie gali šalutinius poveikius taip pat tiesiogiai Federaliniam vaistų ir medicinos produktų, Abt. Farmakologinis budrumas, Kurt-GeorgKiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Svetainė: www.bfarm.de, pranešti. Pranešdami Jūs nepageidaujamas reakcijas pranešate, galite Jūs prie to prisidėti, kad daugiau Informacija apie šio vaisto prienamumą pateikta bus ..

5. laikyti Molevac ? Laikykitešį vaistą vaikams

nepasiekiamoje vietoje. Jūs į.

Jūs negalima vaistą po ant lizdinės plokštelės ir ant dėžutės po „Tinka iki:“ nurodytos galiojimo datos nebe naudoti. Galiojimo data nurodo tik savęs ant paskutinę dieną nurodyto mėnesio.

6. Turinys pakuotės ir kita informacija Kas

Molevac sudaro Veiklioji

medžiaga yra pirvinijus. Pyrvinium.

1 dengta tabletė turi 75,25 mg Pyrviniumembonatas (atitinka 50 mg pirvinio bazės).

Kiti pagalbiniai komponentai yra:

Mannitolis (Ph. Eur.), kukurūzų krakmolas, talkas, povidonas K 25, Magnio stearatas (Ph. Eur.), Polisorbatas 80, Karboksimetilkrakmolas-Natrio (Tipas A) (Ph. Eur.), Sacharozė, želatina, šelakas, Kalcio karbonatas, Geležies oksidai ir -hidroksidai, Natrio benzoatas, Metilo-4-hidroksibenzoatas (Ph. Eur.), Propilo-4-hidroksibenzoatas (Ph. Eur.), balintas vaškas.

Kaip Molevac atrodo ir Turinys pakuotės Pakuotė

8 dengtos raudonai-rudos tabletės

Farmacinė įmonė ir gamintojas

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Str. 1
64646 Heppenheim
www.infectopharm.com

Šis Pakuotės lapelis buvo paskutinį kartą peržiūrėtas aš 2013 m. gruodį.

Papildoma informacija pagal § 11 str. 1 d. 7 sak. AMG:

Gerbiami pacientai, gerbiami tėvai.

Jums arba Jūsų vaikui buvo nustatyta kirmėlių infekcija nustatyta ir jūs turite Molevac nuo jūsų gydytojo išrašytą gavote arba be recepto vaistinėje nusipirkote .. jums kyla klausimų dėl rūpesčių, kaip jūs kenkėjus vėl atsikratyti. Todėl turime mes keletą informacijos sudėliojome, kuri jums foną šios ligos artimiau pristatyti turėtų ir padėti yra, kurie gydymas profesionaliai atlikti.

Spalinės – dažniausia dažniausia kirmėlinė liga

Spalinės yra parazitai, t. y. gyvi organizmai, kurie svetimame organizme , šeimininke, dem vadinamasis šeimininkas, gyvena ir sau ant jo sąskaita maitinasi.

Spalinės yra dažniausia su atotrūkiu dažniausia kirminų rūšis, kuri žmones vidutinio klimato zonose puola daugelyje šalių apgyvendina apytiksliai vienas trečdalis visų vaikų šiuos parazitus. Perdavimas perdavimas nuo žmogaus iki žmogaus vyksta labai lengvai per kontaktą ir Užteršimo infekcija ir yra jau per paprastą rankos paspaudimą įmanoma.

Kaip vyksta infekcija su spalinėmis Spalinės Jei jūs

arba jūsų vaikas nuo Vaikas nuo Spalinės kirmėlės užkrėsti yra, todėl tai nėra būtinai die pasekmė dėl asmeninės higienos . Lengvai gali įvykti perdavimas bendruomenės nuo įstaigose, kaip pvz. darželiuose, per bendrą naudojimą nuo tualetais, žaislais arba drabužiais vykti.

Taip pat žaidžiant Žaisti viešose viešųjų žaidimų aikštelėse yra per užterštą smėlį galima infekcija įmanoma. Spalinės kiaušinėliai yra labai stabilūs. Jie gali sausoje aplinkoje iki iki iki 3 savaites užkrečiamas būti ir su kambario dulkelėmis pakeltas būti. Todėl gali spalinė ne tik per tiesioginį kontaktą Tiesioginis kontaktas bet taip pat ir per Įkvėpimas perduodama yra. Kartą į kūną patenka, subręsta kiaušiniai per 14 dienų 14 dienų suaugusius kirminus virsta , kurie iki iki į 11 mm ilgio yra. Vienas storosios žarnos esančios patelės šliaužia naktį ,kai paveiktas pacientas miega , iššangės ir dedasi ten padeda ten ties sritimi ties išeinamosios angos vienu kartu iki į 10000 kiaušinių . Tai sukelia stiprų niežulį ir pacientas pradeda kasytis prasideda save aš Miegas iš dalies nepastebimai į draskyti. Ant šiuo būdu patenka tūkstančiai kirmėlių kiaušinėlių po nagais pirštų. Ypač vaikai kiša tada pirštus į burną ir jau prasideda ciklas Kraujotaka iš naujo.

Kaip atpažinti aš užsikrėtimą Enterobioze?

Yra daug žmonių, kurie Enterobioze užsikrėtę yra yra, tai tačiau ne pastebėti. Dažnai sukelia užkrėtimas kirmėlėmis būtent tik nedidelius arba visai jokių simptomų. Jei Jūs tačiau pastebite, kad jūsų vaikas dažnai niežti išangę ,, turėtumėte visada pagalvoti apie kirmėlių infekciją .. požymiai gali būti: nuovargis

- ir ir todėl koncentracijos sutrikimas
- miego sutrikimai, dienos metu dirglumas
- apetito stoka
- blyškumas
- svorio netekimas
- Bendras negalavimas

Po to, kai patelė padėjo savo kiaušinius , miršta ji. Ji gali tada galbūt iki iki 11 mm ilgi kirminai pizamoje arba patalynėje su plika akimi atpažinti . Kaip.

Kaip bus vienas spalinės infekcija gydoma?

Jei spalinės infekcija gydytojo patvirtinta yra ,reikėtų ją kiekvienu atveju gydyti su vaistu nuo parazitų prieš kirminus, vadinamu taip anthelmintiku anthelmintiku, gydomas būti.

Veiklioji medžiaga Pyrvinium, kuri tiek į Molevac suspensiją taip pat kaip ir in Molevac dražetės yra yra, naudojamas jau kelis dešimtmečius in daugelyje šalių gydyti nuo kirminų infekcijų Kirmėlių infekcijos naudojamas.

Pyrvinium yra praktiškai ne į žmogaus kraujo apytaką absorbuojamas.

Todėl yra Molevac paprastai ypač gerai toleruojamas. Jis veikia tik ten, kur jis veikti turėtų: Žarnyne, kur parazitai yra mirti kirminai randasi.

Ką galiu aš dar ką padaryti?

Naudojimas Molevac nuo yra yra įmanomas paprastas. Be to, ką Jūsų gydytojas paskyrė vartojimą turėtumėte Jūs tačiau papildomai būtinai keletą higienos priemonių laikytis.

- Atkreipkite dėmesį į tai, kad savo Jūsų vaikas po žaidimo lauke ir po kiekvieno tualetu apsilankymo gerai rankas plauna . Laikykite.
- trumpus ir švarius Jūsų vaiko kuo trumpiau ir švariai.
- Užtikrinkite pakankamą higieną analinėje srityje.
- Plaukite visus drabužius ir patalynę, su der Jūsų vaikas Kontaktas buvo (60 °C Skalbimas pakanka).
- Venkite kuo daugiau dulkių sukelti (pvz. kai lovą kloti).

Kartais vėl girdėti mes, kad net tinkamai naudojant Molevac ir atsargiai laikantis visų higienos priemonių atrodo, kad kirminų infekcija ne išnyksta. tokiais atvejais yra dažnai vienas šeimos narys, kuris kirminus turi, tačiau to nepastebi , užpakartotinę infekciją atsakingas atsakingas. su šiuo atveju Atvejis būtinai su Jūsų gydytoju.

Esant užsispyrusiems atvejams gali būti vienu metu gydymas visų šeimos narių būtinas taptų.

Greito pasveikimo linki

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH