

Bruksanvisning: Informasjon for bruker

Molevac® Drageer
50 mg overtrukne tabletter Virkestoff: Pyrvinium
For barn fra 3 år, ungdom og voksne

Les hele pakningsvedlegget nøye gjennom, før du med den inntaket av dette legemidlet begynner, for den inneholder viktige informasjonen.

Ta dette legemidlet alltid nøyaktig som i denne Pakningsvedlegg beskrevet evt. nøyaktig etter anvisning legen din eller apotekeren en.

Oppbevar den pakningsvedlegget . Kanskje ønsker du disse senere igjen lese. Spørsmål du din apotek, hvis du ytterligere informasjon eller et råd trenger. Hvis du bivirkninger merk, kontakt legen deg til din lege eller apotek. Dette gjelder også for bivirkninger, som ikke er i denne pakningsvedlegget oppgitt er. Se Avsnitt 4 Hvis symptomene dine forverres eller ingen forbedring inntreffer ,må du på enhver måte oppsøke en lege ..

Hva i denne pakningsvedlegget står

1. Hva er Molevac og hva brukes det til?
2. Hva bør du før du tar av Molevac merk?
3. Hvordan er Molevac å ta?
4. Hvilke bivirkninger er mulige?
5. Hvordan er Molevac å oppbevare?
6. Innhold av Pakke og ytterligere informasjon

1. Hva er Molevac og hva brukes det til?

Molevac er en Midler til Behandling ved innvollsorminfeksjon (Oxyuriasis). Molevac kan brukes hos barn fra 3 år, ungdom og voksne Voksne.

Molevac inneholdte virkestoffet Pyrvinium er er spesielt mot barnemark (oxyurer) effektiv. Den ormdrepende effekten skyldes en forstyrrelse av metabolismen til barnemark gjennom Molevac Molevac.

2. Hva bør du før du tar fra Molevac vurdere?

Molevac skal ikke tas blihvis

- du Du allergisk mot den virkestoffet Pyrvinium, Methyl- henholdsvis. Propyl-4-hydroksybenzoat eller en av de i avsnitt 6. nevnte andre bestanddeler av dette legemidlet er.
- ved Leverskade
- ved inflammatoriske tarmsykdommer
- ved nyrefunksjonsforstyrrelse

Advarsler og forholdsregler

Vennligst snakk med legen din eller apoteket, før du tar Molevac ..

Molevac farger avføringen lyserød. Dette har ingen sykdomsverdi, men viser bare at at virkestoffet virkestoffet mage-tarm-kanalen korrekt passert har.

Den Virkestoffet av Molevac, Pyrvinium, kan for eksempel gjennom oppkast eller gjennom rød farging av avføringen til en misfarging av tekstiler føre. Disse misfargingen er ikke vaskbar.

Ved en orminfeksjon er ofte også de familiemedlemmene eller andre nære kontakter med berørt. Spørsmål du legen din eller apotekeren , om hos disse kontaktpersonene også en behandling utført bør bli. Vær oppmerksom i tillegg på Kroppshygiene og en grundig rengjøring av livsområdene (bolig, arbeidssted) samt klærne ..

Molevac

Dragees Drasjerte tabletter er for behandling av barn under 3 år ikke egnet. For barn fra en alder av 1 år finnes Molevac som suspensjon til gjengelig.

Inntak av Molevac sammen med andre legemidler

Informert deg legen din eller apoteket, hvis du andre legemidler tar/bruker, nylig andre legemidler inntatt/brukt har eller har til hensikt andre legemidler inntas/brukes.

Så langt har ingen interaksjoner med andre Legemidler observert.

Svangerskap, Amming og Fertilitet-/Reproduksjonsevne

Hvis du gravid er eller ammer, eller hvis du mistenker, gravid å være eller har til hensikt, gravid å bli, spør du før du tar dette legemidlet legen din Lege eller Apoteket for råd.

Graviditet

I graviditet kan du Molevac kun ta, hvis dette under hensyn til risikoen for mor og barn tvingende nødvendig er, f.eks. fordi andre virkestoffer ikke inntas kan tillates.

Ved bruk av Molevac under graviditet bør dosen medisinmengden til Kroppsvekt før den graviditet refereres til (se også avsnitt 3. "Hvordan er Molevac å ta?").

Amming

Ammende mødre bør av sikkerhetsgrunner under den bruk av Molevac melken pumpe ut og kaste.

Kvinner i fruktbar alder

Kvinner i fruktbar alder bør under den behandling med Molevac en sikker prevensjonsmetode anvende, da den mulige risikoen ved bruk av Molevac under graviditet ikke kjent er.

Kjøreevne og evne til å betjene maskiner

Det er ingen spesielle forholdsregler nødvendig.

Molevac inneholder sukrose (sukker)

Vennligst ta du Molevac først etter samtale med din lege en, hvis du vet at, du lider av en Intoleranse overfor bestemte sukkerarter lider.

3. Hvordan er Molevac å ta?

Ta dette legemidlet alltid nøyaktig som i denne pakningsvedlegget beskrevet eller. nøyaktig etter den med din lege eller apotek avtale avtale en. Spør du hos din lege eller apotek etter, hvis du deg ikke sikker er.

Dosering

Molevac blir i de fleste tilfeller som engangsdose administrert.

Hvis fra lege ikke annerledes foreskrevet, er den vanlige dosen:

Barn fra 3 år, Ungdom og Voksne får 1 drasjert tablett Molevac (tilsvarende 50 mg Pyrvinium) per 10 kg kroppsvekt. Den maksimale dosen er hos barn, ungdom og voksne (også ved en kroppsvekt på mer enn 80 kg) 8 overtrukne tabletter Molevac (tilsvarende 400 mg Pyrvinium), se doseringstabell.

Ved utilstrekkelig effekt skal ikke legemiddelmengden økes, men behandlingen Behandling gjentas bli.

Doseringstabell

Alder ca. (år)	Kroppsvekt ca. (kg)	Antall Molevac Drageer
Barn henholdsvis. Ungdom		
3-5	12-19	1-2
6-9	20-29	2-3
10-12	30-39	3-4
13-14	40-49	4-5
15-16	50-59	5-6
Voksne		
	60-69	6-7
	70-79	7-8
	80 (eller mer)	8

Bruk hos barn og ungdom

Doseringen hos barn fra 3 år og ungdom kan du finne i doseringstabellen Doseringstabell Molevac. er for de for de Behandling av barn under 3 år ikke egnet. For barn fra en alder av 1 år finnes Molevac som suspensjon til inntak til gjengelig.

Type bruk

Ta Molevac drageer vennligst uten å tygge med tilstrekkelig væske inn. Molevac kan både til et måltid også på tom mage Mage inntatt bli. Hvis du en større mengde drageer må ta må, fordel du inntaket inntak på best på tre porsjoner: før, under og etter måltidet ..

Ved

bruk av Molevac under graviditet bør doseringen tilpasses kroppsvekten til pasienten før svangerskapet graviditet relatert bli. Angående mulige risikoer ved bruk av Molevac under graviditet se avsnitt 2 under „Graviditet, amming og fruktbarhet-/evne til å føde“.

Pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Molevac skal hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon ikke anvendt bli (se avsnitt 2 under „Molevac må ikke tas bli“).

Pasienter med nedsatt leverfunksjon

Molevac må hos pasienter med leverskade ikke brukes bli (se avsnitt 2 under „Molevac må ikke tas bli“).

Eldre pasienter (over 65 år)

Såfremt ingen begrensning av lever- eller av nyrefunksjon foreligger, er ingen særegenheter å merke seg.

Varighet av bruk

Gjenta du behandlingen med Molevac etter 2 til 4 uker på samme måte. Hvis du

har tatt en større mengde av Molevac inntatt, som De bør,

kan en forsterkning av uønskede virkninger (se også avsnitt 4: „Hvilke bivirkninger er mulige“?) av Molevac oppstå. Skulle det etter inntak av Molevac tegn på forgiftning vise seg ,kontakt vennligst umiddelbart en en Lege på. Han kan en mageskylling eller inntak av medisinsk kull forårsake forårsake.

inntak av Molevac glemt har ,kan

kan du manglende mengde uten videre enda på samme dag inntas. I hvert tilfelle bør du men den i dette pakningsvedlegget nevnte Total mengde Molevac ta.

Hvis du ytterligere spørsmål om inntak av dette legemidlet har, kontakt legen din til din lege eller Apoteker.

4. Hvilke bivirkninger er mulige?

Som alle legemidler kan også dette legemidlet bivirkninger ha, men ikke hos alle oppstå må må.

Ved vurdering av bivirkninger blir følgende frekvensangivelser lagt til grunn ::

vanlig ::	enn 1 1 av 10 Vanlig
Hyppig:	1 til 10 Behandlede av 100
Av og til:	1 til 10 Behandlede av 1.000
Sjelden:	1 til 10 Behandlede av 10.000
Svært sjelden:	mindre enn 1 Behandlet av 10.000

Sykdommer i nervesystemet

Av og til: Hodepine

Svært sjelden: Kramper

Sykdommer i øret og labyrinten

Svært sjelden: Svimmelhet

Sykdommer i luftveiene, i brysthulen og mediastinum

Svært sjelden: forbigående indre strupeødem (larynksødem)

Sykdommer i mage-tarm-kanalen

Vanlig: Magesmerter, kvalme, Oppkast
Av og til: Diaré
Sjelden: Magekramper, Oppblåsthet, Forstoppelse
Svært sjelden: Betennelse i munnslimhinnen (Stomatitt)

Sykdommer i huden og underhudscellulært vev

Svært sjelden: allergiske hudreaksjoner med og uten kløe, som f.eks. elveblest med blemmer- og Vable (Urtikaria), Lysfølsomhet, Hudutslett (Rash), Hudblødninger (Purpura) samt Hevelse i huden og slimhinne (Angioødem)

Andre mulige bivirkninger

Metyl- og propyl-4-hydroksybenzoat kan overfølsomhetsreaksjoner, også senreaksjoner forårsake.

Rapportering av bivirkninger

Hvis du bivirkninger merker, kontakt du deg med legen din Lege eller Apotek. Dette gjelder også for bivirkninger, som ikke er i dette pakningsvedlegget oppgitt er. Du kan bivirkninger også direkte til Statens legemiddelverk for legemidler og medisinsk utstyr, Avd. Legemiddelovervåking, Kurt-GeorgKiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Nettsted: www.bfarm.de, vise. Ved å rapportere bivirkninger ,kan du bidra til at mer Informasjon om sikkerheten til dette legemidlet til disposisjon gitt bli.

5. Hvordan skal Molevac oppbevares?

Oppbevar dette legemidlet utilgjengelig for barn utilgjengelig .

De må legemidlet etter den på blisterpakningen og på ytteremballasjen etter „Brukes innen:“ angitte utløpsdato ikke lenger brukes. Utløpsdatoen utløpsdato refererer til på den siste dagen i angitte måned.

6. Innhold i pakken og ytterligere informasjon

Hva Molevac inneholder

Det virkestoffet er Pyrvinium.

1 drasjerte tablett inneholder 75,25 mg Pyrviniumembonat (tilsvarende 50 mg pyrvinium-base).

De andre bestanddelene er:

Mannitol (Ph. Eur.), maisstivelse, talkum, povidon K 25, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), Polysorbat 80, Karboksymetylstivelse-Natrium (Type A) (Ph. Eur.), Sukrose, Gelatin, Skjellakk, Kalsiumkarbonat, Jernoksider og -hydroksider, Natriumbenzoat, Metyl-4-hydroksybenzoat (Ph. Eur.), Propyl-4-hydroksybenzoat (Ph. Eur.), bleket voks.

Hvordan Molevac ser ut og Innhold av pakken

8 drasjerte rød-brunlige tabletter

Farmasøytisk virksomhet og produsent

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Str. 1
64646 Heppenheim
www.infectopharm.com

Disse Pakningsvedlegg ble sist revidert i desember 2013.

Transtoyou

Ytterligere opplysninger i henhold til § 11 ledd 1 setning 7 AMG:

Kjære pasienter, kjære foreldre.

Hos deg eller ditt barn ble orminfeksjon konstatert og du har Molevac fra din lege foreskrevet fått eller reseptfritt på apoteket kjøpt. Selvfølgelig gjør du deg bekymringer, hvordan du plageåndene igjen bli kvitt. Derfor har vi noen informasjoner satt sammen, som gir deg bakgrunnen for denne sykdommen nærmere forklare skal og hjelpe bli, som behandling fagmessig utføre.

Barneorminfeksjon – den vanligste ormesykdommen

Barneormer er parasitter, dvs. organismer, som i en fremmed organisme, den såkalte vert, lever og seg på dens bekostning ernærer.

Barneorm er den med avstand vanligste ormetypen, som mennesker i de tempererte klimasonene infiserer. I mange land huser anslagsvis en tredjedel av alle barn disse parasitter. Overføringen overføring fra menneske til menneske skjer svært lett gjennom smitte- og Smitte fra skitt og er allerede gjennom bare håndtrykk mulig.

Hvordan skjer en infeksjon med barnemark?

Hvis du eller ditt barn av Makkmark angrepet er, så er dette ikke nødvendigvis resultatet av dårlig personlig hygiene. Lett kan en overføring skje innenfor fellesanlegg

Fellesskapsfasiliteter, hvordan f.eks. barnehager, gjennom felles bruk av toaletter, leker eller klesplagg skje.

Også ved lek på offentlige lekeplasser er gjennom forurenset sand en infeksjon mulig.

Barneormegg er svært stabile. De kan i tørt miljø i opptil til 3 uker smittsom være og med det romstøv virvlet opp bli. Derfor kan den barnemark ikke bare gjennom direkte kontakt, men også gjennom Inhalasjon overført blir.

En gang i kroppen kommer, modnes eggene Egg innenfor 14 dager til voksne ormer utvikles, som kan bli til 11 mm lang blir. En i tykktarmen befinnende hunn kryper om natten, når den berørte pasienten sover, ut av anus og legger der i området av endetarmen på en gang til opptil 10000 egg av. Dette fører til en sterk kløe og pasienten begynner å klø Søvn delvis ubemerket til klø. På denne måten kommer tusenvis ormegg under neglene neglene. Spesielt Barn putter så fingrene i munnen og allerede begynner kretsløpet av på nytt.

Hvordan gjenkjenner jeg en småmarkinfeksjon?

Det finnes mange mennesker som er småmark infisert er, dette imidlertid ikke merke. Ofte forårsaker den orminfeksjonen nemlig bare liten eller ingen plager . Hvis du imidlertid merker ,, at seg ditt barn ofte ved anus klør, bør du alltid tenke på en orminfeksjon tenke. Andre tegn kan være:

- tretthet og derfor konsentrasjonsvansker
- søvnforstyrrelser, på dagtid irritabilitet
- manglende appetitt
- blekhet
- vekttap
- Generelt ubehag

Etter en hunn sine egg lagt har, dør den. De kan da eventuelt de til til 11 mm lange ormer i pyjamasen eller i sengetøyet med det blotte øye oppdages.

Hvordan blir en Måteorminfeksjon behandles?

Hvis en Måteorminfeksjon av lege bekreftet blir, bør den i hvert tilfelle med et legemiddel mot ormer, et så kalt anthelmintikum, behandles med.

Det aktive stoffet Pyrvinium, som både i Molevac suspensjon og også i Molevac Drageer inneholdt er, blir siden flere tiår i mange land til behandling av orminfeksjoner brukt. Pyrvinium blir praktisk ikke i menneskelig blodkretsløp opptatt. Derfor er Molevac vanligvis svært godt tolerert. Det virker bare der, hvor det virke skal: I tarmen, hvor befinner de ormene seg.

Hva kan jeg ellers gjøre? Bruken

av Molevac er Molevac er tenkelig enkel. Ved siden av den av din lege foreskrevne inntak bør du imidlertid i tillegg absolutt noen hygienetiltak følge.

- Pass på at, at seg Deres barn etter leken ute i friluft samt etter hver toalettbesøk grundig hendene vasker ..
- neglene rene Fingrene Deres barns så kort som mulig og ren.
- Sørg for tilstrekkelig hygiene i analområdet.
- Vask alle klær og sengetøy, med den Deres barn i kontakt var (60 °C vask er tilstrekkelig).
- Unngå De så langt som mulig å virvle opp støv (f.eks. når sengen rees).

Av og til høre vi, at selv ved korrekt bruk av Molevac og nøye overholdelse av alle hygienetiltak forsvinner orminfeksjonen tilsynelatende ikkeforsvinner slike tilfeller er ofte et familiemedlem, som ormer har, men dette ikke merker, for gjensmitte ansvarlig.

Snakk med dette Tilfelle absolutt med din lege.

Ved vedvarende forløp kan en samtidig behandling av alle familiemedlemmer nødvendig bli.

God bedring ønsker

INFECTOPHARM Legemidler og Consilium GmbH