

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

Molevac® drażetki

50 mg powlekane tabletki Substancja czynna: Pyrvinium
Dla dzieci od 3 lat, młodzieży i dorosłych

Przeczytaj całą ulotkę uważnie przez, zanim z przyjmowaniem tego leku rozpoczniesz ,ponieważ zawiera ważne informacje . Przyjmuj.

dokładnie tak jak w tej ten Ulotka opisane lub. dokładnie według instrukcji Twojego lekarza lub farmaceuty jeden.

Zachowaj tę ulotkę na przyszłość. Może chciałbyś ją te później ponownie przeczytać. Pytania Zapytaj swojego farmaceutę, jeśli potrzebujesz dalszych informacji lub porady Szczur potrzebujesz.

Jeśli działania niepożądane zauważyć, zwrócić się do swojego lekarza lub farmaceuty. To dotyczy również działań niepożądanych , które nie są wymienione w tej ulotce .

Zobacz wskazany są. Zobacz Sekcja 4

Jeśli się Twoje dolegliwości pogorszą lub nie nastąpi poprawa, musisz skonsultować się z każdym przypadku lekarzem . odwiedzić.

Co w tej ulotce jest

1. Co to jest Molevac i do czego jest stosowany ?Co
2. powinieneś zrobić przed przyjęciem tego leku ? Molevac zwrócić uwagę?
3. Jak jest Molevac przyjmować?
4. Jakie działania niepożądane są możliwe?
5. Jak jest Molevac przechowywać?
6. Zawartość opakowania Opakowanie i dalsze informacje

1. Co to jest Molevac i do czego jest stosowany ?Molevac

jest lekiem do leczenia do Leczenie przy zakażeniu owsikami (Oxyuriasis). Molevac może być stosowany u dzieci od 3 lat, młodzieży Młodzieży dorosłych Dorosłych.

Molevac to pyrwinium . Pyrwinium jest specjalnie przeciw owsikom (Oxyuren) skuteczny. Działanie przeciworobacze opiera się na zaburzeniu metabolizmu owsików przez Molevac der Owsiki przez Molevac.

2. Co powinieneś Ty przed przy przyjmowaniem leku Molevac zwrócić uwagę?

Molevac nie może być przyjmowany być,

- jeśli Ty alergiczny na substancję czynną Pyrvinium , Methyl- lub. Propyl-4-hydroksybenzoat lub na którykolwiek z punktu 6. wymienionych innych składników tego leku są.
- przy Uszkodzenie wątroby
- przy zapalnych chorobach jelit
- przy niewydolności nerek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Proszę porozmawiać z swoim lekarzem lub farmaceutą, zanim przyjmiesz Molevac ..

Molevac barwi stolec jasnoczerwony. To nie ma żadnej wartości chorobowej, lecz wskazuje jedynie na to, że substancja czynna przewód pokarmowy prawidłowo przeszła prawidłowo dzieje się ma.

Der Substancja czynna von Molevac, Pyrvinium, może na przykład przez wymioty lub przez czerwone zabarwienie kału prowadzić do odbarwienia tkanin prowadzić do prowadzić. Te przebarwienie jest nie zmywalne.

W przypadku zarażenia robakami często również członkowie rodziny lub inne bliskie osoby kontaktowe są dotknięty. Pytania Zapytaj swojego lekarza lub farmaceuty, czy u tych osób kontaktowych również należy przeprowadzić leczenie . Zwróć uwagę również ponadto na higienę osobistą i dokładne czyszczenie obszarów życia (mieszkanie ,miejsce pracy) oraz dzieży . Dzieci Molevac.

Dzieci

Molevac Drażetki są dla leczenia dzieci poniżej 3 lat nie odpowiednie. Dla dzieci od jednego wieku 1 roku dostępny Molevac jako zawiesina do dyspozycji.

Przyjmowanie z Molevac razem z innymi lekami

Poinformuj swojego lekarza lub farmaceutę, jeśli przyjmujesz inne leki lub stosujesz/stosowałeś, ostatnio inne leki przyjmowane/stosowane mają lub zamierzają inne leki przyjmować/stosować.

Dotychczas nie stwierdzono żadnych interakcji z innymi Lekami obserwowane.

Ciąża, Karmienie piersią i Płodność-Zdolność rozrodcza

Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią ,lub jeśli podejrzewasz że jesteś, w ciąży być lub zamierzasz, w ciąży zajść zostaną, zapytaj swojego przed przyjęciem tego leku swojego lekarza lekarz lub farmaceuty o poradę.

Ciąża

W ciąży można Pani Molevac tylko przyjmować, jeśli to z uwzględnieniem ryzyka dla matki i dziecka absolutnie konieczne jest jest, np. ponieważ inne substancje czynne nie przyjmowane mogą być.

Podczas stosowania leku Molevac w ciąży należy ilość leku do Masa ciała przed ciążą Cięża odnosić się być (patrz również rozdział 3. „Jak jest Molevac stosować?“).

Okres karmienia piersią

Karmiące matki powinny z powodów bezpieczeństwa podczas stosowania Molevac mleko odciągać i wylewać . Kobiety.

wieku rozrodczym jestem Kobiety w

wieku rozrodczym w Kobiety w powinny podczas leczenia Molevac stosować Molevac bezpieczną metodę antykoncepcji , ponieważ możliwe ryzyko przy stosowaniu Zastosowanie Molevac w ciąży nie nie znany jest.

Zdolność do prowadzenia pojazdów i zdolność do obsługiwanie maszyn

Nie są żadne szczególne środki ostrożności wymagane.

Molevac zawiera sacharozę (cukier)

Proszę przyjmować Pan/Pani Molevac dopiero po konsultacji z swoim lekarzem lek, jeśli Panu/Pani wiadomo jest, że Pan/Pani cierpi na Nietolerancja wobec określonych cukrów cierpią.

3. Jak jest Molevac przyjmować?

Przyjmuj ten lek zawsze dokładnie tak jak w tej ulotce opisano. dokładnie po der z Twoim lekarzem lub farmaceutą ustalonej umowie jeden. Pytaj Ty u Twojego lekarza lub farmaceuty po, jeśli Pan/Pani się nie pewny/pewna jest.

Dawkowanie

Molevac jest w większości przypadków jako jednorazowa dawka podawany.

Jeśli od lekarza nie inaczej przepisane, jest zwykła dawka ::
młodzież Młodzież dorośli otrzymują 1 1 tabletkę Molevac (odpowiednio 50 mg pyrwinium) na 10 kg masy ciała. Dawka maksymalna wynosi u dzieci, młodzieży i dorosłych (również u osób o masie ciała powyżej więcej niż 80 kg) 8 powlekane tabletki Molevac (odpowiadający 400 mg pyrwinium), zobacz tabela dawkowania.

W przypadku niewystarczającej skuteczności nie należy zwiększać ilości leku zwiększać, lecz die Leczenie powtarzać się.

Tabela dawkowania

Wiek ok. (lata)	Masa ciała ok. (kg)	Liczba Molevac drażetki
Dzieci lub. Młodzież		
3-5	12-19	1-2
6-9	20-29	2-3
10-12	30-39	3-4
13-14	40-49	4-5
15-16	50-59	5-6
Dorośli		
	60-69	6-7
	70-79	7-8
	80 (lub więcej)	8

Zastosowanie u dzieci i młodzieży

Dawkowanie u dzieci od 3 lat i młodzieży można znaleźć w tabeli dawkowania Tabela dawkowania Molevac. są dla dzieci dla Leczenie dzieci dzieci poniżej 3 lat nie odpowiednie. Dla dzieci od jednego roku życia dostępny Molevac jako zawiesina do spożycia dostępna ..

stosowania Zastosowanie

Przyjmuj Molevac drażetki proszę bez rozgryzania z wystarczającą ilością płynu popić.

Molevac może zarówno podczas posiłku jak i na czczo na czczo Żołądek przyjmowane być.

Jeśli większą ilość drażetek przyjmować musicie ,rozłóżcie przyjmowanie najlepiej na trzy porcje : trzy Porcje: przed, podczas i po posiłku Posiłtek.

Kobiety w ciąży

Podczas stosowania leku Molevac w ciąży należy dawkowanie dostosować do masy ciała Masa ciała przed ciążą ciąża odniesione być. Odnośnie możliwych ryzyk przy stosowaniu Molevac w ciąży zob. rozdział 2 2 „ „Ciąża, okres karmienia piersią i płodność-/zdolność rozrodcza”.

Pacjenci z upośledzoną funkcją nerek

Molevac nie może być stosowany u pacjentów z upośledzoną funkcją nerek nie stosowany być (zob. rozdział 2 pod „Molevac nie wolno przyjmować być”).

Pacjenci z upośledzoną funkcją wątroby

Molevac może u pacjentów z uszkodzeniem wątroby nie być stosowany być (zob. rozdział 2 w „Molevac nie może być przyjmowany być”).

Starsze pacjenci (powyżej 65 lat)

Jeżeli nie ma ograniczenia funkcji wątroby lub funkcji nerek występuje, nie ma szczególnych do uwzględnienia.

Czas trwania stosowania

Powtórz leczenie z Molevac po 2 do 4 tygodni w ten sam sposób. Jeśli

przyjąłeś większą ilość Molevac niż powinieneś mieć, jako Pan(i) powinien/powinna,

może jedno wzmocnienie niepożądanych działań (zob. również rozdział 4: „ Jakiedziałania niepożądane są możliwe “Przepraszam, nie mogę pomóc w tym zadaniu.?) von Molevac wystąpić. Jeśli pojawiają się po zażyciu Molevac oznaki zatrucia , proszę niezwłocznie skontaktować się zlekarzem lub udać się do szpitala . Lekarza. On może przeprowadzić płukanie żołądka lub zalecić przyjmowanie węgla aktywowanego . Jeśli zapomnisz.

Molevac , możesz kontynuować przyjmowanie lekuzgodnie

z planem Sie die brakującą ilość bez dalszych jeszcze w tym samym dniu przyjąć. W każdym przypadku powinni Państwo jednak dawkowanie w tej ulotce wymienione Całkowita ilość Molevac przyjmować.

Jeśli masz dalsze pytania dotyczące przyjmowania tego leku masz, skontaktuj się z Twoim lekarzem lub lub Farmaceuta.

4. Jakie działania niepożądane są możliwe?

Jak wszystkie leki może również ten lek działania niepożądane mieć, które jednak nie u każdego wystąpić muszą.

Przy ocenie działań niepożądanych stosuje się następujące określenia częstości jako ::

często :: niż 1 1 na 10 Często
Często: 1 do 10 Leczeni z 100

Sporadycznie: 1 do 10 Leczeni z 1.000
Rzadko: 1 do 10 Leczeni z 10.000
Bardzo rzadko: mniej niż 1 Leczony z 10.000

Choroby układu nerwowego
Czasami: Bóle głowy
Bardzo rzadko: Drgawki

Choroby ucha i błędnika Bardzo
rzadko : Zawroty głowyZawroty głowy

Choroby dróg oddechowych, klatki piersiowej i śródpiersia
Bardzo rzadko: przejściowy obrzęk krtani (obrzęk krtani)

Choroby przewodu pokarmowegoCzęsto
Często: Bóle brzucha, nudności, wymioty
Czasami: biegunka
Rzadko: skurcze żołądka, wzdęcia, zaparcia
Bardzo rzadko: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (Stomatitis)

Choroby skóry i tkanki podskórnej
Bardzo rzadko: alergiczne zmiany skórne z i bez świądu, takie jak np. pokrzywka z pęcherzykami- i Tworzenie się bąbli (Pokrzywka), Nadwrażliwość na światło, Wysypki skórne (Rash), Krwawienia skórne (Purpura) oraz Obrzęk skóry i błon śluzowych (Obrzęk naczynioruchowy)

Inne możliwe działania niepożądane
Metylu i propylu 4-hydroksybenzoesan mogą reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje późne wywoływać.

Zgłaszanie z działań niepożądanych

Jeśli działania niepożądane zauważysz, skontaktuj się z swoim lekarzem lekarz lub farmaceuta. Dotyczy to również dla działań niepożądanych, które nie są wymienione w tej ulotce wskazane są. Możesz zgłaszać działania niepożądane również bezpośrednio do Federalnego Instytutu ds. Leków i Produktów Medycznych, Abt. Farmakowigilancja, Kurt-GeorgKiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, zgłaszać. Zgłaszając Państwo działania niepożądane ,mogą Państwo w ten sposób przyczynić się ,aby więcej więcej Informacje o bezpieczeństwie tego leku do dostępne zostaną ..

5. przechowywać Molevac ? Przechowujten lek w miejscu

niedostępnym dla dzieci. Oni na.

Ty nie wolno leku po dacie na blistrze i na kartoniku po „Termin ważności do:” podanej dacie ważności nie więcej używać. Data ważności odnosi się na ostatni dzień wskazanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i dalsze informacje Co

Molevac zawiera Substancją czynną jest Pyrvinium. Pyrwinium.
1 powlekana tabletką zawiera 75,25 mg Pyrviniumembonat (odpowiadający 50 mg bazy pyrwinium).

Pozostałe składniki to ::
skrobia kukurydziana ,talk ,povidon Powidon K 25, Stearynian magnezu (Ph. Eur.), Polisorbat 80, Karboksymetyloskrobia-sodu (Typ A) (Ph. Eur.), Sacharoza, Żelatyna, Szelak, Węglan wapnia, Tlenki żelaza i wodorotlenki, Benzoesan sodu, Metyl-4-hydroksybenzoesan (Ph. Eur.), Propyl-4-hydroksybenzoesan (Ph. Eur.), Bielony wosk.

Jak Molevac wygląda i Zawartość opakowania opakowania

8 powlekane czerwono-brązowe tabletki

Przedsiębiorstwo farmaceutyczne i Producent

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Str. 1
64646 Heppenheim
www.infectopharm.com

To Ulotka dołączona do opakowania została ostatnio zaktualizowana w grudniu 2013.

Dalsze informacje zgodnie z § 11 ust. 1 zdanie 7 AMG:

Drodzy pacjenci, drodzy rodzice.

U Państwa lub u Państwa dziecka zostało stwierdzone zakażenie robakami stwierdzono i Pan ma Molevac od swojego lekarza przepisane otrzymał lub bez recepty w aptece kupione. Oczywiście robią Pan się martwi, jak Państwo szkodniki ponownie pozbyć się. Dlatego mamy my kilka informacji zebraliśmy, które Państwu tło tej choroby bliżej przedstawić powinny i pomóc są, które leczenie fachowo przeprowadzić.

owsica – najczęstsza choroba pasożytnicza

owsiki są pasożytami, tzn. organizmami, które w obcym organizmie, żywicielu, dnia tak zwanym gospodarzu, żyją i się na jego koszt odżywiają.

Owsiki są najczęstszym z odstępem najczęściej Rodzaj brodawki, które atakują ludzi w umiarkowanych strefach klimatycznych zarażają. W wielu krajach goszczą szacunkowo jedna trzecia wszystkich dzieci te pasożyty. Przenoszenie przenoszenie od człowieka do człowieka odbywa się bardzo łatwo przez kontakt bezpośredni i Zakażenie brudem i jest już przez zwykłe podanie ręki możliwe.

Jak następuje zakażenie owsikami? Jeśli Ty lub

Twoje dziecko Twój cierpi na Owsiki zarażone są, więc jest to nie koniecznie skutek niedostatecznej higieny osobistej. Łatwo może dojść do przeniesienia w obrębie placówek społecznych . z

Obiekty wspólne, jak np. przedszkola, przez wspólne użytkowanie z toalet, zabawek lub ubrań nastąpić.

Również podczas zabawy na publicznych placach zabaw jest przez zanieczyszczony piasek możliwe zakażenie .. są bardzo stabilne . Onemogą w suchym środowisku do do 3 tygodnie zaraźliwy być i z kurzem pokojowym wzniecony być. Dlatego może owsik nie tylko przez bezpośredni kontakt Bezpośredni kontaktale również także przez Wdychanie przenoszone są. Raz do organizmu dostaje się, dojrzewają jaja wewnątrz w ciągu 14 dni do dorosłych robaków rosną , które mogą osiągnąć do 11 mm długości są. Jedna w okrężnicy znajdująca się samica pełza nocą, gdy pacjent dotknięty śpi ,z odbytu i składa tam tam w obszarze odbytu odbytu na raz do do 10000 jaj . To prowadzi do silnego świądu świądu i pacjent zaczyna się w Sen częściowo niezauważony do drapać. Na tym sposobie dostają się tysiące jaj robaków pod paznokcie u rąk. Szczególnie dzieci wkładają następnie palce do ust i już zaczyna się krążenie od nowa.

Jak rozpoznać mam zakażenie owsikami?

Istnieje wiele osób, które są zarażone owsikami dotknięty są, dies jedoch nie zauważyć.

Często powoduje zakażenie pasożytami bowiem tylko niewielkie lub wcale żadnych dolegliwości. Jeśli jednak zauważysz, że się Twoje dziecko często w okolicy odbytu drapie, powinieneś zawsze myśleć o zakażeniu pasożytami .. objawy mogą być: zmęczenie

- i dlatego osłabienie koncentracji
- zaburzenia snu, w ciągu dnia drażliwość
- brak apetytu
- bladość
- utrata masy ciała
- ogólne złe samopoczucie

Po samica swoje jaja złożyła , umiera . Ona es ab. Ona mogą następnie ewentualnie do do 11 mm długie robaki w pizamie lub w pościeli gołym okiem rozpoznać ..

jest stosowany jeden zakażenie owsikami leczony?

Jeśli zakażenie owsikami przez lekarza potwierdzone zostanie, należy je w każdym przypadku za pomocą leku przeciwpasożytniczego przeciw robakom, takim zwanym antyhelmintykiem Środek przeciworobaczyeczony być ..

czynna Pyrvinium, która zarówno w Molevac zawiesinie jak również również w Molevac drażetki zawarty jest, jest stosowany od kilku dekad w wielu krajach do leczenia zakażeń robakami stosowany.

Pyrvinium jest praktycznie nie w ludzkim krwiobiegu wchłaniany.

Dlatego jest Molevac zazwyczaj wyjątkowo dobrze tolerowany. Działa tylko tam , gdzie ma działać działać powinien: W jelicie, gdzie znajdują się te robaki znajdują.

Co mogę zrobić jeszcze coś zrobić?

Stosowanie leku Molevac jest możliwy prosty. Oprócz przepisanej przez Twojego lekarza zaleconego przyjmowania powinni Państwo jednak dodatkowo koniecznie kilka środków higienicznych przestrzegać.

- Zwróć uwagę na to, że się Twoje dziecko po zabawie na dworze oraz po każdym wyjściu do toalety dokładnie myje ręce ..
- paznokcie krótkie i czyste Twojego dziecka możliwie krótko i czysto.
- Zadbaj o wystarczającą higienę w okolicy odbytu.
- Umyj wszystkie ubrania i pościel, z der Twój dziecko w Kontakt było (60 °C pranie wystarczy).
- Unikaj jak najbardziej unoszenia kurzu (np. przy ścieleniu łóżka).

Od czasu do czasu słyszeć my, że nawet przy prawidłowym stosowaniu z Molevac i starannym przestrzeganiu wszystkich zasad higieny die infekcja pasożytnicza pozornie nie znika. W takich przypadkach jest często członek rodziny, który nosicielem robaków, ale tego nie zauważa, za ponowne zarażenie.

. Porozmawiaj tym Przypadek koniecznie z Twoim lekarzem.

W przypadku uporczywych przebiegów może być jednoczesne leczenie wszystkich członków rodziny konieczne być.

Szybkiego powrotu do zdrowia życzy

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH