

Informații despre utilizare: Informații pentru utilizator

Molevac® Drageuri
50 mg filmate Comprimate Substanța activă: Pyrvinium
Pentru copii de la 3 ani, adolescenți și adulți

Citiți întregul prospect cu atenție până la capăt, înainte de a cu al administrarea acestui medicament începeți, deoarece ea conține informații importante.

Luați acest medicament întotdeauna exact așa cum în acest Prospect descris sau. exact conform instrucțiunilor medicului dumneavoastră sau farmacistului un.

Păstrați prospectul medicamentului la îndemână. Poate doriți să acestea mai târziu din nou citiți.

Întrebări întrebați farmacistul dumneavoastră farmacist, dacă aveți informații suplimentare sau un sfat aveți nevoie ..

efecte secundare Efecte secundare observați, adresați vă la un medicul dumneavoastră sau farmacist. Acest lucru este valabil și pentru efecte secundare, care nu sunt menționate în acest prospect indicate .. Vezi Secțiunea 4

Dacă se simptomele dumneavoastră se agravează sau nu apare nicio îmbunătățire, trebuie să consultați în orice caz un medic imediat.

Ce este acest prospect conține

1. Ce este Molevac și pentru ce se utilizează ?Ce
2. ar trebui să faceți înainte de administrare a Molevac observați?
3. Cum este Molevac de administrat?
4. Ce efecte secundare sunt posibile?
5. Cum este Molevac de păstrat?
6. Conținutul al Ambalaj și informații suplimentare Informații

1. Ce este Molevac și pentru ce se utilizează ?Molevac

este un medicament pentru tratamentul Tratament la infestare cu oxiuri (Oxiuriază). Molevac poate fi utilizat la copii de la 3 ani, adolescenți și adulți Adulți.

Molevac conținută substanță activă Pyrvinium este este special împotriva oxiurilor (Oxyuren) eficace. Efectul vermifug se bazează pe o perturbare a metabolismului al oxiurilor prin Molevac Molevac.

2. Ce ar trebui să faceți înaintea administrării de Molevac să aveți în vedere?

Molevac nu trebuie să fie administrat a fi,

- dacă dumneavoastră alergic la pe substanța activă Pyrvinium, Methyl- sau. Propyl-4-hidroxibenzoat sau unul dintre secțiunea 6. menționate alte componente acestui medicament sunt.
- la Afectare hepatică
- în cazul bolilor inflamatorii intestinale
- în cazul disfuncției renale

Atenționări și precauții

Vă rugăm discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul , înainte de a lua Molevac ..

Molevac colorează scaunul roșu deschis. Acest lucru nu are niciun semnificație patologică, ci indică doar că substanța activă a traversat tractul gastro-intestinal în mod corespunzător și a trecut .

Der Substanța activă von Molevac, Pyrvinium, poate de exemplu prin vărsături sau prin colorare în roșu a scaunului duce la o decolorare a textilelor. Acest decolorare este nu lavabilă.

În cazul unei infestări cu viermi sunt adesea și membrii familiei sau alte persoane apropiate infectate afectat. Întrebați pe medicul dumneavoastră sau farmacistul, dacă la aceste persoane de contact de asemenea un tratament efectuat ar trebui să fie. Aveți grijă în plus pe igiena corporală și o curățare temeinică a spațiilor de locuit (locuință, locul de muncă) precum și a îmbrăcămintei.

Copii

Molevac Dragees sunt pentru tratamentul copiilor sub 3 ani nu sunt potrivite . Pentru copiii de lavârsta de 1 an este disponibil Molevac sub formă de suspensie la dispoziție ..

de de la Molevac împreună cu alte medicamente

Informați pe medicul dumneavoastră sau farmacistul, dacă luați alte medicamente sau utilizați, recent recent alte medicamente luat/utilizat aveți sau intenționați alte medicamente a lua/a utiliza.

Până acum au fost niciun interacțiuni cu alte Medicamente observat.

Sarcină, Alăptare și Fertilitate-/Capacitate de reproducere

Dacă sunteți însărcinată sau alăptați ,sau dacă dumneavoastră bănuți bănuți, însărcinată să fii sau intenționați, însărcinată să deveniți, întrebați pe înainte de administrarea acestui medicament medicul dumneavoastră sau farmacist pentru sfat.

Sarcină

În timpul sarcinii aveți voie să Molevac doar să luați, dacă acest lucru luând în considerare riscul pentru mamă și copil absolut necesar necesar este, de ex. pentru că alte substanțe active nu administrate pot fi.

În timpul utilizării de Molevac în sarcină trebuie cantitatea de medicament la Greutatea corporală înainte de sarcină se referă a fi (vezi de asemenea Secțiunea 3. „Cum se administrează Molevac ?”).Perioada de alăptare

Mamele care alăptează

ar trebui să evite din motive de siguranță în timpul al utilizării de Molevac laptele să fie pompat și aruncat.

Femeile de vârstă fertilă Vârstă

Femeile de vârstă fertilă Vârstă ar trebui în timpul al tratamentului cu Molevac o metodă sigură de contracepție utilizați deoarece posibilul risc la utilizarea de Molevac în timpul sarcinii cunoscut este.

Capacitatea de a conduce vehicule și abilitatea de a opera mașini

Nu sunt necesare măsuri de precauție speciale.

Molevac conține zaharoză (zahăr)

Vă rugăm luați dumneavoastră Molevac doar după consultare cu medicul dumneavoastră un, dacă vă este cunoscut că, că dumneavoastră suferiți de o Intoleranță față de anumite zaharuri suferiți.

3. Cum este Molevac de administrat?

Luați acest medicament întotdeauna exact așa cum în acest prospect descris sau. exact conform al cu medicul dumneavoastră sau farmacistul stabilită înțelegere un. Întrebați pe medicul dumneavoastră sau farmacistul Farmacist după, când dumneavoastră vă nu sigur sunteți.

Dozare

Molevac este în toate cazurile ca administrare unică administrat.

Dacă de către medicul nu altfel prescris, este doza uzuală Doza:

Copii de la 3 ani, Adolescenți și Adulți primesc 1 comprimat filmat Molevac (corespunzător 50 mg Pyrvinium) per 10 kg greutate corporală. Doza maximă este la copii, adolescenți și adulți (chiar la o greutate corporală de mai mult de 80 kg) 8 acoperite comprimate Molevac (corespunzător 400 mg Pyrvinium), vezi tabelul de dozare.

În caz de eficacitate insuficientă nu trebuie să fie cantitatea de medicament crescută, ci să fie Tratament repetat a fi.

Tabel de dozare

| Vârstă aprox. (ani) | Greutate corporală aprox. (kg) | Număr Molevac Drageuri |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Copii sau. Adolescenți | | |
| 3-5 | 12-19 | 1-2 |
| 6-9 | 20-29 | 2-3 |
| 10-12 | 30-39 | 3-4 |
| 13-14 | 40-49 | 4-5 |
| 15-16 | 50-59 | 5-6 |
| Adulți | | |
| | 60-69 | 6-7 |
| | 70-79 | 7-8 |
| | 80 (sau mai mult) | 8 |

Utilizare la copii și adolescenți

Doza la copii de la 3 ani și adolescenți poate fi găsită în tabelul de dozare Tabel de dozare Molevac. sunt pentru copii pentru Tratament de copii sub 3 ani nu este adecvat. Pentru copii de la vârsta de 1 an este disponibil Molevac ca suspensie pentru administrare la dispoziție.

Mod de administrare

Luați Molevac drajeuri vă rog fără a mesteca cu suficient lichid împreună. Molevac poate atât la o masă cât și pe stomac gol Stomac luat fi. Dacă un mai mare cantitate drajeuri luați trebuie, distribuiți administrarea pe cale orală cel mai bine în trei porții :: înainte, în timpul și după masa mesei.

Gravide

În timpul utilizării de Molevac în sarcină trebuie să fie dozajul ajustat la greutatea corporală înainte de sarcină obținut fi. Referitor posibile riscuri la utilizarea de Molevac în sarcină vezi secțiunea 2 sub „Sarcină, alăptare și fertilitate-/capacitate de reproducere”.

Pacienți cu funcție renală redusă

Molevac nu trebuie la pacienți cu funcție renală redusă nu utilizat fi (vezi Secțiunea 2 sub „Molevac nu trebuie administrat fi”).

Pacienți cu funcție hepatică redusă

Molevac poate la pacienți cu afectare hepatică nu fi utilizat trebui (vezi secțiunea 2 sub „Molevac poate nu fi administrat trebui”).

Vârșnici Pacienți (peste 65 de ani)

În cazul în care nu există restricții ale funcției hepatice sau ale funcției renale nu există, nu sunt necesare măsuri speciale de luat în considerare.

Durata aplicării

Repetăți tratamentul cu Molevac după 2 până la 4 săptămâni în același mod. Dacă ați luat

o cantitate mai mare de Molevac decât trebuie avea, ca dumneavoastră ar trebui,

poate un amplificare a efectelor adverse (vezi de asemenea secțiunea 4: „Ce reacții adverse sunt posibile”?) von Molevac apărea. Dacă se după administrarea Molevac semne de intoxicație apare , căutați rugăm imediat un medic unui medicul. El poate un lavaj gastric sau administrarea de cărbune medicinal prescrie a dispune.

administrarea de Molevac uitat să luați,

puteți dumneavoastră lipsă cantitate fără alte încă în aceeași zi administrați. În orice caz ar trebui dumneavoastră însă cea din acest prospect menționată Cantitate totală Molevac a lua.

Dacă aveți alte întrebări despre administrarea acestui medicament aveți, contactați pe medicul dumneavoastră la medicul sau Farmacist.

4. Ce efecte secundare sunt posibile?

Ca toate medicamentele poate și acest medicament efecte secundare avea, care însă nu la fiecare apărea trebuie.

La evaluarea efectelor secundare se folosesc următoarele frecvențe ca bază ::

frecvent :: mult de 1 din 10 Frecvent

Frecvent: 1 până la 10 Tratați din 100

Ocazional: 1 până la 10 Tratați din 1.000

Rar: 1 până la 10 Tratați din 10.000
Foarte rar: mai puțin decât 1 Pacient tratat din 10.000

Afectiuni ale sistemului nervos
Ocazional: Dureri de cap
Foarte rar: Convulsii

Afectiuni ale urechii și ale labirintului
Foarte rar: Amețeli

Boli ale căilor respiratorii, ale cavității toracice și mediastinului
Foarte rar: umflarea temporară internă a laringelui (edem laringian)

Boli ale tractului gastrointestinal
Frecvent: Durere abdominală, greață, Vărsături
Ocazional: Diaree
Rar: Crampe stomacale, Flatulență, Constipație
Foarte rar: Inflamație a mucoasei bucale (Stomatită)

Boli ale pielii și ale țesutului subcutanat
Foarte rar: manifestări cutanate alergice cu și fără mâncărime, cum ar fi de ex. urticarie cu vezicule- și Formarea de papule (Urticarie), Fotosensibilitate, Eruptii cutanate (Rash), Hematoame cutanate (Purpură) precum și Umflarea pielii și mucoasei (Angioedem)

Alte posibile efecte secundare
Metil- și propil-4-hidroxi benzoat pot reacții de hipersensibilitate, inclusiv reacții întârziate provoca.

Raportarea reacțiilor adverse Dacă observați

reacții adverse Efecte secundare contactați medicul dumneavoastră Dumneavoastră se un Dumneavoastră Medic sau farmacist. Acest lucru este valabil și pentru reacții adverse, care nu sunt menționate în acest prospect indicate sunt. Le puteți reacții adverse de asemenea direct la Institutul Federal pentru Medicamente și Produse Medicale, Abt. Farmacovigilență, Kurt-Georg Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, raportați. Prin dumneavoastră reacții adverse raportați, puteți dumneavoastră să contribuiți, ca mai Informații despre siguranța acestui medicament la dispoziție furnizate să fie.

5. Cum se păstrează Molevac a păstra Păstrați

Păstrați inaccesibil inaccesibil Dumneavoastră

tu a se medicamentul după data de pe folie blister și pe cutia de carton după „Utilizabil până la:” indicat data de expirare nu mai utiliza. Data de expirare se referă la pe ultimul zi al indicat lunii.

6. Conținutul al ambalajului și alte informații

Ce Molevac conține

Substanța activă este Pyrvinium. Pyrvinium.

1 acoperită comprimat conține 75,25 mg Pyrviniumembonat (corespunzător 50 mg bază de Pyrvinium).

Alte componente sunt ::

amidon de porumb ,talc ,povidonă Povidonă K 25, Stearat de magneziu (Ph. Eur.), Polisorbat 80, Carboximetil amidon-Sodiu (Tip A) (Ph. Eur.), Zahăr, Gelatină, Șelac, Carbonat de calciu, Oxizi de fier și hidroxizi, Benzoat de sodiu, Metil-4-hidroxibenzoat (Ph. Eur.), Propil-4-hidroxibenzoat (Ph. Eur.), ceară albă.

Cum Molevac arată și Conținutul ambalajului Pachetului

8 filmate roșu-maronii Comprimate

Producătorul și Fabricantul Producător

Von-Humboldt-Str. 1
64646 Heppenheim
www.infectopharm.com
Acestea

sunt Prospect a fost ultima dată revizuit în decembrie 2013.

Informații conform § 11 alin. 1 fraza 7 AMG: Dragi pacienți,

dragi părinți ..

sau la copilul dumneavoastră a fost depistată infestare cu viermi constatat și dumneavoastră ați Molevac de medicul dumneavoastră Medic prescris primit sau fără rețetă în farmacie cumpărat. Desigur vă faceți Tu griji , cum să dăunători din nou scăpați. De aceea am noi câteva informații adunate, care vă oferă contextul acestei afecțiuni mai aproape să și ajute sunt, care Tratament corespunzător a efectua.

Infestare cu oxiuri – cea mai frecventă boală parazitară

Oxiurii sunt paraziți, adică organisme, care trăiesc în un străin organism, gazda așa-numitul gazdă, trăiesc și se pe cheltuiala acestuia se hrănesc.

Oxiurii sunt cei cu distanță cei mai frecvenți viermi, care afectează oamenii în zonele temperate .În multe țări găzduiesc aproximativ un treime din toți copiii acești paraziți.

Transmiterea de la om la om are loc foarte ușor prin contact direct și Lubrifiere și Infecție cu murdărie și este deja prin simpla strângere de mână posibil.

Cum se produce o infecție cu oxiuri?

Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră este Oxiuri infestați sunt, deci este aceasta nu neapărat consecința consecința de lipsei personale igienă. Ușor poate o transmitere în de instituții comunitare, cum de ex. grădinițe, prin utilizarea comună a toaletelor, jucăriilor sau articolelor de îmbrăcăminte se poate întâmpla.

De asemenea, în timpul jocului pe publice locuri de joacă este prin nisip contaminat nisip o infecție posibilă. Ouăle de oxiuri sunt foarte stabile. Ele pot în mediu uscat până la la 3 săptămâni contagios a fi și cu praful din cameră ridicat fi. De aceea poate oxiurul nu doar prin contact direct Contact directci și de asemenea prin inhalare transmis sunt.

Odată în corp ajunge, maturizează ouăle în 14 zile în viermi adulți care pânăla pot 11 mm lung sunt. Un în colon aflat femelă se târăște noaptea, când pacientul afectat doarme ,iese din anus și depune acolo acolo în domeniul al anusului odată până la 10000 ouă depune. Acest lucru duce la o mâncărime intensă și pacientul începe să se în Somn parțial neobservat la zgâria. Pe acest mod ajung mii de ouă de viermi sub unghii degetelor. În special copiii își bagă apoi degetele în gură și deja începe ciclul circular de nou.

Cum recunosc eu o infecție cu oxiuri?

Există mulți oameni care sunt infectați cu oxiuri afectați sunt, dies totuși nu observa. Frecvent cauzează infestarea cu viermi de fapt doar simptome sau chiar niciun disconfort. Dacă observați totuși observați, că se Dumneavoastră copilul adesea la anus scarpină, ar trebui să vă gândiți la o infecție cu viermi gândiți. Alte semne pot fi:

- oboseală și de aceea dificultăți de concentrare
- tulburări de somn, în timpul zilei iritabilitate
- pierderea apetitului
- paloare
- pierderea în greutate
- Generalități disconfort general

După ce o femelă își ouăle a depus a depus, moare ea. pot atunci eventual până la la 11 mm lungi viermi în pijamale sau în lenjeria de pat cu ochiul liber recunoaște.

Cum se un infestare cu oxiuri tratat?

Dacă o infecție cu oxiuri de către medicul confirmată este, ar trebui să fie în orice caz cu un medicament împotriva viermilor, unui așa numit anthelmintic, tratat fie.

Substanța activă Pyrvinium, care atât în Molevac suspensie cât și în Molevac drajeuri conținut este, este utilizat de mai mulți decenii în multe țări pentru tratamentul infecțiilor cu viermi infecțiilor cu viermi utilizat.

Pyrvinium este practic nu în corpul uman sistemul circulator absorbit.

De aceea este Molevac de obicei extrem de bine tolerat. Acționează doar acolo , unde acționează acționa trebuie: În intestin, unde se află viermii ..

pot să mai fac? Aplicarea Molevac

este în curs de desfășurare de conceput simplu. Pe lângă cea prescrisă de medicul dumneavoastră Medic prescris administrare ar trebui să totuși suplimentar neapărat câteva măsuri de igienă respectați.

- Asigurați-vă că, că se Dumneavoastră copil după jocul în aer liber în liber precum după fiecare utilizare a toaletei temeinic pe mâini spală.
- Mențineți unghiile degetelor al dumneavoastră copilului cât mai scurt posibil și curat.
- Asigurați-vă de igienă suficientă în zona anală.
- Spălați toate hainele și lenjeria de pat, cu al Dumneavoastră copilul în Contact a fost (60 °C Spălare este suficient).
- Evitați să posibil pe ridicarea prafului (de ex. la făcutul patului).

Din când în când ascultați noi, că chiar în cazul unei utilizări corecte a Molevac și respectării atente a tuturor măsurilor de igienă infecția cu viermi pare să nu dispară. În astfel de cazuri este adesea un membru al familiei, care viermi găzduiește, dar totuși nu observă, pentru reinfectare responsabil.

Discutați cu acest Caz neapărat cu medicul dumneavoastră.

În cazul persistentelor evoluții poate fi un tratament simultan al tuturor membrilor familiei necesar.

Vă dorim însănătoșire grabnică

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH