

Bruksanvisning: Information för användare

Molevac® Drageringar
50 mg överdragna tabletter Aktiv substans: Pyrvinium
För barn från 3 år, ungdomar och vuxna

Läs hela bipacksedeln noggrant igenom genom, innan du med den intag denna läkemedel börjar, eftersom den innehåller viktig information.

Ta detta läkemedel alltid exakt som i denna Bipacksedel beskriven respektive. exakt enligt anvisning din läkare eller apotekare en.

Spara den bipacksedeln kvar. Kanske vill du dessa senare igen läsa.
Fråga din apotekare, om du behöver ytterligare information eller ett råd behöver.
Om du biverkningar märka, vänd dig till din läkare eller apotekare. Detta gäller även för biverkningar , som inte anges idenna bipacksedel anges är .. Se Avsnitt 4
Om dina besvär förvärras eller ingen förbättring sker ,måste du i varje fall uppsöka en läkare ..

Vad i denna bipacksedel står

1. Vad är Molevac och vad används det för?
2. Vad bör du innan du tar från Molevac observera?
3. Hur är Molevac att ta?
4. Vilka biverkningar är möjliga?
5. Hur är Molevac att förvara?
6. Innehåll av Förpackning och ytterligare information

1. Vad är Molevac och vad används det för?

Molevac är ett läkemedel för behandling vid springmaskinfektion (Oxyuriasis). Molevac kan användas hos barn från 3 år, ungdomar och vuxna Vuxna.

Molevac innehållna aktiva substansen Pyrvinium är är speciellt mot springmask (oxyurer) effektiv. Den maskdödande effekten beror på en störning av ämnesomsättningen hos springmask genom Molevac.

2. Vad bör du innan du tar från Molevac tänka på?

Molevac får inte tas om,

- du Du allergisk mot den verksamma substansen Pyrvinium, Methyl- respektive. Propyl-4-hydroxibensoat eller någon av de i avsnitt 6. nämnda övriga ingredienser detta läkemedel är.
- vid Leverskada
- vid inflammatoriska tarmsjukdomar
- vid nedsatt njurfunktion

Varningar och försiktighetsåtgärder

Vänligen prata med din läkare eller apotekare innan du tar Molevac ..

Molevac färgar avföringen ljusröd. Detta har ingen sjukdomsvärde, utan visar endast att den aktiva substansen mag-tarm-kanalen korrekt passerat har.

Den Aktiva substansen av Molevac, Pyrvinium, kan till exempel genom kräkningar eller genom röd färgning av avföringen till en färgning av textilier leda. Dessa missfärgning är inte tvättbar.

Vid en maskinfektion är ofta också de familjemedlemmar eller andra nära kontaktpersoner med påverkad. Fråga du din läkare eller apotekare, om hos dessa kontaktpersoner också en behandling genomförd borde bli. Var uppmärksam dessutom på Kroppshygien och en grundlig rengöring av livsområden (bostad, arbetsplats) samt av kläder.

Barn

Molevac Dragees är för behandling av barn under 3 år inte lämpliga. För barn från en ålder av 1 år finns Molevac som suspension tillgänglig.

Intag av Molevac tillsammans med andra läkemedel

Informera din läkare eller apotekare, om du tar andra läkemedel eller använder, nyligen nyligen andra läkemedel intagit/ använt har eller avser andra läkemedel ta/ använda.

Hittills har inga interaktioner med andra Läkemedel observerats.

Graviditet, Amning och Fertilitet-/Födelseförmåga

Om du gravid är eller ammar, eller om du misstänker, gravid att vara eller avser, gravid att bli, fråga du innan du tar detta läkemedel din läkare eller Apotekare för råd.

Graviditet

Under graviditet får du Molevac endast ta, om detta med hänsyn till risken för mor och barn absolut nödvändigt är, t.ex. eftersom andra aktiva substanser inte tas får inte.

Vid användning av Molevac under graviditet bör mängden läkemedel begränsas till Kroppsvikt före graviditeten graviditet beräknas vara (se även avsnitt 3. „Hur ska Molevac tas?“).

Amning

Ammande mödrar bör av säkerhetsskäl under den användning av Molevac mjölken pumpa ut och slänga.

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder bör under den behandling med Molevac en säker preventivmetod använda, eftersom den möjliga risken vid användning av Molevac under graviditet inte känd är.

Körförmåga och Förmåga att använda maskiner

Det finns inga särskilda försiktighetsåtgärder nödvändiga.

Molevac innehåller Sucrose (socker)

Vänligen ta du Molevac först efter samtal med din läkare en, om du känner till är, att du lider av en Intolerans mot vissa sockerarter lider.

3. Hur är Molevac att ta?

Ta detta läkemedel alltid exakt som i denna bipacksedel beskriven eller, exakt efter den med din läkare eller apotekare överenskommelse en .. du hos din läkare eller apotekare Apotekare efter, om du inte säker är ..

Molevac

ges i allmänhet som en engångsdos administreras administrerad.

Om från läkare inte annorlunda föreskrivet, är den vanliga dosen:

Barn från 3 år, Ungdomar och Vuxna får 1 dragerad tablett Molevac (motsvarande 50 mg Pyrvinium) per 10 kg kroppsvikt. Den maximala dosen är hos barn, ungdomar och vuxna (även vid en kroppsvikt på mer än 80 kg) 8 överdragna tabletter Molevac (motsvarande 400 mg Pyrvinium), se doseringsschema.

Vid otillräcklig effekt ska inte läkemedelsmängden ökas, utan dö Behandling upprepas bli.

Doseringstabell

Ålder ca. (år)	Kroppsvikt ca. (kg)	Antal Molevac Drageer
Barn respektive. Ungdomar		
3-5	12-19	1-2
6-9	20-29	2-3
10-12	30-39	3-4
13-14	40-49	4-5
15-16	50-59	5-6
Vuxna		
	60-69	6-7
	70-79	7-8
	80 (eller mer)	8

Användning vid barn och ungdomar

Doseringen vid barn från 3 år och ungdomar kan du hitta i doseringstabellen Doseringstabell Molevac. är för den för de Behandling av barn under 3 år inte lämplig. För barn från en ålder av 1 år finns Molevac som suspension för intag till gänglig.

Typ av användning

Ta Molevac drageringar vänligen utan att tugga med tillräcklig vätska ner. Molevac kan både till en måltid och också på fastande Mage intagen bli. Om du en större mängd drageringar ta måste, fördela du intaget intag på bäst tre tre portioner: före, under och efter måltiden måltid.

Gravida

Vid användning av Molevac under graviditet bör doseringen anpassas till kroppsvikten kroppsvikt före graviditeten graviditet relaterad bli. Angående möjliga risker vid användning av Molevac under graviditet se avsnitt 2 under „Graviditet, amning och fertilitet-reproduktionsförmåga“.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Molevac får inte användas hos patienter med nedsatt njurfunktion inte användas bli (se avsnitt 2 under „Molevac får inte tas bli“).

Patienter med nedsatt leverfunktion

Molevac får hos patienter med leverskada inte användas bli (se avsnitt 2 under „Molevac får inte tas bli“).

Äldre Patienter (över 65 år)

Såvida ingen begränsning av lever- eller av njurfunktion föreligger, finns inga särskilda att beakta.

Varaktighet av användning

Upprepa du behandlingen med Molevac efter 2 till 4 veckor på samma sätt. Om du

en större mängd av Molevac tagit har ha, som du bör,

kan en förstärkning av oönskade effekter (se även avsnitt 4: „Vilka biverkningar är möjliga“?) von Molevac uppstå. Om sig efter den intag av Molevac tecken på förgiftning visa, sök omedelbart en en Läkare på. Han kan en magpumpning eller ta intag av medicinskt kol anordna.

Om du har intag av Molevac glömt har,

kan du saknade mängd utan vidare ännu på samma dag ta. I varje fall bör du dock den i denna bipacksedel angivna Total mängd Molevac ta.

Om du ytterligare frågor om intag av detta läkemedel har, kontakta din läkare till din läkare eller Apotekare.

4. Vilka Biverkningar är möjliga?

Liksom alla läkemedel kan också detta läkemedel biverkningar ha, men inte hos alla uppträda behöver inte.

Vid bedömning av biverkningar används följande frekvensangivelser som grund ::

vanliga ::	än 1 1 av 10 Vanliga
Ofta:	1 till 10 Behandlade av 100
Ibland:	1 till 10 Behandlade av 1.000
Sällan:	1 till 10 Behandlade av 10.000
Mycket sällan:	mindre än 1 Behandlad av 10.000

Sjukdomar i Nervsystemet

Tillfälligt: Huvudvärk

Mycket sällan: Kramper

Sjukdomar i Örat och labyrinten

Mycket sällan: Yrsel

Sjukdomar i andningsvägarna, i brösthålan och mediastinum

Mycket sällsynta: tillfälligt inre struphuvudsvullnad (larynxödem)

Sjukdomar i mag-tarm-kanalen

Vanliga: Buksmärtor, Illamående, Kräkningar
Ibland: Diarré
Sällan: Magkramp, Gasbildning, Förstoppning
Mycket sällan: Inflammation av munslemhinnan (Stomatit)

Sjukdomar i huden och underhudsvävnad

Mycket sällsynt: allergiska hudutslag med och utan klåda, som t.ex. nässelfeber med blåsor- och Blåsbildning (Urtikaria), Ljusöverkänslighet, Hudutslag (Rash), Hudblödningar (Purpura) samt Svullnad av huden och Slemhinna (Angioödem)

Andra möjliga Biverkningar

Metyl- och propyl-4-hydroxibensoat kan överkänslighetsreaktioner, även senreaktioner orsaka.

Rapportering av biverkningar

Om du biverkningar märker, kontakta din läkare eller apotekspersonal Läkare eller Apotekare. Detta gäller även för Biverkningar, som inte finns i denna Bipacksedel anges är. De kan Biverkningar även direkt till Federal institutet för läkemedel och Medicintekniska produkter, Avd. Farmakovigilans, Kurt-GeorgKiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Webbplats: www.bfarm.de, visa. Genom att biverkningar rapportera, kan du till bidra, att mer Information om säkerheten för detta läkemedel tillgänglig ställs till.

5. Hur ska Molevac förvaras?

Förvara detta läkemedel oåtkomligt för barn förvaras .

De får läkemedlet efter det på blisterförpackningen och på kartongen efter "Används före:" angivna utgångsdatum inte längre användas. Utgångsdatumet utgångsdatum avser sig på den sista dagen i angivna månaden.

6. Innehåll i förpackningen och ytterligare information

Vad Molevac innehåller

Den aktiva substansen är Pyrvinium.

1 överdragen tablett innehåller 75,25 mg Pyrviniumembonat (motsvarande 50 mg pyrvinium-bas).

De övriga ingredienserna är:

Mannitol (Ph. Eur.), majsstärkelse, talk, povidon K 25, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), Polysorbat 80, Karboximetylstärkelse-Natrium (Typ A) (Ph. Eur.), Sackaros, Gelatin, Schellack, Kalciumkarbonat, Järnoxider och -hydroxider, Natriumbensoat, Metyl-4-hydroxibensoat (Ph. Eur.), Propyl-4-hydroxibensoat (Ph. Eur.), blekt vax.

Hur Molevac ser ut och Innehåll av Förpackning

8 överdragna röd-brunaktiga Tabletter

Farmaceutisk Företag och Tillverkare

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Str. 1
64646 Heppenheim
www.infectopharm.com

Denna Bipacksedel blev senast reviderad i december 2013.

Transtoyou

Ytterligare uppgifter enligt § 11 stycke 1 mening 7 AMG:

Kära patienter, kära föräldrar.

Hos er eller ert barn har maskinfektion fastställt och du har Molevac av din läkare förskrivit fått eller receptfritt på apoteket köpt. Självklart gör du dig oro, hur du plågoandar åter bli av med. Därför har vi några information sammansatt, som ger dig bakgrund till denna sjukdom närmare förståelse ska och hjälpa bli, som behandling korrekt utföra.

Springmaskinfektion – den vanligaste maskinfektionen

Springmaskar är parasiter, dvs. organismer, som i en främmande organism, den så kallade värd, leva och sig på dess bekostnad när sig.

Springmaskar är den med avstånd vanligaste masktypen, som människor i de tempererade klimatzonerna angriper. I många länder huserar ungefär en tredjedel av alla barn dessa parasiter. Överföringen överföring från människa till människa sker mycket lätt genom smuts- och Smutsinfektion och är redan genom blotta handhälsning möjlig.

Hur sker en infektion med springmask?

Om du eller ditt barn av Spolmaskar angripna är, så är detta inte nödvändigtvis följderna av bristande personlig hygien. Lätt kan en överföring inom gemenskapsanläggningar , Gemensamhetsanläggningar, hur t.ex. förskolor, genom gemensam användning av toaletter, leksaker eller klädesplagg ske.

Även vid lek på offentliga lekplatser är genom förorenad sand en infektion möjlig.

Springmaskäggen är mycket stabila. De kan i torr miljö upp till 3 veckor smittsam vara och med dammet i rummet virvlas upp bli. Därför kan springmasken inte bara genom direktkontakt Direktkontaktutan också genom genom Inandning överförs blir.

En gång i kroppen kommer, mognar äggen ägg inom 14 dagar till vuxna maskar utvecklas, som kan bli upp till 11 mm lång blir. En i tjocktarmen befintlig hona kryper nattetid, när den drabbade patienten sover, ut från ändtarmen och lägger där i området av analöppningen på en gång till upp till 10000 ägg av. Detta leder till en stark klåda och patienten börjar klia sig Sömn delvis obemärkt till klia. På denna Väg kommer tusentals maskäggen under naglarna naglarna. Särskilt Barn stoppar då fingrarna i munnen och redan börjar kretsloppet cirkulation av nytt.

Hur känner jag igen jag en springmaskinfektion?

Det finns många människor som är springmask drabbade är, detta dock inte märka. Ofta orsakar den maskinfektion nämligen bara lindriga eller inga besvär . Om dudock märker ,, att sig Ditt barn ofta vid ändtarmen kliar, bör du alltid tänka på en maskinfektion tänka. Ytterligare tecken kan vara:

- trötthet och därför koncentrationssvårigheter
- sömnstörningar, dagtid irritabilitet
- aptitlöshet
- blekhet
- viktninskning
- Allmänt obehag

Efter en hona sina ägg lagt har, dör den. De kan sedan eventuellt die bis till 11 mm långa maskar i pyjamasen eller i sängkläderna med blotta ögat upptäcka.

Hur blir en springmaskinfektion behandlas?

Om en springmaskinfektion av läkare bekräftas blir, bör den i varje fall med ett läkemedel mot maskar, en så kallad anthelmintikum, behandlas med.

Den aktiva substansen Pyrvinium, som både i Molevac suspension och också i Molevac Drageer innehåller är, används sedan flera årtionden i många länder för behandling av maskinfektioner använts.

Pyrvinium blir praktiskt inte i mänskliga blodomloppet upptaget.

Därför är Molevac i regel uttalat väl tolererat. Det verkar endast där, där det verka ska: I tarmen, där finns de maskarna befinner sig.

Vad kan jag annars mer göra?

Användningen av Molevac är är tänkbar enkel. Förutom den av din läkare föreskrivna intag bör du dock ytterligare absolut några hygienåtgärder iaktta.

- Se till att, att sig Ditt barn efter leken utomhus samt efter varje toalettbesök noggrant händerna tvättar . Håll du.
- Hålla Du Fingernaglar Ditt barns så kort som möjligt och rent.
- Se till tillräcklig hygien i analområdet.
- Tvätta alla kläder och sängkläder, med den Er Barn i Kontakt var (60 °C Tvätt räcker).
- Undvik Du möjligtvis det Dammvirlande (t.ex. vid Bäddning).

Då och ibland höra vi, att även vid korrekt användning av Molevac och noggrann iakttagelse av alla hygienåtgärder verkar maskinfektionen tydligen inte försvinna. I sådana fall är ofta en familjemedlem, som maskar huserar, men dock inte märker, för återinfektion ansvarig.

Tala med detta Fall absolut med din läkare.

Vid ihållande förlopp kan en samtidig behandling av alla familjemedlemmar nödvändig.

. God bättring

INFECTOPHARM Läkemedel och Consilium GmbH