

Pakningsvedlegg: informasjon til pasienten

Mounjaro, 2,5 mg/dose KwikPen, oppløsning til injeksjon i ferdigfylt penn
Mounjaro, 5 mg/dose KwikPen, oppløsning til injeksjon i ferdigfylt penn
Mounjaro, 7,5 mg/dose KwikPen, oppløsning til injeksjon i ferdigfylt penn
Mounjaro, 10 mg/dose KwikPen, oppløsning til injeksjon i ferdigfylt penn
Mounjaro, 12,5 mg/dose KwikPen, oppløsning til injeksjon i ferdigfylt penn
Mounjaro, 15 mg/dose KwikPen, oppløsning til injeksjon i ferdigfylt penn
tirzepatid

Dette legemidlet er underlagt ekstra overvåking. Dette gjør det mulig å raskt identifisere ny sikkerhetsinformasjon. Du kan bidra ved å rapportere eventuelle bivirkninger du opplever. På slutten av avsnitt 4 kan du lese hvordan du gjør dette.

Les hele pakningsvedlegget nøye før du begynner å bruke dette legemidlet, for det inneholder viktig informasjon for deg.

- Oppbevar dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Har du flere spørsmål? Ta kontakt med legen din, sykepleier eller apotek.
- Ikke gi dette legemidlet til andre, da det kun er foreskrevet til deg. Det kan være skadelig for andre, selv om de har samme symptomer som deg.
- Får du bivirkninger som er nevnt i avsnitt 4? Eller får du bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget? Ta da kontakt med legen din, sykepleier eller apotek.

Innholdet i dette pakningsvedlegget

1. Hva er Mounjaro KwikPen og hva brukes det til?
2. Når skal du ikke bruke dette legemidlet eller må du være ekstra forsiktig?
3. Hvordan bruker du dette legemidlet?
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan oppbevarer du dette legemidlet?
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva er Mounjaro KwikPen og hva brukes dette legemidlet til?

Mounjaro inneholder det aktive stoffet tirzepatid og brukes til behandling av voksne med diabetes mellitus type 2. Mounjaro senker blodsukkernivået i kroppen kun når blodsukkernivået er høyt.

Mounjaro brukes også til behandling av voksne med fedme eller overvekt (med en BMI på minst 27 kg/m²). Mounjaro påvirker reguleringen av appetitten, noe som kan hjelpe deg å spise mindre og redusere kroppsvekten din.

Ved diabetes type 2 brukes Mounjaro:

- som eneste behandling hvis du ikke kan bruke metformin (et annet legemiddel for behandling av diabetes);
- sammen med andre legemidler for behandling av diabetes hvis disse ikke er tilstrekkelige for å holde blodsukkernivået (mengden sukker i blodet) under kontroll. Dette kan være legemidler du tar gjennom munnen og/eller insulin som gis ved injeksjon.

Mounjaro brukes også i kombinasjon med diett og mosjon for vekttap og for å holde vekten under kontroll hos voksne med:

- en BMI på 30 kg/m² eller høyere (fedme) eller
- en BMI mellom 27 kg/m² og 30 kg/m² (overvekt) og vektrelaterte helseproblemer (som prediabetes, diabetes type 2, høyt blodtrykk, unormale nivåer av fettstoffer i blodet, pusteproblemer under søvn kalt 'obstruktiv søvnapné' eller en historie med hjerteinfarkt, slag eller problemer med blodårene)

BMI (Body Mass Index) er et mål for vekten din i forhold til høyden din.

Hos pasienter med obstruktiv søvnapné (OSA) og fedme kan Mounjaro brukes med eller uten terapi med positivt luftveistrykk (positive airway pressure, PAP).

Det er viktig at du fortsetter å følge rådene du har fått fra legen din, sykepleieren eller apotekeren om diett og mosjon.

2. Når skal du ikke bruke dette legemidlet eller være ekstra forsiktig med det?

Når skal du ikke bruke dette legemidlet?

- Du er allergisk mot noen av stoffene i dette legemidlet. Disse stoffene finner du i avsnitt 6.

Når bør du være ekstra forsiktig med dette legemidlet?

Kontakt legen din, sykepleier eller apotek før du bruker dette legemidlet, hvis:

- du har alvorlige problemer med fordøyelsen av mat eller mat som blir lenger enn normalt i magen blir (inkludert alvorlig gastroparese);
- du noen gang har hatt pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen som kan forårsake alvorlig smerte i mage og rygg som ikke går bort);
- du har et problem med øynene dine (diabetisk retinopati eller makulødem);
- du bruker et sulfonylureaderivat (et annet legemiddel for behandling av diabetes) eller insulin for din diabetes, fordi lavt blodsukker (hypoglykemi) kan oppstå. Det kan hende at legen din må justere dosen av disse andre legemidlene for å redusere denne risikoen.

Når du starter behandlingen med Mounjaro, kan du i noen tilfeller oppleve væsketap/uttørking, for eksempel som følge av oppkast, kvalme og/eller diaré. Dette kan føre til redusert nyrefunksjon. Det er viktig å unngå uttørking ved å drikke mye væske. Kontakt legen din hvis du har spørsmål eller bekymringer.

Hvis du vet at du skal gjennomgå en operasjon der du vil bli holdt under narkose (sove), fortell legen din at du bruker Mounjaro.

Barn og ungdom under 18 år

Dette legemidlet skal ikke gis til barn og ungdom under 18 år, da det ikke er undersøkt i denne aldersgruppen.

Bruker du andre legemidler?

Bruker du andre legemidler i tillegg til Mounjaro, har du nylig gjort det eller er det en mulighet for at du snart vil bruke andre legemidler? Fortell det da til legen din, sykepleier eller apotek.

Graviditet

Er du gravid, tror du at du er gravid, ønsker å bli gravid eller ammer du? Kontakt da legen din før du bruker dette legemidlet. Dette legemidlet skal ikke brukes under graviditet, da effektene av dette legemidlet på et ufødt barn ikke er kjent. Det anbefales derfor å bruke prevensjon under bruk av dette legemidlet.

Amming

Det er ikke kjent om tirzepatid går over i morsmelk. En risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Hvis du ammer eller planlegger å amme, kontakt legen din før du bruker dette legemidlet. Du må sammen med legen din bestemme om du skal slutte å amme eller begynne å bruke Mounjaro senere.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er ikke sannsynlig at dette legemidlet vil påvirke din evne til å kjøre eller bruke maskiner. Hvis du bruker Mounjaro i kombinasjon med et sulfonylureaderivat eller insulin, kan imidlertid lavt blodsukker (hypoglykemi) oppstå, noe som kan redusere konsentrasjonsevnen din. Unngå å kjøre bil eller bruke maskiner hvis du får symptomer på lavt blodsukker, f.eks. hodepine, døsighet, svakhet, svimmelhet, sultfølelse, forvirring, irritabilitet, rask hjerterytme og svette (se avsnitt 4). Se avsnitt 2, 'Når bør du være ekstra forsiktig med dette legemidlet?' for informasjon om økt risiko for lavt blodsukker. Kontakt legen din for mer informasjon.

Mounjaro KwikPen inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, det vil si at det i hovedsak er 'natriumfritt'.

Mounjaro KwikPen inneholder benzylalkohol

Dette middelet inneholder 5,4 mg benzylalkohol i hver dose på 0,6 ml. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner.

Spør legen din eller apoteket om råd hvis du er gravid eller ammer, eller hvis du har en lever- eller nyresykdom. Store mengder benzylalkohol kan nemlig hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (såkalt metabolsk acidose).

3. Hvordan bruker du dette middelet?

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Er du i tvil om riktig bruk? Ta da kontakt med legen din eller apoteket.

Etter at alle dosene er korrekt administrert, kan det være en liten mengde medisin igjen i pennen. Forsøk ikke å bruke den gjenværende medisinen. Etter administrering av de fire dosene skal pennen kastes på riktig måte.

Hvor mye du skal bruke

Startdosen er 2,5 mg én gang i uken i 4 uker. Etter disse 4 ukene vil legen din øke dosen din til 5 mg én gang i uken.

Legen din kan øke dosen din med trinn på 2,5 mg til 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg eller 15 mg én gang i uken, hvis dette er nødvendig for deg. Legen din vil alltid fortelle deg å bli på en bestemt dose i minst 4 uker før du går til en høyere dose.

Endre ikke dosen din med mindre legen din har sagt det.

Velge når du skal bruke Mounjaro

Du kan bruke pennen din når som helst på dagen, med eller uten mat. Hvis mulig, bør du alltid bruke pennen på samme dag i uken. For å hjelpe deg med å huske når du skal bruke Mounjaro, kan du skrive det på en kalender.

Om nødvendig kan du også endre dagen du ukentlig injiserer Mounjaro, så lenge det er minst 3 dager siden din siste injeksjon. Etter å ha valgt en ny administrasjonsdag, fortsett med én gang i uken dosering på den nye dagen.

Hvordan skal du injisere Mounjaro KwikPen?

Mounjaro injiseres under huden (subkutan injeksjon) i magen – minst 5 cm fra navlen – eller under huden på låret eller overarmen. Du kan trenge hjelp fra noen andre hvis du vil injisere i overarmen.

Hvis du vil, kan du bruke samme område av kroppen hver uke. Sørg for at du velger et annet injeksjonssted innenfor det området hver gang. Hvis du også injiserer insulin, velger du et annet injeksjonssted for den injeksjonen.

Les nøye 'Brukerveiledningen' til pennen før du bruker Mounjaro KwikPen.

Teste hvor mye sukker det er i blodet ditt (blodglukose)

Hvis du bruker Mounjaro i kombinasjon med et sulfonylureaderivat eller insulin, er det viktig at du tester blodsukkeret ditt i henhold til instruksjonene fra legen din, sykepleier eller apotek (se avsnitt 2 'Når bør du være ekstra forsiktig med dette legemidlet?').

Har du brukt for mye av dette legemidlet?

Hvis du har brukt mer av dette legemidlet enn du burde, kontakt legen din umiddelbart. For mye av dette legemidlet kan forårsake lavt blodsukker (hypoglykemi) som kan gjøre deg kvalm eller få deg til å kaste opp.

Har du glemt å bruke dette legemidlet?

Hvis du har glemt å injisere en dose og,

det er 4 dager eller mindre siden du skulle ha injisert Mounjaro, bruk det så snart du husker det. Injiser deretter din neste dose som vanlig på din vanlige planlagte dag.
det er mer enn 4 dager siden du skulle ha injisert Mounjaro, hopp over den glemte dosen. Injiser deretter din neste dose som vanlig på din vanlige planlagte dag.

Ikke ta en dobbel dose for å erstatte en glemte dose. Det må være minst 3 dager mellom to doser.

Hvis du slutter å bruke dette legemidlet

Ikke slutt å bruke Mounjaro uten å konsultere legen din. Hvis du slutter å bruke Mounjaro og du har type 2 diabetes, kan blodsukkernivået ditt stige.

Har du flere spørsmål om bruken av dette legemidlet? Kontakt legen din, sykepleier eller apotek.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan også dette legemidlet ha bivirkninger, selv om ikke alle får dem.

Alvorlige bivirkninger

Noen ganger (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere)

- Betent bukspyttkjertel (akutt pankreatitt) som kan forårsake alvorlig smerte i magen og ryggen som ikke går over. Du må umiddelbart kontakte lege hvis du opplever slike symptomer.

Sjeldent (forekommer hos færre enn 1 av 1.000 brukere)

- Alvorlige allergiske reaksjoner (f.eks. anafylaktisk reaksjon, angioødem). Du må umiddelbart søke medisinsk hjelp og informere legen din hvis du opplever symptomer som pustevansker, rask hevelse av lepper, tunge og/eller hals med svelgevansker og rask hjerterytme.

Andre bivirkninger

Svært vanlige (forekommer hos mer enn 1 av 10 brukere)

- Kvalme
- Diaré
- Magesmerter (magesmerter) ble rapportert hos pasienter som ble behandlet for vektkontroll
- Oppkast ble rapportert hos pasienter som ble behandlet for vektkontroll
- Forstoppelse ble rapportert hos pasienter som ble behandlet for vektkontroll

Disse bivirkningene er vanligvis ikke alvorlige. Kvalme, diaré og oppkast forekommer oftest ved oppstart av behandling med tirzepatid, men avtar hos de fleste pasienter over tid.

- Lavt blodsukker (hypoglykemi) er svært vanlig når tirzepatid brukes i kombinasjon med legemidler som inneholder et sulfonylureaderivat og/eller insulin. Hvis du bruker et sulfonylureaderivat eller insulin for type 2-diabetes, må dosen kanskje reduseres mens du bruker tirzepatid (se avsnitt 2 'Når bør du være ekstra forsiktig med dette legemidlet?'). Symptomer på lavt blodsukker kan være: hodepine, døsighet, svakhet, svimmelhet, sultfølelse, forvirring, irritabilitet, rask hjerterytme og svette. Legen din kan fortelle deg hvordan lavt blodsukker skal behandles.

Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 brukere)

- Lavt blodsukker (hypoglykemi), når tirzepatid brukes for type 2-diabetes i kombinasjon med både metformin og en natriumglukose-kotransportør-2-hemmer (et annet legemiddel for behandling av diabetes)
- Allergisk reaksjon (overfølsomhet) (f.eks. utslett, kløe og eksem)
- Svimmelhet ble rapportert hos pasienter som ble behandlet for vektkontroll
- Lavt blodtrykk ble rapportert hos pasienter som ble behandlet for vektkontroll
- Mindre sulten (nedsatt appetitt) ble rapportert hos pasienter som ble behandlet for type 2-diabetes
- Magesmerter ble rapportert hos pasienter som ble behandlet for type 2-diabetes
- Oppkast ble rapportert hos pasienter som ble behandlet for type 2-diabetes dette avtar vanligvis over tid
- Mageplager (dyspepsi)
- Forstoppelse ble rapportert hos pasienter som ble behandlet for type 2-diabetes
- Oppblåsthet i magen
- Raping (oppstøt)

- Flatulens
- Refluks eller halsbrann (også kjent som gastroøsofageal refluks sykdom - GERD - en sykdom forårsaket av at magesyre kommer opp i munnen via spiserøret)
- Hårtap ble rapportert hos pasienter som ble behandlet for vektkontroll
- Føler seg trøtt (utmattelse)
- Reaksjoner på injeksjonsstedet (f.eks. kløe eller rødhet)
- Rask puls
- Økning av bukspyttkjertelenzymer (som lipase og amylase) i blodet
- Økte kalsitoninnivåer i blodet hos pasienter som ble behandlet for vektkontroll

Noen ganger (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere)

- Lavt blodsukker (hypoglykemi), når tirzepatid brukes sammen med metformin for diabetes type 2
- Gallesteiner
- Galleblærebetennelse
- Vekttap ble rapportert hos pasienter som ble behandlet for diabetes type 2
- Smerte på injeksjonsstedet
- Økte kalsitoninnivåer i blodet hos pasienter som ble behandlet for diabetes type 2 eller for OSA med fedme
- Mat og drikke smaker annerledes enn normalt
- Mer eller mindre følelse i huden
- En forsinkelse i tømming av magen

Rapportering av bivirkninger

Hvis du opplever bivirkninger, kontakt legen din, sykepleier eller apotek. Dette gjelder også mulige bivirkninger som ikke er nevnt i denne pakningsvedlegget. Du kan også rapportere bivirkninger direkte via det nasjonale rapporteringssystemet som nevnt i vedlegg V.* Ved å rapportere bivirkninger kan du hjelpe oss med å få mer informasjon om sikkerheten til dette legemidlet.

5. Hvordan oppbevarer du dette legemidlet?

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen. Den finner du på etiketten på pennen og på esken etter EXP. Det står en måned og et år. Den siste dagen i den måneden er utløpsdatoen.

Oppbevares i kjøleskap (2°C-8°C). Skal ikke fryses. Hvis pennen har vært frosset, IKKE BRUK.

Mounjaro KwikPen kan oppbevares utenfor kjøleskapet ved en temperatur under 30°C i totalt 30 dager etter første bruk, og deretter må pennen kastes.

Bruk ikke dette legemidlet hvis du merker at pennen er skadet, eller hvis legemidlet er uklart eller misfarget eller inneholder partikler.

Skyll ikke legemidler ned i vasken eller toalettet og kast dem ikke i søppelbøtta. Spør apoteket hva du skal gjøre med legemidler du ikke lenger bruker. Hvis du kaster legemidler på riktig måte, blir de destruert på en ansvarlig måte og havner ikke i miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hvilke stoffer inneholder dette legemidlet?

Det aktive stoffet i dette legemidlet er tirzepatid.

Mounjaro 2,5 mg/dose KwikPen: Hver dose inneholder 2,5 mg tirzepatid i 0,6 ml oppløsning. Hver ferdigfylte penn med flere doser inneholder 10 mg tirzepatid i 2,4 ml (4,17 mg/ml). Hver penn gir 4 doser på 2,5 mg. Mounjaro 5 mg/dose KwikPen: Hver dose inneholder 5 mg tirzepatid i 0,6 ml oppløsning. Hver ferdigfylte penn med flere doser inneholder 20 mg tirzepatid i 2,4 ml (8,33 mg/ml). Hver penn gir 4 doser på 5 mg. Mounjaro 7,5 mg/dose KwikPen: Hver dose inneholder 7,5 mg tirzepatid i 0,6 ml oppløsning. Hver ferdigfylte penn med flere doser inneholder 30 mg tirzepatid i 2,4 ml (12,5 mg/ml). Hver penn gir 4 doser på 7,5 mg. Mounjaro 10 mg/dose KwikPen: Hver dose inneholder 10 mg tirzepatid i 0,6 ml oppløsning. Hver ferdigfylte penn for flere doser inneholder 40 mg tirzepatid i 2,4 ml (16,7 mg/ml). Hver penn gir 4 doser på 10 mg. Mounjaro 12,5 mg/dose KwikPen: Hver dose inneholder 12,5 mg tirzepatid i 0,6 ml oppløsning. Hver ferdigfylte penn for flere doser inneholder 50 mg tirzepatid i 2,4 ml (20,8 mg/ml). Hver penn gir 4 doser på 12,5 mg. Mounjaro 15 mg/dose KwikPen: Hver dose inneholder 15 mg tirzepatid i 0,6 ml oppløsning. Hver ferdigfylte penn med flere doser inneholder 60 mg tirzepatid i 2,4 ml (25 mg/ml). Hver penn gir 4 doser på 15 mg.

De andre stoffene i dette legemidlet er dinatriumfosfatheptahydrat (E339), benzylalkohol (E1519) (se avsnitt 2 under: 'Mounjaro KwikPen inneholder benzylalkohol' for mer informasjon), glyserol, fenol, natriumklorid, natriumhydroksid (se avsnitt 2 under: 'Mounjaro inneholder natrium' for mer informasjon), konsentrert saltsyre og vann til injeksjoner.

Hvordan ser Mounjaro ut og hvor mye er det i en pakning?

Mounjaro er en klar, fargeløs til svakt gul oppløsning for injeksjon i en ferdigfylt penn (KwikPen).

Hver KwikPen inneholder 2,4 ml injeksjonsvæske (4 doser på 0,6 ml) og et overskudd for lufting.

Nåler er ikke inkludert.

Pakningsstørrelser på 1 og 3 KwikPen.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis tilgjengelige i ditt land.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland

Produsent

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino, Firenze (FI), Italia

Lilly S.A., Avda. de la Industria, 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spania

Lilly France, 2, rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Frankrike

Millmount Healthcare Limited, Block 7 City North Business Campus, Stamullen, K32 YD60, Irland

Millmount Healthcare Limited, IDA Science And Technology Park, Mullagharlin, Dundalk, Co. Louth, A91 DETO, Irland

For all informasjon om dette legemidlet, kontakt den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

Belgique/België/Belgien
Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Lietuva
Eli Lilly Lietuva

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България
тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tsjekkia

ELI LILLY ČR, s.r.o.
Tel: + 420 234 664 111

Ungarn

Lilly Hungária Kft.
Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S
Tlf.: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.
Tel: + 356 25600 500

Tyskland

Lilly Deutschland GmbH
Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Estland

Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.
Tlf: + 47 22 88 18 00

Hellas

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Τηλ: +30 210 629 4600

Østerrike

Eli Lilly Ges.m.b.H.
Tel: + 43-(0) 1 20609 1270

Spania

Lilly S.A.
Tel: + 34-91 663 50 00

Polen

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
Tel: +48 22 440 33 00

Frankrike

Lilly Frankrike
Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos,
Lda
Tel: + 351-21-4126600

Kroatia

Eli Lilly Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 2350 999

Romania

Eli Lilly Romania S.R.L.
Tel: + 40 21 4023000

Irland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited
Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenia

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o
Tel: +386 (0)1 580 00 10

Island

Icepharma hf.
Telefon + 354 540 8000

Den slovakiske republikk

Eli Lilly Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.
Tel: + 39- 055 42571

Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Kypros
Phadisco Ltd
Tlf: +357 22 715000

Sverige
Eli Lilly Sweden AB
Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvia
Eli Lilly (Suisse) S.A Representasjon i Latvia
Tel: +371 67364000

Denne pakningsvedlegget ble sist godkjent i

Andre informasjonskilder

Mer informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til det europeiske Legemiddelbyrået: <http://www.ema.europa.eu>

Brukerveiledning

Flerdose ferdigfylt penn

Hver penn inneholder 4 faste doser, én dose injiseres ukentlig.

Mounjaro, 2,5 mg/dose KwikPen, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Mounjaro, 5 mg/dose KwikPen, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Mounjaro, 7,5 mg/dose KwikPen, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Mounjaro, 10 mg/dose KwikPen, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Mounjaro, 12,5 mg/dose KwikPen, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Mounjaro, 15 mg/dose KwikPen, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Tirzepatide

Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om injeksjon med Mounjaro KwikPen

Viktig informasjon du må vite før du injiserer med Mounjaro KwikPen.

Les denne brukerveiledningen og pakningsvedlegget før du starter injeksjonen med Mounjaro KwikPen og hver gang du får en ny penn. Det kan være ny informasjon. Denne informasjonen erstatter ikke samtalen med legen din, sykepleieren eller apotekeren om din medisinske tilstand eller behandling.

Mounjaro KwikPen er en engangs forfylt penn med flere doser. Pennen inneholder 4 faste doser, for å administrere én dose ukentlig. Injiser en enkelt injeksjon per uke, under huden (subkutant).

Kast pennen etter 4 doseringer, inkludert den ubrukte medisinen. Pennen er laget slik at du ikke kan vri en full dose etter at du har gitt deg selv de 4 ukentlige dosene. Injiser ikke den gjenværende medisinen. Overfør ikke medisinen fra pennen til en sprøyte.

Del ikke din Mounjaro KwikPen med andre, selv om en ny nål brukes. Du kan gi dem en alvorlig infeksjon eller selv få en alvorlig infeksjon fra dem.

Personer som er blinde eller har synsproblemer, skal ikke bruke pennen uten hjelp fra en person som er trent i bruk av pennen.

Bruksanvisning for deler
Deler av Mounjaro KwikPen

Patron- Pennkropp Dose-
Pennhette Patron_neldre indikator

Nål egnet for KwikPen (hvis du ikke vet hvilken pennål du skal bruke, kontakt helsepersonell)

Deler av Mounjaro Kwikpen

Nål egnet for KwikPen (hvis du ikke vet hvilken pennål du skal bruke, kontakt helsepersonell helsepersonell)

Hva du trenger for å administrere injeksjonen din
Mounjaro KwikPen
Pennål egnet for KwikPen (hvis du ikke vet hvilken pennål du skal bruke, kontakt helsepersonell)
Alkoholserviett og gasbind eller bomullsdott
Beholder for skarpe gjenstander eller husholdningsbeholder

Forberedelse av injeksjonen med Mounjaro KwikPen

Trinn 1:

Vask hendene med såpe og vann.

Trinn 2:

Trekk pennen rett av.

Kontroller pennen og etiketten. Ikke bruk pennen hvis:

- navnet på medisinen eller dosestyrken ikke samsvarer med resepten din.
- pennen er utløpt (EXP) eller ser skadet ut.
- medisinen har vært frosset, inneholder partikler, er uklar eller misfarget. Mounjaro skal være fargeløs til lysegul.

Trinn 3:

Tørk av den røde indre forseglingen med en alkoholserviett.

Trinn 4:

Ta en ny nål. Bruk alltid en ny nål for hver injeksjon for å unngå infeksjoner og tilstopping av nålen.

Fjern papirbeskyttelsen fra den ytre nålebeskytteren.

Trinn 5:

Trykk nålen med hetten rett på pennen og skru nålen godt på.

Trinn 6:

- a) Fjern den ytre nålebeskytteren og kast den ikke. Du vil trenge den senere.

b) Fjern den indre nålebeskytteren og kast den.

a. Ytre b. Indre nålebeskytter nålebeskytter

Trinn 7:

Drei doseringsknappen sakte til du hører 2 klikk og den lange streken [-] blir synlig i doseringsvinduet. Dette er posisjonen for å luften pennen din. Dette kan korrigeres ved å dreie doseringsknappen i en vilkårlig retning, til den lange streken står nøyaktig ved siden av doseringsindikatoren.

Trinn 8:

Hold pennen oppreist med nålen pekende oppover. Bank forsiktig på patronholderen for å samle luftboblene øverst.

Trinn 9:

Sprøyt litt medisin i luften ved å trykke inn doseringsknappen til den stopper. Tell deretter sakte til 5 mens du holder doseringsknappen inne. Tegnet [0] må være synlig i doseringsvinduet. Ikke injiser i kroppen din.

Ved å luften pennen fjerner du luft fra nålen og patronen og sikrer at pennen fungerer riktig. Pennen din er luftet når du ser litt medisin på spissen av nålen.

- Hvis du ikke ser medisin, må du gjenta trinn 7-9, men ikke mer enn 2 ganger.
- Hvis du fortsatt ikke ser medisin, ta en ny nål og gjenta trinn 7-9, men ikke mer enn 1 gang.
- Hvis du fortsatt ikke ser medisin, kontakt den lokale representanten for Lilly som står i pakningsvedlegget.

Injeksjon med Mounjaro KwikPen

Trinn 10:

Velg et sted for injeksjonen din.

- Du eller noen andre kan injisere medisinen i låret eller magen din minst 5 cm fra navlen.
- Noen andre må gi injeksjonen på baksiden av overarmen din.

Bytt injeksjonssted hver uke. Du kan bruke samme område av kroppen din, men sørg for at du velger en annen injeksjonssted i det området.

Trinn 11:

Vri på doseringsknappen til den stopper og tegnet [1] er synlig i doseringsvinduet. Tegnet [1] tilsvarer en full dose. Trinn 12:

Sett nålen inn i huden din.

- Injiser medisinen ved å trykke inn doseringsknappen til den stopper. Tell deretter sakte til 5 mens du holder doseringsknappen inne. Tegnet [0] må være synlig i doseringsvinduet før du fjerner nålen.

Trinn 13:

Fjern nålen fra huden din. En dråpe medisin på spissen av nålen er normalt. Det påvirker ikke dosen din.

Kontroller tegnet [0] i doseringsvinduet. Hvis du ser tegnet [0] i doseringsvinduet, har du fått hele dosen. Hvis du ikke ser [0] i doseringsvinduet, sett nålen tilbake i huden din og fullfør injeksjonen. Still ikke inn en ny dose. Hvis du fortsatt tror at du ikke har fått hele dosen, start ikke på nytt eller gjenta ikke injeksjonen din. Se avsnittet 'Oppbevaring av din Mounjaro KwikPen' eller 'Ofte stilte spørsmål' for mer informasjon.

Trinn 14:

Hvis du ser en dråpe blod etter å ha fjernet nålen fra huden din, trykk forsiktig på injeksjonsstedet med en gasbind eller en bomullsdott. Ikke gni over injeksjonsstedet.

Trinn 15:

Sett forsiktig den ytre nålebeskytteren tilbake på nålen.

Trinn 16:

Skru av nålen med hetten på og kast den i en beholder for skarpt avfall (se 'Kasting av Mounjaro KwikPen og pennåler').

Oppbevar ikke pennen med nålen på, for å unngå lekkasje, tilstopping av nålen og innstrømming av luft i pennen.

Trinn 17:

Sett hetten tilbake på pennen.

Oppbevar ikke pennen uten hetten på.

Oppbevaring av din Mounjaro KwikPen

Ubrukte penner:

Oppbevar ubrukte penner i kjøleskapet ved 2°C til 8°C.

Penner som oppbevares i kjøleskapet og som ennå ikke er åpnet, kan brukes frem til utløpsdatoen som står på etiketten.

Ikke oppbevar pennen i fryseren. Kast pennen hvis den har vært frosset.

Brukte penner:

Du kan oppbevare den brukte pennen din ved romtemperatur under 30°C etter injeksjonen.

Hold pennen og nålene utenfor barns syns- og rekkevidde.

Kast pennen 30 dager etter første bruk, selv om det fortsatt er medisin igjen i pennen.

Kast pennen etter at du har mottatt dine 4 ukentlige doser. Hvis du prøver å injisere den gjenværende medisinen, kan det resultere i en ufullstendig dose, selv om det fortsatt er medisin igjen i pennen.

Gjenværende medisin:

Etter at du har fullført din fjerde injeksjon, vil du se noe gjenværende medisin, og det er normalt. Denne gjenværende medisinen sørger for at pennen fungerer korrekt.

Kast pennen.

Selv om det fortsatt er medisin igjen i pennen, ikke prøv å injisere den gjenværende medisinen. Et forsøk på å injisere den gjenværende medisinen kan resultere i en ufullstendig dose.

Kasting av Mounjaro KwikPen og pennåler

Kast brukte pennåler i en beholder for skarpt avfall eller en hard plast beholder med et solid lokk.

Ikke kast løse pennåler i husholdningsavfallet.

Kast den brukte pennen i henhold til instruksjonene fra helsepersonellet ditt.

Spør helsepersonellet ditt om muligheter for sikker avhending av penner og beholder for skarpt avfall.

Når de er brukt, skal ikke beholdere for skarpt avfall brukes på nytt.

Ofte stilte spørsmål

Hvis du ikke klarer å fjerne pennehetten, vri pennehetten forsiktig frem og tilbake og trekk den rett av.

Hvis du ikke kan vri doseringsknappen til du ser tegnet [1] i doseringsvinduet:

- kast pennen, inkludert den ubrukte medisinen. Det kan være at det ikke er nok medisin igjen i pennen til å gi en full dose. Prøv ikke å injisere den gjenværende medisinen.

Hvis doseringsknappen er vanskelig å trykke inn:

- ved å trykke doseringsknappen saktere, blir injeksjonen lettere.
- nålen din kan være tett. Fest en ny nål og luft ut pennen.
- det kan være støv, mat eller væske i pennen. Kast pennen og få en ny penn.

Hvis du har flere spørsmål eller problemer med din Mounjaro KwikPen, kontakt Lilly eller rådfør deg med legen din, sykepleier eller apotek.

Medisinkalender

Bruk Mounjaro KwikPen 1 Jeg injiserer min ukentlige dose på
ganger per uke følgende datoer:

Skriv ned dagen i uken
du velger for injeksjonen.

Injiser hver svak opp

samme dag (for eksempel: (dag/måned) (dag/måned) (dag/måned) (dag/måned)
mandag).

Sist godkjent i