

## Bipacksedel: information för patient

Mounjaro, 2,5 mg/dos KwikPen, injektionslösning i förfylld penna Mounjaro, 5 mg/dos KwikPen, injektionslösning i förfylld penna  
Mounjaro, 7,5 mg/dos KwikPen, injektionslösning i förfylld penna  
Mounjaro, 10 mg/dos KwikPen, injektionslösning i förfylld penna  
Mounjaro, 12,5 mg/dos KwikPen, injektionslösning i förfylld penna Mounjaro, 15 mg/dos KwikPen, injektionslösning i förfylld penna  
tirzepatid

Detta läkemedel är föremål för ytterligare övervakning. Det gör att ny säkerhetsinformation snabbt kan fastställas. Du kan bidra till detta genom att rapportera alla biverkningar du eventuellt upplever. I slutet av avsnitt 4 kan du läsa hur du gör det.

Läs noga igenom hela bipacksedeln innan du börjar använda detta läkemedel eftersom den innehåller viktig information för dig.

- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Har du fler frågor? Kontakta då din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.
- Ge inte detta läkemedel till andra, eftersom det är ordinerat endast till dig. Det kan vara skadligt för andra, även om de har samma symtom som du.
- Får du biverkningar som nämns i avsnitt 4? Eller får du en biverkning som inte nämns i denna bipacksedel? Kontakta då din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Innehåll i denna bipacksedel

1. Vad är Mounjaro KwikPen och vad används det för?
2. När ska du inte använda detta läkemedel eller vara extra försiktig?
3. Hur använder du detta läkemedel?
4. Möjliga biverkningar
5. Hur förvarar du detta läkemedel?
6. Förpackningens innehåll och övrig information

1. Vad är Mounjaro KwikPen och vad används detta läkemedel för?

Mounjaro innehåller den aktiva substansen tirzepatid och används för behandling av vuxna med typ 2-diabetes mellitus. Mounjaro sänker blodsockernivån i kroppen endast när blodsockernivån är hög.

Mounjaro används också för behandling av vuxna med fetma eller övervikt (med ett BMI på minst 27 kg/m<sup>2</sup>). Mounjaro påverkar aptitregleringen, vilket kan hjälpa dig att äta mindre och minska din kroppsvikt.

Vid typ 2-diabetes används Mounjaro:

- som enda behandling om du inte kan använda metformin (ett annat läkemedel för behandling av diabetes);
- tillsammans med andra läkemedel för behandling av diabetes om dessa inte är tillräckliga för att kontrollera ditt blodsocker (mängden socker i ditt blod). Dessa kan vara läkemedel som du tar oralt och/eller insulin som ges via injektion.

Mounjaro används också i kombination med diet och motion för viktminskning och för att hålla vikten under kontroll hos vuxna med:

- ett BMI på 30 kg/m<sup>2</sup> eller högre (fetma) eller
- ett BMI mellan 27 kg/m<sup>2</sup> och 30 kg/m<sup>2</sup> (övervikt) och viktrelaterade hälsoproblem (såsom prediabetes, typ 2-diabetes, högt blodtryck, onormala nivåer av fetter i blodet, andningsproblem under sömnen kallad 'obstruktiv sömnapné' eller en historia av hjärtinfarkt, stroke eller problem med blodkärlen)

BMI (Body Mass Index) är ett mått på din vikt i förhållande till din längd.

Hos patienter med obstruktiv sömnapné (OSA) och fetma kan Mounjaro användas med eller utan terapi med positivt luftvägstryck (positive airway pressure, PAP).

Det är viktigt att du fortsätter följa de råd du fått från din läkare, sjuksköterska eller apotekare om diet och motion.

## 2. När ska du inte använda detta läkemedel eller vara extra försiktig med det?

När ska du inte använda detta läkemedel?

- Du är allergisk mot någon av substanserna i detta läkemedel. Dessa substanser kan du hitta i avsnitt 6.

När ska du vara extra försiktig med detta läkemedel?

Kontakta din läkare, sjuksköterska eller apotekare innan du använder detta läkemedel om:

- du har allvarliga problem med matsmältningen av mat eller mat som stannar längre än normalt i din mage stannar (inklusive svår gastropares);
- du någonsin har haft pankreatit (inflammation i bukspottkörteln som kan orsaka svår smärta i magen och ryggen som inte försvinner);
- du har ett problem med dina ögon (diabetisk retinopati eller makulaödem);
- du använder ett sulfonylureaderivat (ett annat läkemedel för behandling av diabetes) eller insulin för din diabetes, eftersom lågt blodsocker (hypoglykemi) kan uppstå. Din läkare kan behöva justera dosen av dessa andra läkemedel för att minska denna risk.

När du börjar behandlingen med Mounjaro kan du i vissa fall uppleva vätskeförlust/uttorkning, till exempel på grund av kräkningar, illamående och/eller diarré. Detta kan leda till nedsatt njurfunktion. Det är viktigt att undvika uttorkning genom att dricka mycket vätska. Kontakta din läkare om du har frågor eller är orolig.

Om du vet att du ska genomgå en operation där du kommer att hållas under narkos (sova), berätta för din läkare att du använder Mounjaro.

Barn och ungdomar under 18 år

Detta läkemedel ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte har studerats i denna åldersgrupp.

Använder du andra läkemedel?

Använder du andra läkemedel utöver Mounjaro, har du nyligen gjort det eller finns det möjlighet att du snart kommer att använda andra läkemedel? Berätta det då för din läkare, sjuksköterska eller apotekare.

Graviditet

Är du gravid, tror du att du är gravid, vill du bli gravid eller ammar du? Kontakta då din läkare innan du använder detta läkemedel. Detta läkemedel ska inte användas under graviditet eftersom effekterna av detta läkemedel på ett ofött barn inte är kända. Det rekommenderas därför att använda preventivmedel under användningen av detta läkemedel.

#### Amning

Det är inte känt om tirzepatid övergår i bröstmjolk. En risk för nyfödda/spädbarn kan inte uteslutas. Om du ammar eller planerar att amma, kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel. Du och din läkare måste besluta om du ska sluta amma eller använda Mounjaro senare.

#### Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att detta läkemedel påverkar din körförmåga och din förmåga att använda maskiner. Om du använder Mounjaro i kombination med ett sulfonylureaderivat eller insulin kan dock lågt blodsocker (hypoglykemi) uppstå vilket kan minska din koncentrationsförmåga. Undvik att köra fordon eller använda maskiner om du får symtom på lågt blodsocker, t.ex. huvudvärk, dåsighet, svaghet, yrsel, hungerkänsla, förvirring, irritabilitet, snabb hjärtfrekvens och svettning (se avsnitt 4). Se avsnitt 2, 'När ska du vara extra försiktig med detta läkemedel?' för information om ökad risk för lågt blodsocker. Kontakta din läkare för mer information.

#### Mounjaro KwikPen innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, vilket innebär att det i huvudsak är 'natriumfritt'.

#### Mounjaro KwikPen innehåller bensylalkohol

Detta medel innehåller 5,4 mg bensylalkohol i varje dos om 0,6 ml. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner.

Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd om du är gravid eller ammar, eller om du har en lever- eller njursjukdom. Stora mängder bensylalkohol kan nämligen ackumuleras i din kropp och orsaka biverkningar (så kallad metabol acidosis).

### 3. Hur använder du detta medel?

Använd alltid detta läkemedel exakt som din läkare eller apotekspersonal har sagt till dig. Är du osäker på rätt användning? Kontakta då din läkare eller apotekspersonal.

Efter att alla doser har administrerats korrekt kan en liten mängd medicin finnas kvar i pennan. Försök inte använda den kvarvarande medicinen. Efter administrering av de fyra doserna ska pennan kasseras på rätt sätt.

#### Hur mycket du ska använda

Startdosen är 2,5 mg en gång i veckan under 4 veckor. Efter dessa 4 veckor kommer din läkare att öka din dos till 5 mg en gång i veckan.

Din läkare kan öka din dos med steg om 2,5 mg till 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg eller 15 mg en gång i veckan, om det behövs för dig. Din läkare kommer att be dig stanna på en viss dos i minst 4 veckor innan du går till en högre dos.

Ändra inte din dos om inte din läkare har sagt det till dig.

## Välja när du ska använda Mounjaro

Du kan använda din penna när som helst på dagen, med eller utan mat. Om möjligt bör du alltid använda pennan på samma veckodag. För att hjälpa dig att komma ihåg när du ska använda Mounjaro kan du skriva det i en kalender.

Vid behov kan du också ändra dagen då du injicerar Mounjaro varje vecka, så länge det har gått minst 3 dagar sedan din senaste injektion. Fortsätt med en gång i veckan dosering på den nya dagen efter att du har valt en ny administreringsdag.

## Hur ska du injicera Mounjaro KwikPen?

Mounjaro injiceras under huden (subkutan injektion) i din buk – minst 5 cm från naveln – eller under huden på ditt lår eller överarm. Du kan behöva hjälp av någon annan om du vill injicera i din överarm.

Om du vill kan du använda samma område av din kropp varje vecka. Se dock till att du väljer en annan injektionsplats inom det området varje gång. Om du också injicerar insulin, välj en annan injektionsplats för den injektionen.

Läs noggrant 'Användarhandboken' för pennan innan du använder Mounjaro KwikPen.

## Testa hur mycket socker det finns i ditt blod (blodglukos)

Om du använder Mounjaro i kombination med ett sulfonureid eller insulin, är det viktigt att du testar ditt blodsocker enligt instruktionerna från din läkare, sjuksköterska eller apotekare (se avsnitt 2 'När ska du vara extra försiktig med detta läkemedel?').

## Har du använt för mycket av detta läkemedel?

Om du har använt för mycket av detta läkemedel än du borde, kontakta omedelbart din läkare. För mycket av detta läkemedel kan orsaka lågt blodsocker (hypoglykemi) vilket kan göra att du känner dig illamående eller kräks.

## Har du glömt att använda detta läkemedel?

Om du har glömt att injicera en dos och,  
det är 4 dagar eller mindre sedan du skulle ha injicerat Mounjaro, använd det så snart du kommer ihåg. Injicera sedan din nästa dos som vanligt på din normala schemalagda dag.  
det är mer än 4 dagar sedan du skulle ha injicerat Mounjaro, hoppa över den missade dosen. Injicera sedan din nästa dos som vanligt på din normala schemalagda dag.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Det måste vara minst 3 dagar mellan två doser.

## Om du slutar använda detta läkemedel

Sluta inte använda Mounjaro utan att rådfråga din läkare. Om du slutar använda Mounjaro och du har typ 2-diabetes, kan ditt blodsocker stiga.

Har du fler frågor om användningen av detta läkemedel? Kontakta då din läkare, sjuksköterska eller apotekare.

## 4. Möjliga biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel ha biverkningar, även om inte alla får dem.

### Allvarliga biverkningar

Ibland (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

- Inflammerad bukspottkörtel (akut pankreatit) som kan orsaka svår smärta i magen och ryggen och som inte går över. Du bör omedelbart rådfråga en läkare om du upplever sådana symtom.

Sällan (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

- Allvarliga allergiska reaktioner (t.ex. anafylaktisk reaktion, angioödem). Du bör omedelbart söka medicinsk hjälp och informera din läkare om du upplever symtom som andningssvårigheter, snabb svullnad av läppar, tunga och/eller hals med svårigheter att svälja och snabb hjärtfrekvens.

### Andra biverkningar

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

- Illamående
- Diarré
- Magont (buksmärta) rapporterades hos patienter som behandlades för viktkontroll
- Kräkningar rapporterades hos patienter som behandlades för viktkontroll
- Förstoppning rapporterades hos patienter som behandlades för viktkontroll

Dessa biverkningar är vanligtvis inte allvarliga. Illamående, diarré och kräkningar är vanligast i början av behandlingen med tirzepatid, men minskar hos de flesta patienter med tiden.

- Lågt blodsocker (hypoglykemi) är mycket vanligt när tirzepatid används i kombination med läkemedel som innehåller ett sulfonureid och/eller insulin. Om du använder ett sulfonureid eller insulin för typ 2-diabetes kan dosen behöva sänkas medan du använder tirzepatid (se avsnitt 2 'När ska du vara extra försiktig med detta läkemedel?'). Symtom på lågt blodsocker kan vara: huvudvärk, dåsighet, svaghet, yrsel, hungerkänsla, förvirring, irritabilitet, snabb hjärtfrekvens och svettning. Din läkare kan berätta hur lågt blodsocker ska behandlas.

Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare)

- Lågt blodsocker (hypoglykemi), när tirzepatid används för typ 2-diabetes i kombination med både metformin och en natriumglukos-cotransporter-2-hämmare (ett annat läkemedel för behandling av diabetes)
- Allergisk reaktion (överkänslighet) (t.ex. hudutslag, klåda och eksem)
- Yrsel rapporterades hos patienter som behandlades för viktkontroll
- Lågt blodtryck rapporterades hos patienter som behandlades för viktkontroll
- Minskad aptit rapporterades hos patienter som behandlades för typ 2-diabetes
- Buksmärta rapporterades hos patienter som behandlades för typ 2-diabetes
- Kräkningar rapporterades hos patienter som behandlades för typ 2-diabetes detta minskar vanligtvis med tiden
- Magbesvär (dyspepsi)
- Förstoppning rapporterades hos patienter som behandlades för typ 2-diabetes
- Uppblåsthet i buken
- Rapningar (uppstötningar)

- Gasbildning
- Reflux eller halsbränna (även kallad gastroesofageal refluxsjukdom - GERD - en sjukdom som orsakas av att magsyra kommer upp i munnen via matstrupen)
- Håravfall rapporterades hos patienter som behandlades för viktkontroll
- Känna sig trött (trötthet)
- Reaktioner på injektionsstället (t.ex. klåda eller rodnad)
- Snabb puls
- Ökning av pankreasenzymer (såsom lipas och amylas) i blodet
- Förhöjda kalcitoninnivåer i blodet hos patienter som behandlades för viktkontroll

Ibland (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

- Lågt blodsocker (hypoglykemi), när tirzepatid används tillsammans med metformin för typ 2-diabetes
- Gallstenar
- Gallblåseinflammation
- Viktnedgång rapporterades hos patienter som behandlades för typ 2-diabetes
- Smärta på injektionsstället
- Förhöjda kalcitoninnivåer i blodet hos patienter som behandlades för typ 2-diabetes eller för OSA med fetma
- Mat och dryck smakar annorlunda än normalt
- Mer eller mindre känsla i huden
- Fördröjning i magsäckens tömning

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, kontakta din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet som anges i bilaga V.\* Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa oss att få mer information om säkerheten för detta läkemedel.

5. Hur ska detta läkemedel förvaras?

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på etiketten på pennan och på kartongen efter EXP. Det anger en månad och ett år. Sista dagen i den månaden är utgångsdatumet.

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Får inte frysas. Om pennan har varit fryst, ANVÄND INTE.

Mounjaro KwikPen kan förvaras utanför kylskåpet vid en temperatur under 30°C i totalt 30 dagar efter första användning och därefter måste pennan kasseras.

Använd inte detta läkemedel om du märker att pennan är skadad, eller om läkemedlet är grumligt eller missfärgat eller innehåller partiklar.

Spola inte ner läkemedel i avloppet eller toaletten och kasta dem inte i soporna. Fråga din apotekare vad du ska göra med läkemedel som du inte längre använder. Om du kasserar läkemedel på rätt sätt förstörs de på ett ansvarsfullt sätt och hamnar inte i miljön.

## 6. Förpackningens innehåll och övrig information

Vilka ämnen finns i detta läkemedel?

Den aktiva substansen i detta läkemedel är tirzepatid.

Mounjaro 2,5 mg/dos KwikPen: Varje dos innehåller 2,5 mg tirzepatid i 0,6 ml lösning. Varje förfylld penna med flera doser innehåller 10 mg tirzepatid i 2,4 ml (4,17 mg/ml). Varje penna ger 4 doser om 2,5 mg. Mounjaro 5 mg/dos KwikPen: Varje dos innehåller 5 mg tirzepatid i 0,6 ml lösning. Varje förfylld penna med flera doser innehåller 20 mg tirzepatid i 2,4 ml (8,33 mg/ml). Varje penna ger 4 doser om 5 mg. Mounjaro 7,5 mg/dos KwikPen: Varje dos innehåller 7,5 mg tirzepatid i 0,6 ml lösning. Varje förfylld penna med flera doser innehåller 30 mg tirzepatid i 2,4 ml (12,5 mg/ml). Varje penna ger 4 doser om 7,5 mg. Mounjaro 10 mg/dos KwikPen: Varje dos innehåller 10 mg tirzepatid i 0,6 ml lösning. Varje förfylld penna för flera doser innehåller 40 mg tirzepatid i 2,4 ml (16,7 mg/ml). Varje penna ger 4 doser om 10 mg. Mounjaro 12,5 mg/dos KwikPen: Varje dos innehåller 12,5 mg tirzepatid i 0,6 ml lösning. Varje förfylld penna för flera doser innehåller 50 mg tirzepatid i 2,4 ml (20,8 mg/ml). Varje penna ger 4 doser om 12,5 mg. Mounjaro 15 mg/dos KwikPen: Varje dos innehåller 15 mg tirzepatid i 0,6 ml lösning. Varje förfylld penna med flera doser innehåller 60 mg tirzepatid i 2,4 ml (25 mg/ml). Varje penna ger 4 doser om 15 mg.

De andra ämnena i detta läkemedel är dinatriumvätefosfatheptahydrat (E339), bensylalkohol (E1519) (se avsnitt 2 under: 'Mounjaro KwikPen innehåller bensylalkohol' för mer information), glycerol, fenol, natriumklorid, natriumhydroxid (se avsnitt 2 under: 'Mounjaro innehåller natrium' för mer information), koncentrerad saltsyra och vatten för injektioner.

Hur ser Mounjaro ut och hur mycket finns det i en förpackning?

Mounjaro är en klar, färglös till svagt gul lösning för injektion i en förfylld penna (KwikPen). Varje KwikPen innehåller 2,4 ml injektionslösning (4 doser om 0,6 ml) och ett överskott för avluftning.

Nålar ingår inte.

Förpackningsstorlekar om 1 och 3 KwikPennor.

Alla förpackningsstorlekar kanske inte är tillgängliga i ditt land.

Innehavare av godkännande för försäljning

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna

Tillverkare

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino, Florens (FI), Italien

Lilly S.A., Avda. de la Industria, 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien

Lilly France, 2, rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Frankrike

Millmount Healthcare Limited, Block 7 City North Business Campus, Stamullen, K32 YD60, Irland

Millmount Healthcare Limited, IDA Science And Technology Park, Mullagharlin, Dundalk, Co. Louth, A91 DETO, Irland

För all information om detta läkemedel, kontakta den lokala representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Belgique/België/Belgien  
Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Lietuva  
Eli Lilly Lietuva

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

**България**

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България  
тел. + 359 2 491 41 40

**Luxemburg**

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.  
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

**Tjeckien**

ELI LILLY ČR, s.r.o.  
Tel: + 420 234 664 111

**Ungern**

Lilly Hungária Kft.  
Tel: + 36 1 328 5100

**Danmark**

Eli Lilly Danmark A/S  
Tlf.: +45 45 26 60 00

**Malta**

Charles de Giorgio Ltd.  
Tel: + 356 25600 500

**Tyskland**

Lilly Deutschland GmbH  
Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

**Nederländerna**

Eli Lilly Nederland B.V.  
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

**Estland**

Eli Lilly Nederland B.V.  
Tel: +372 6 817 280

**Norge**

Eli Lilly Norge A.S.  
Tlf: + 47 22 88 18 00

**Grekland**

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ A.E.B.E.  
Tel: +30 210 629 4600

**Österrike**

Eli Lilly Ges.m.b.H.  
Tel: + 43-(0) 1 20609 1270

**Spanien**

Lilly S.A.  
Tel: + 34-91 663 50 00

**Polen**

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.  
Tel: +48 22 440 33 00

**Frankrike**

Lilly Frankrike  
Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

**Portugal**

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos,  
Lda  
Tel: + 351-21-4126600

**Kroatien**

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.  
Tel: +385 1 2350 999

**Rumänien**

Eli Lilly România S.R.L.  
Tel: + 40 21 4023000

**Irland**

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited  
Tel: + 353-(0) 1 661 4377

**Slovenien**

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o  
Tel: +386 (0)1 580 00 10

**Ísland**

Icepharma hf.  
Sími + 354 540 8000

**Slovenská republika**

Eli Lilly Slovakia s.r.o.  
Tel: + 421 220 663 111

**Italia**

Eli Lilly Italia S.p.A.  
Tel: + 39- 055 42571

**Suomi/Finland**

Oy Eli Lilly Finland Ab  
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος  
Phadisco Ltd  
Τηλ: +357 22 715000

Sverige  
Eli Lilly Sweden AB  
Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija  
Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā  
Tel: +371 67364000

Denna bipacksedel godkändes senast

Andra informationskällor

Mer information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: <http://www.ema.europa.eu>

## Bruksanvisning

Förfylld penna med flera doser

Varje penna innehåller 4 fasta doser, en dos injiceras varje vecka.

Mounjaro, 2,5 mg/dos KwikPen, injektionslösning i förfylld penna

Mounjaro, 5 mg/dos KwikPen, injektionslösning i förfylld penna

Mounjaro, 7,5 mg/dos KwikPen, injektionslösning i förfylld penna

Mounjaro, 10 mg/dos KwikPen, injektionslösning i förfylld penna

Mounjaro, 12,5 mg/dos KwikPen, injektionslösning i förfylld penna

Mounjaro, 15 mg/dos KwikPen, injektionslösning i förfylld penna

Tirzepatid

Denna bruksanvisning innehåller information om injektion med Mounjaro KwikPen

Viktig information som du behöver veta innan du injicerar med Mounjaro KwikPen.

Läs denna bruksanvisning och bipacksedeln innan du börjar injicera med Mounjaro KwikPen och varje gång du får en ny penna. Det kan finnas ny information. Denna information ersätter inte samtalet med din läkare, sjuksköterska eller apotekare om ditt medicinska tillstånd eller behandling.

Mounjaro KwikPen är en engångsförfylld penna med flera doser. Pennan innehåller 4 fasta doser, för att administrera en dos per vecka. Injicera en enda injektion per vecka, under huden (subkutant).

Kasta bort pennan efter 4 doser, inklusive den oanvända medicinen. Pennan är utformad så att du inte kan vrida en full dos efter att du har gett dig själv de 4 veckodoserna. Injicera inte den kvarvarande medicinen. Överför inte medicinen från din penna till en spruta.

Dela inte din Mounjaro KwikPen med andra, även om en ny nål används. Du kan ge dem en allvarlig infektion eller själv få en allvarlig infektion från dem.

Personer som är blinda eller har synproblem bör inte använda pennan utan hjälp av en person som är utbildad i att använda pennan.

Handledning för delar  
Delar av Mounjaro KwikPen

Patron-        Pennkropp    Doserings-  
Pennlock     Patron, äldre   indikator

Nål lämplig för KwikPen (om du inte vet vilken pennål du ska använda, kontakta din vårdgivare)

Delar av Mounjaro Kwikpen

Nål lämplig för KwikPen (om du inte vet vilken pennål du ska använda, kontakta din vårdgivare)

Vad du behöver för att ge din injektion

Mounjaro KwikPen

Pennål lämplig för KwikPen (om du inte vet vilken pennål du ska använda, kontakta din vårdgivare)

Alkoholservett och gasväv eller bomullstuss

Behållare för vassa föremål eller hushållsbehållare

Förbereda injektionen med Mounjaro KwikPen

Steg 1:

Tvätta händerna med tvål och vatten.

Steg 2:

Dra av pennlocket rakt av.

Kontrollera pennan och etiketten. Använd inte pennan om:

- namnet på läkemedlet eller dosstyrkan inte stämmer överens med ditt recept.
- pennan har gått ut (EXP) eller ser skadad ut.
- läkemedlet har varit fryst, innehåller partiklar, är grumligt eller missfärgat. Mounjaro ska vara färglös till ljusgul.

Steg 3:

Torka av den röda inre förseglingen med en alkoholservett.

Steg 4:

Ta en ny nål. Använd alltid en ny nål för varje injektion för att undvika infektioner och igensättning av nålen.

Ta bort pappersskyddet från det yttre nålskyddet.

Steg 5:

Tryck nålen med locket rakt på pennan och skruva fast nålen ordentligt.

Steg 6:

- a) Ta bort det yttre nålskyddet och kasta det inte. Du behöver det senare.
- b) Ta bort det inre nålskyddet och kasta det.

- a. Yttre      b. Inre nålskydd      nålskydd

Steg 7:

Vrid doseringsknappen långsamt tills du hör 2 klick och den långa strecklinjen [-] blir synlig i doseringsfönstret. Detta är positionen för att lufta din penna. Detta kan korrigeras genom att vrida doseringsknappen i valfri riktning tills den långa strecklinjen står precis bredvid dosindikatorn.

Steg 8:

Håll pennan upprätt med nålen uppåt.  
Knacka försiktigt på patronhållaren för att samla luftbubblorna högst upp.

Steg 9:

Spruta lite medicin i luften genom att trycka in doseringsknappen tills den stannar. Räkna sedan långsamt till 5 medan du håller doseringsknappen intryckt. Tecknet [0] måste vara synlig i doseringsfönstret. Injicera inte i din kropp.

Genom att lufta din penna tar du bort luft från nålen och patronen och säkerställer att din penna fungerar korrekt. Din penna är luftad om du ser lite medicin vid nålens spets.

- Om du inte ser någon medicin måste du upprepa steg 7-9, men inte mer än 2 gånger.
- Om du fortfarande inte ser någon medicin, ta en ny nål och upprepa steg 7-9, men inte mer än 1 gång.
- Om du fortfarande inte ser någon medicin, kontakta den lokala representanten för Lilly som anges i bipacksedeln.

### Injektion med Mounjaro KwikPen

Steg 10:

Välj en plats för din injektion.

- Du eller någon annan kan injicera medicinen i ditt lår eller buk minst 5 cm från naveln.
- Någon annan måste ge injektionen på baksidan av din överarm.

Byt injektionsställe varje vecka. Du kan använda samma område av din kropp, men se till att du väljer en Annan injektionsplats i det området.

Steg 11:

Vrid doseringsknappen tills den stannar och symbolen [1] är synlig i doseringsfönstret. Symbolen [1] motsvarar en fullständig dos. Steg 12:

Sätt nålen i huden.

- Injicera läkemedlet genom att trycka in doseringsknappen tills den stannar. Räkna sedan långsamt till 5 medan du håller doseringsknappen intryckt. Symbolen [0] måste vara synlig i doseringsfönstret innan du tar bort nålen.

Steg 13:

Ta bort nålen från din hud. En droppe medicin på spetsen av nålen är normalt. Det påverkar inte din dos.

Kontrollera tecknet [0] i doseringsfönstret. Om du ser tecknet [0] i doseringsfönstret, har du fått hela dosen. Om du inte ser [0] i doseringsfönstret, sätt tillbaka nålen i din hud och avsluta din injektion. Ställ inte in en ny dos. Om du fortfarande tror att du inte har fått hela dosen, börja inte om eller upprepa inte din injektion. Se avsnittet 'Förvaring av din Mounjaro KwikPen' eller 'Vanliga frågor' för mer information.

**Steg 14:**

Om du ser en bloddroppe efter att ha tagit bort nålen från huden, tryck försiktigt på injektionsstället med en gasväv eller bomullstuss. Gnugga inte på injektionsstället.

**Steg 15:**

Sätt försiktigt tillbaka det yttre nålskyddet på nålen.

**Steg 16:**

Skruva av nålen med skydd och kasta den i en behållare för vassa föremål (se 'Bortskaffande av Mounjaro KwikPen och pennnålar').

Förvara inte pennan med nålen på, för att undvika läckage, igensättning av nålen och luftinträning i pennan.

**Steg 17:**

Sätt tillbaka locket på pennan.

Förvara inte pennan utan locket på.

**Förvaring av din Mounjaro KwikPen**

**Oanvända pennor:**

Förvara oanvända pennor i kylskåp vid 2°C till 8°C.

Pennor som förvaras i kylskåp och som ännu inte har öppnats kan användas fram till utgångsdatumet som står på etiketten.

Förvara inte pennan i frysen. Kassera pennan om den har varit fryst.

**Använda pennor:**

Du kan förvara din använda penna vid rumstemperatur under 30°C efter din injektion.

Förvara din penna och nålar utom syn- och räckhåll för barn.

Kassera pennan 30 dagar efter första användning, även om det fortfarande finns medicin kvar i pennan.

Kassera pennan efter att du har fått dina 4 veckovisa doser. Om du försöker injicera den kvarvarande medicinen kan det resultera i en ofullständig dos, även om det fortfarande finns medicin kvar i pennan.

**Kvarvarande medicin:**

Efter att du har avslutat din fjärde injektion kommer du att se lite kvarvarande medicin och det är normalt. Denna kvarvarande medicin säkerställer att pennan fungerar korrekt. Kassera pennan.

Även om det fortfarande finns medicin kvar i pennan, försök inte injicera den kvarvarande medicinen. Ett försök att injicera den kvarvarande medicinen kan resultera i en ofullständig dos.

## Kassering av Mounjaro KwikPen och pennnålar

Kassera använda pennnålar i en behållare för vassa föremål eller en hård plast behållare med ett stadigt lock.

Kassera inte lösa pennnålar i ditt hushållsavfall.

Kassera den använda pennan enligt instruktionerna från din vårdgivare.

Fråga din vårdgivare om möjligheterna att säkert kassera pennor och behållare för vassa föremål.

Behållare för vassa föremål får inte återanvändas när de väl har använts.

## Vanliga frågor

Om du inte kan ta bort pennlocket, vrid försiktigt pennlocket fram och tillbaka och dra det rakt av.

Om du inte kan vrida doseringsknappen tills du ser tecknet [1] i doseringsfönstret:

- kasta pennan, inklusive den oanvända medicinen. Det kan hända att det inte finns tillräckligt med medicin kvar i pennan för att ge en fullständig dos. Försök inte injicera den återstående medicinen.

Om doseringsknappen är svår att trycka in:

- genom att trycka in doseringsknappen långsammare blir injektionen lättare.
- din nål kan vara igensatt. Fäst en ny nål och lufta pennan.
- det kan finnas damm, mat eller vätska i pennan. Kasta pennan och hämta en ny penna.

Om du har fler frågor eller problem med din Mounjaro KwikPen, kontakta Lilly eller rådfråga din läkare, sjuksköterska eller apotekare.

## Medicinkalender

Använd Mounjaro KwikPen 1 gång per vecka

Skriv ner veckodagen

som du väljer för injektionen.

Injicera varje svag på

samma dag (till exempel: (dag/månad) (dag/månad) (dag/månad) (dag/månad) måndag).

Jag injicerar min veckodos på följande datum:

Senast godkänd i