

Beipackzettel: Information für den Patienten

MOVICOL® 13,8 g Beutel, Pulver zur Lösung
Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Kaliumchlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden denn es enthält wichtige Informationen für Sie. Verwenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in diesem Beipackzettel beschrieben oder wie Ihr Arzt, Apotheker oder Pflegekraft Ihnen das gesagt hat.

- Bewahren diese Packungsbeilage. Vielleicht haben Sie ihn später wieder nötig.
- Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie dann Ihren Apotheker.
- Bekommen Sie Beschwerden von einem von den Nebenwirkungen die in Abschnitt 4 stehen? Oder bekommen Sie eine Nebenwirkung die nicht in dieser Packungsbeilage steht? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt, Apotheker oder Krankenpfleger.
- Wird Ihre Beschwerde nicht weniger, oder wird sie sogar schlimmer? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt.

Inhalt dieser Packungsbeilage Beipackzettel:

1. Was ist Movicol und wofür wird es verwendet?
2. Wann dürfen Sie Movicol nicht verwenden oder müssen Sie besonders vorsichtig damit sein?
3. Wie verwendet Sie Movicol?
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie bewahren Sie Movicol auf?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Movicol und wofür wird es verwendet?

Der Name von diesem Arzneimittel ist Movicol 13,8 g Beutel, Pulver zur Herstellung eines Getränks. Es ist ein Abführmittel zur Behandlung von Verstopfung bei Erwachsenen Erwachsene, Jugendliche und ältere Menschen. Der Gebrauch bei Kindern unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

Movicol hilft Ihnen, einen leichteren Stuhlgang zu machen sogar wenn Sie bereits lange Zeit verstopft sind. Movicol ist auch wirksam bei sehr starker Verstopfung, fäkale Impaktion genannt.

2. Wann dürfen Sie Movicol nicht verwenden oder müssen Sie besonders vorsichtig damit sein?

Nehmen Sie Movicol nicht ein wenn Ihr Arzt gesagt hat dass Sie:

- eine innere Verstopfung haben (Darmverschluss, Ileus)
- eine perforierte Darmwand haben
- eine schwere Entzündungskrankheit des Darms haben, wie Colitis ulcerosa, Krankheit von Crohn oder toxisches Megakolon
- allergisch sind gegen einen der Stoffe in diesem Arzneimittel. Diese Stoffe können Sie finden in Abschnitt 6 dieser dieser Packungsbeilage.

Wann müssen Sie besonders vorsichtig sein mit Movicol?

Bei der Anwendung von Movicol müssen Sie ausreichend Flüssigkeit bleiben einnehmen. Die Movicol Lösung ist kein Ersatz für die reguläre Flüssigkeitsaufnahme.

Herzerkrankungen

Befolgen die speziellen Anweisungen bei Rubrik 3 wenn Sie Movicol einnehmen zur fäkalen Impaktion.

Verwenden Sie noch andere Arzneimittel?

Nehmen Sie neben Movicol noch andere Arzneimittel, haben Sie das kürzlich getan oder werden Sie dies vielleicht bald tun? Sagen Sie das dann Ihr Arzt oder Apotheker.

Einige Medikamente, zum Beispiel Anti-Epileptika, können möglicherweise weniger gut wirken während der Anwendung von Movicol.

Sie dürfen keine anderen Arzneimittel über den Mund einnehmen zusammen mit Movicol und während einer Stunde vor und einer Stunde nach Einnahme von Movicol.

Wenn Sie Flüssigkeiten müssen andicken um diese sicher zu schlucken schluckenbeachten Sie dann dass Movicol die Wirkung von Verdickungsmitteln entgegenwirken kann Verdickungsmittel kann entgegenwirken.

Schwangerschaft und Stillzeit

Movicol kann während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Sind Sie schwanger, denken Sie schwanger zu sind, möchten Sie schwanger werden oder stillen Sie Ihr Baby? Dann kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

Fahrtüchtigkeit und das Gebrauch von Maschinen

Movicol hat keinen Einfluss auf Ihre Fähigkeit zu fahren oder Maschinen zu benutzen ..

enthält Natrium Natrium

Kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie länger 3 oder mehr Beutel pro Tag benötigen haben, insbesondere wenn Ihnen empfohlen ein salzarm (natriumarm) Diät zu befolgen.

Movicol enthält 186,87 mg Natrium (ein wichtiger Bestandteil von Kochsalz/Speisesalz) pro Beutel. Dies entspricht 9,3% der empfohlenen maximalen täglichen Menge Natrium in der Ernährung für einen Erwachsenen ..

3. verwenden Sie Movicol? Dieses

Arzneimittel Arzneimittel kann zu jeder Zeit eingenommen werden, mit oder ohne Nahrung.

Lösen Sie den Inhalt jedes Beutels in 125 ml Wasser auf. Trinken Sie es dann.

Verstopfung:

Eine Dosis von Movicol ist 1 Beutel aufgelöst in 125 ml Wasser.

Nehmen Sie 1 bis 3 Mal pro Tag ein Beutel je nach der Schwere Ihrer Verstopfung Verstopfung.

Impaktierung ::

Bevor u Movicol einnehmen für fäkale Impaktierung muss es bestätigt sein dass Sie diese Erkrankung haben.

Die Dosis für die Behandlung von fäkale Impaktierung ist 8 Beutel Movicol pro Tag. Jeder Beutel muss werden aufgelöst in 125 ml Wasser. Die 8 Beutel müssen innerhalb der 6 Stunden eingenommen werden en dies, falls nötig, bis zu 3 Tage lang. Wenn Sie ein Herzproblem haben, dürfen Sie nicht mehr als 2 Beutel in einer Stunde einnehmen.

Wie mischen:

Öffnen Sie das Beutel und gießen den Inhalt davon in ein Glas. Fügen ungefähr 125 ml Wasser hinzu das Glas zu. Rühren gut bis das gesamte Pulver aufgelöst ist und die Movicol Lösung klar oder leicht trüb ist, und trinken anschließend die Lösung op. Wenn Sie Movicol einnehmen zur fäkalen Impaktion, kann es einfacher sein 8 Beutel in auf zulösen in einem Liter Wasser.

Dauer der Behandlung:

Verstopfung:

Ein Behandlung mit Movicol dauert gewöhnlich ungefähr 2 Wochen. Wenn Sie Movicol länger einnehmen müssen, gehen Sie zu Ihrem Arzt. Wenn Ihr Verstopfung verursacht wird durch eine Krankheit wie die Krankheit Parkinson oder Multiple Sklerose (MS), oder wenn Sie Medikamente einnehmen die Verstopfung verursachen, kann Ihr Arzt empfehlen Movicol länger als 2 Wochen einzunehmen .Wenn Sie Movicol länger einnehmen müssen, gehen Sie zu Ihrem Arzt.

Die Dosierung für langfristig Gebrauch kann gewöhnlich werden verringert bis 1 oder 2 Beutel pro Tag.

Fäkale Impaktierung:

Eine Behandlung mit Movicol kann bis zu 3 Tage dauern.

Haben Sie zu viel von Movicol eingenommen?

Sie könnten starken Durchfall bekommen was zu Dehydratation führen kann . In. In dies Fall müssen Sie aufhören mit der Einnahme von Movicol und ausreichend zu trinken . Wenn Siesich Sorgen machen , wenden Sie sich anIhren Arzt oder Kunst der Apotheker.

Wann Sie zu viel von Movicol eingenommen haben, nehmen Sie sofort Kontakt auf mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem Giftnotruf (070/245.245).

Haben Sie vergessen Movicol in te nehmen?

Nehmen Sie die Dosierung sobald Sie daran denken.

4. Mögliche Nebenwirkungen

Wie jedes Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben. Nicht jeder bekommt damit zu tun.

Sagen es Ihrem Arzt sofort und hören Sie auf mit der Einnahme von Movicol wenn Sie:

Ein schwere allergische Reaktion bekommen die Schwierigkeiten mit Atmung, oder Schwellung des Gesichts, der Lippen, Zunge oder Rachen verursacht.

Andere Nebenwirkungen sind:

Allergische Reaktionen die einen Hautausschlag, Juckreiz, Rötung der Haut, oder Nesselsucht, geschwollene Hände, Füße oder Knöchel und Kopfschmerzen können verursachen, hohe oder niedrige Mengen Kalium im Blut.

Manchmal kann Sie ein Verdauungsstörung (leichte Störung der Verdauung) haben, Bauchschmerzen oder Rumoren im Bauch. Sie können auch ein aufgeblähtes Gefühl haben, letzte haben von Blähungen, übel sein oder Erbrechen. Sie können auch Schmerzen am Anus (Gesäß) erfahren und u können milden Durchfall haben bei dem Beginn der Einnahme von Movicol. Diese Nebenwirkungen verbessern sich normalerweise wenn Sie die zu nehmen Menge Movicol reduzieren senkt.

Das Melden von Nebenwirkungen

Bekommen Sie Beschwerden von Nebenwirkungen, nehmen Sie dann Kontakt auf mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Pflegekraft. Dies gilt auch für Nebenwirkungen die nicht in diesem Beipackzettel stehen. Sie können Nebenwirkungen auch melden über:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte www.fagg.be

[Abteilung](#)

Vigilanz Vigilanz

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Durch Nebenwirkungen zu melden, helfen Sie uns um mehr Informationen zu erhalten über die Sicherheit von dieses Arzneimittel.

5. Wie bewahren Sie Movicol auf?

Außerhalb der Reichweite und Sicht von Kindern aufbewahren.

Verwenden Sie Movicol nicht mehr nach die Ablaufdatum Haltbarkeitsdatum. Die finden Sie auf dem Beutel und die Schachtel. Dort steht ein Monat und ein Jahr. Der letzte Tag von dem Monat ist das Verfallsdatum Haltbarkeitsdatum.

dieses Arzneimittel gibt es keine besonderen Lagerungsbedingungen Lagerungsbedingungen.

aufgelöst haben in Wasser und und u können es nicht sofort trinken, bewahren es dann abgedeckt und im Kühlschrank (2°C - 8°C). Werfen jede Lösung die nicht innerhalb de 6 Uhr verwendet wurde weg.

Spülen Arzneimittel nicht durch den Waschbecken oder die Toilette und werfen sie nicht in den Mülleimer. Fragen Sie Ihren Apotheker was Sie mit Arzneimitteln machen sollen die Sie nicht mehr verwenden. Wenn Sie Arzneimittel auf die richtige Weise entsorgen, werden sie auf ein richtige Weise vernichtet und kommen sie nicht in die Umwelt gelangen.

6. Inhalt der Verpackung und weitere Informationen

Welche Stoffe enthalten in Movicol?

Jedes Beutel mit 13,8 g Movicol enthält die folgenden:

Macrogol 3350	13,125 g
Natriumchlorid	0,3507 g
Natriumbicarbonat	0,1785 g
Kaliumchlorid	0,0466 g

Movicol enthält auch Limette- und Zitronenaroma und Kaliumacesulfam als Süßstoff. Zitrone- und Limettenaroma enthält die folgenden Inhaltsstoffe: arabisches Gummi, Maltodextrin, Limettenöl, Zitronenöl, Citral, Zitronensäure und Wasser.

Einmal die Lösung zubereitet ist mit 125 ml Wasser, ergibt jedes Beutel das Äquivalent von:

Natrium	65 Millimol/liter
Chlorid	53 Millimol/liter
Kalium	5,4 Millimol/liter
Bicarbonat	17 Millimol/liter

Wie sieht Movicol aus und was ist drin eine Verpackung?

Movicol ist erhältlich in rechteckigen Beuteln und röhrenförmigen Beuteln. Movicol ist ein weißes Pulver.

Movicol ist erhältlich in Packungen zu 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 oder 100 Beutel. Nicht alle genannten Beutel und Packungsgrößen werden im Handel gebracht.

Inhaber der Zulassung für das Inverkehrbringen im Handel:

Norgine NV, Philipssite 5 bus 1, 3001 Heverlee

Hersteller:

Laboratoires Macors, Rue des Caillottes, ZI La Plaine des Isles, 89000 Auxerre, Frankreich
Oder

Sophartex, 21 Rue du Pressoir, 28500 Vernouillet, Frankreich

Oder

Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Niederlande Oder

Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, Höganäs, 263 35, Schweden

Oder

Delpharm Orleans, 5 avenue de Concyr, ORLEANS CEDEX 2, 45071, Frankreich

Dieses Arzneimittel ist zugelassen in Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftszone unter den folgenden Namen ::

MOVICOL	Deutschland
Macrogol	Norgine Zitronen- und Limettenaroma Pulver zur zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
Finnland	MOVICOL
Irland	MOVICOL
Italien	MOVICOL 13,8 g Pulver für orale Lösung
Österreich	MOVICOL-Pulver
Portugal	MOVICOL

Spanien MOVICOL
Schweden MOVICOL

Nummer der Genehmigung für das Inverkehrbringen Handel bringen: BE180196

Abgabeart: Freie Abgabe

Dieser Beipackzettel wurde zuletzt genehmigt am genehmigt in 03/2025.

Transtoyou