

Prospecto: información para el paciente

MOVICOL® 13,8 g sobre, polvo para bebida
macrogol 3350, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de potasio

Lea bien todo el prospecto antes de que este medicamento vaya a usar porque contiene información importante para usted. Utilice este medicamento medicamento siempre exactamente como en este prospecto descrito o como su médico, farmacéutico o enfermero le lo ha dicho.

- Conserve este prospecto. Quizás tiene lo necesite más tarde de nuevo necesario.
- Tiene alguna más preguntas? Entonces póngase en contacto con su farmacéutico.
- Tiene algún problema con uno de efectos secundarios que en sección 4 están? O recibe usted un efecto secundario que no en este prospecto está? Póngase en contacto con su médico, farmacéutico o enfermero.
- ¿Se su síntoma no mejora, o se pone incluso peor? Entonces contacte a su médico.

Contenido de este prospecto:

1. Qué es Movicol y para qué se utiliza ?¿
2. Cuándo no debe usar Movicol no usar o debe tener especial cuidado con ello?
3. Cómo utiliza usted Movicol?
4. Posibles efectos secundarios
5. Cómo almacena usted Movicol?
6. Contenido del empaque y otra información

1. Qué es Movicol y para qué se utiliza usado?

El nombre de este medicamento es Movicol 13,8 g sobre, polvo para bebida. Es un laxante para el tratamiento de estreñimiento en adultos, adolescentes y ancianos. El uso en niños menores 12 años no se recomienda.

Movicol le ayuda a tener una evacuación más fácil te hacer incluso si ya largo tiempo estreñido está. Movicol es también eficaz en muy severo estreñimiento, impactación fecal llamada.

2. Cuándo no debe usar Movicol no usar o debe tener especial cuidado con ello?

No tome Movicol no si su médico ha dicho ha dicho tiene que usted:

- un obstrucción interna tiene (obstrucción intestinal, íleo)
- una perforación de la pared intestinal tiene
- una enfermedad inflamatoria grave del intestino tiene, como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o tóxico megacolon
- alérgico es a uno de los componentes en este medicamento. Estos componentes puede usted encontrar en sección 6 de este prospecto.

Cuándo debe usted tener cuidado con Movicol? Al

uso de Movicol debe usted suficiente líquido permanecer tomar. La Movicol solución es no sustituto para la ingesta regular de líquidos.

Enfermedades cardíacas

Siga las instrucciones especiales en sección 3 si usted Movicol toma para impactación fecal.

Usa usted otros medicamentos medicamentosToma usted además de Movicol otros todavía otros medicamentos, ha usted eso recientemente hecho o va usted esto quizás pronto hacer ?Diga eso entonces entonces su médico o farmacéutico.

Algunos medicamentos, por ejemplo anti-epilépticos, pueden posiblemente menos bien funcionar durante el uso de Movicol.

No debe tomar otros medicamentos por vía oral junto con Movicol con Movicol durante una hora antes y una hora después de tomar Movicol.

Si usted líquidos necesita espesar para estos de manera segura a poder tragar, tenga en cuenta que Movicol puede contrarrestar el efecto de espesantes puede contrarrestar puede contrarrestar.

Embarazo y lactancia

Movicol puede durante el embarazo y lactancia utilizarse . ¿Estáembarazada ,piensa que embarazada estar té son, desea embarazada quedar o da usted lactancia? Entonces contacte a su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento ..

Aptitud para conducir en el uso de máquinas

Movicol no tiene ninguna influencia en su capacidad para conducir o máquinas usar . Movicol.

sodio contiene sodio

Póngase en contacto con su médico o farmacéutico si usted prolongadamente 3 o más sobres por día necesita tiene, especialmente si se le ha recomendado un bajo en sal (bajo en sodio) dieta seguir ..

contiene 186,87 mg de sodio (unimportante componente de sal de cocina 2Fsal de mesa) por sobre bolsa. Dit viene equivale a 9,3% de la cantidad máxima diaria recomendada de sodio en la alimentación para un adulto.

3. ¿Cómo usa usted Movicol?

Este medicamento puede en cualquier momento tomarse ser, con o sin alimentos.

Vacíe el contenido de cada sobre en 125 ml de agua. Luego bébalo.

Estreñimiento:

Una dosis de Movicol es 1 sobre disuelto en 125 ml de agua.

Tome 1 a 3 veces por día un sobre según la gravedad de su estreñimiento.

Impactación fecal:

Antes de u Movicol toma para fecal impactación debe hay confirmado ser que usted esta condición tiene.

La dosis para el tratamiento de fecal impactación es 8 sobres Movicol por día. Cada sobre debe ser disuelto en 125 ml de agua. Los 8 sobres deben dentro de las 6 horas consumidos

ser en esto, si necesario, hasta 3 días de duración. Si tiene un problema cardíaco , no debetomar más de 2 sobres en una hora tomar ingerir.

Cómo mezclar:

Abra el sobre y vierta el contenido de este en un vaso. Agregue aproximadamente 125 ml de agua a el vaso hasta. Revuelva bien hasta que todo el polvo disuelto esté y la solución de Movicol solución clara o ligeramente turbia esté, y beba luego la solución op. Si usted toma Movicol toma para impactación fecal, puede ser más fácil que 8 sobres en disolver en un litro de agua. Duración del

tratamiento tratamiento:

Estreñimiento:

Un tratamiento con Movicol dura normalmente aproximadamente 2 semanas. Si necesita tomar Movicol más tiempo , consulte a su médico. Si su estreñimiento causado es por una enfermedad como la enfermedad de Parkinson o esclerosis múltiple (EM), o si usted medicamentos toma que estreñimiento causan, puede su médico recomendar tomar Movicol más de 2 semanas que tomar. Si necesita tomar Movicol más debe tomar, entonces vaya a su médico.

La dosis para prolongado uso puede generalmente ser reducido a 1 o 2 sobres por día.

Impactación fecal:

Un tratamiento con Movicol puede durar hasta 3 días durar.

¿Ha usted tomado demasiado de Movicol ?Podría tener diarrea abundante que puede provocar deshidratación . En puede sufrir. En este caso debe usted dejar de tomar Movicol de Movicol beber suficiente agua . Si ustedse preocupa preocupaciones sumédico o su artes de farmacéutico.

Cuando usted demasiado de Movicol ha tomado , contacteinmediatamente con su médico, farmacéutico o el Centro de Toxicología (070/245.245). ¿Ha

olvidado olvidar Movicol en to mar?

Tome la dosis tan pronto como usted lo recuerde.

4. Posibles efectos secundarios

Como cualquier medicamento puede también este medicamento efectos secundarios tener. No todos recibe con eso que ver.

Informe a su médico inmediatamente inmediato deje de tomar Movicol de Movicol si usted:

Una grave reacción alérgica tiene que dificultades con respiración, o hinchazón de la cara, los labios, lengua o garganta causa.

Otras reacciones adversas son:

Reacciones alérgicas que una erupción cutánea, picazón, enrojecimiento de la piel, o urticaria, manos hinchadas, pies o tobillos y dolor de cabeza pueden causar, altas o bajas cantidades potasio en la sangre.

A veces puede usted un indigestión (leve trastorno de la digestión) tener, dolor abdominal o ruidos en el abdomen. Usted puede también una sensación de hinchazón sensación tener, último tener de flatulencia, náuseas estar o vómitos. Usted puede también dolor en el ano (trasero) experimentar y u puede leve diarrea tener al inicio del consumo de Movicol. Estos efectos secundarios mejoran generalmente si reduce la a tomar cantidad de Movicol disminuye.

El informar de efectos secundarios

¿Tiene efectos secundarios, efectos secundarios, póngase en contacto con su médico, farmacéutico o enfermero. Esto también se aplica a efectos secundarios que no en este prospecto están. Usted puede efectos secundarios también informar a través de:

Agencia Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios

www.fagg.be

Departamento Vigilancia

Sitio web: www.eenbijwerkingmelden.be

correo electrónico: adr@fagg-afmps.be

Al efectos secundarios reportar ,ayuda usted nos a más información obtener sobre la seguridad de seguridad de este medicamento.

5. Cómo almacena usted Movicol?

Fuera de la vista y alcance de niños mantener.

Use Movicol no más después de de última fecha de caducidad. Esa se encuentra en el sobre y la caja. Allí aparece un mes y un año. El último día de ese mes es la fecha de caducidad fecha de caducidad.

este medicamento no hay ninguna condición especial de almacenamiento.

Si ha disuelto Movicol en agua y en u puede el no inmediatamente beber, guarde entonces cubierto y en el refrigerador (2°C - 8°C). Deseche cualquier solución que no dentro de 6 hora usado fue lejos.

Enjuague medicamentos no por el fregadero o el inodoro y tírelos no en la basura .. Pregunte a su farmacéutico qué debe hacer con medicamentos que hacer que no más usa. Si medicamentos de la manera correcta desecha, se eliminan de uno correcta manera destruido y llegan ellas no en el medio ambiente terminan.

6. Contenido del empaque y otra información

Qué sustancias contiene en Movicol?

Cada sobre de 13,8 g de Movicol contiene lo siguiente:

Macrogol 3350	13,125 g
Cloruro de sodio	0,3507 g
Bicarbonato de sodio	0,1785 g
Cloruro de potasio	0,0466 g

Movicol contiene también lima- y aroma de limón y acesulfamo de potasio como edulcorante. Limón- y aroma de lima contiene los siguientes ingredientes: goma arábica, maltodextrina, aceite de lima, aceite de limón, citral, ácido cítrico y agua.

Una vez la solución preparada es con 125 ml de agua, proporciona cada sobre el equivalente de:

Sodio	65 milimolflitro
Cloruro	53 milimolflitro
Potasio	5,4 milimolflitro
Bicarbonato	17 milimolflitro

¿Cómo se ve Movicol ? y qué contiene un empaque?

Movicol está disponible en sobres rectangulares y sobres tubulares. Movicol es un polvo blanco.

Movicol está disponible en cajas de 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 o 100 sobres. No todos mencionados sobres y tamaños de envase se en el mercado introducen.

Titular de la autorización para la comercialización traer:

Norgine NV, Philipssite 5 bus 1, 3001 Heverlee

Fabricante:

Laboratoires Macors, Rue des Caillottes, ZI La Plaine des Isles, 89000 Auxerre, Francia

○

Sophartex, 21 Rue du Pressoir, 28500 Vernouillet, Francia

○

Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Países Bajos

Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, Höganäs, 263 35, Suecia

○

Delpharm Orleans, 5 avenue de Concyr, ORLEANS CEDEX 2, 45071, Francia

Este medicamento está registrado en estados miembros de la Europea Económica Espacio bajo el siguientes nombres:

Bélgica MOVICOL

Alemania Macrofol Norgine aroma de limón y lima polvo para Fabricación de una solución para

tomar Finlandia

MOVICOL Irlanda

MOVICOL Italia MOVICOL 13,8 g polvo para solución

oral Austria

MOVICOL-polvo Portugal

MOVICOL MOVICOL

Suecia MOVICOL

Número de la licencia para la en comercialización : BE180196Modo de dispensación

: Libredispensación Este

prospecto es para la última aprobación aprobado en 03/2025.

Transtoyou