

Pakkausseloste: tietoa potilaalle de potilas

MOVICOL® 13,8 g pussi, jauhe juomaa varten makrogoli 3350,
natriumkloridi natriumkloridinatriumvetykarbonaatti natriumvetykarbonaattikaliumkloridi
kaliumkloridi

Lue huolellisesti koko pakkausseloste ennen kuin käytät tätä lääkettä aiot käyttää sillä siinä on tärkeää tietoa sinulle. sinulle. sinulle.

Käytä tätä lääkettä aina tarkalleen kuten in tämä pakkausseloste kuvattu tai kuten sinun lääkäri, apteekkari tai sairaanhoitaja sinulle on kertonut ..

- Säilytä tämä pakkausseloste. Ehkä on teille myöhemmin taas tarpeen.
- Onko teillä vielä kysymyksiä? Ota sitten yhteyttä teidän apteekkiin.
- Jos teille tulee yksi ei voida kääntää ilman kontekstia haittavaikutukset jotka kohdassa 4 on mainittu? Tai saatteko te haittavaikutuksen joka ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu ? Ota sitten yhteyttä teidän lääkäriin, lääkäri, apteekki tai sairaanhoitaja.
- Tuleeko sinun vaiva ei vähene, tai tuleeko se jopa pahemmaksi? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäriin.

Sisältö tästä tiedotteesta pakkausseloste:

1. Mikä on Movicol ja mihin sitä käytetään ? Milloin
2. et saa käyttää Movicol tai täytyy olla erityisen varovainen sen kanssa ? Kuinka mukaan ovat?
3. Kuinka käytetään sinä Movicolia?
4. Mahdolliset sivuvaikutukset
5. Kuinka säilytät sinä Movicolia?
6. Sisältö pakkauksen ja muut tiedot 1.

1. ja mihin sitä käytetään se käytetään?

Nimi tämä lääke on Movicol 13,8 g pussi, jauhe juomaa varten. Se on laksatiivi aikuisille ummetus hoitoon hoito ummetus aikuisilla aikuisille aikuisille, nuoret ja vanhukset. Het käyttö lapsilla alle 12 ei suositella . Movicol.

sinua saamaan helpomman suolen toiminnan helpompi uloste te tehdä jopa jos olette jo pitkän ajan ummetuksesta kärsivä. Movicol on myös tehokas vakavan ummetus tapauksissa jaulostemassan kertymässä nimeltään fekaalinen.

2. Milloin et saa käyttää Movicolia ei käytää tai täytyy olla erityisen varovainen sen kanssa olla?

Älä ota Movicolia ei jos lääkärisi on sanonut sinulle on että sinä:

- yksi sisäinen tukos on (suolitukos, ileus)
- yksi perforoitu suoliseinä on
- yksi vakava tulehdussairaus suolen suoli on, kuten colitis ulserosa, tauti Crohnin tai toksinen megakoolon
- allerginen olet jollekin yhdelle aineista aineista tässä tässä lääkkeessä. Nämä aineet löytää u löydät in kohta 6 tästä tästä pakkausselosteesta.

Milloin pitää u erityistä varovaisuutta olla Movicolin kanssa?

Käytettäessä käyttö Movicolia pitää u riittävästi neste jatkaa ottaa. Movicol liuos on ei korvike sille tavanomaiselle nesteen saannille nesteytys.

Noudata

erityisiä ohjeita erityinen erityisohjeet kun otsikko 3 jos käytät Movicol ottaa ennen ulosteen impaktio.

Käytätkö sinä vielä muita lääkkeitä?

Otatko sinä lisäksi Movicol vielä muut lääkkeet, on te että äskettäin tehnyt tai aiotteko te tämän ehkä pian tehdä ?Kerro että sitten ja sinun lääkäri tai apteekkari.

Jotkut lääkkeet, esimerkiksi anti-epileptiset, voivat mahdollisesti vähemmän hyvin toimia käytön aikana Movicolin kanssa.

Ette saa ottaa muita lääkkeitä suun kautta samanaikaisesti Movicolin kanssa eikä tunnin aikana ennen ja tunnin aikana jälkeen Movicolin oton Movicolista.

Jos nesteitä täytyy sakeuttaa jotta ne turvallisesti voidaan niellä niellähuomioi että Movicol voi heikentää sakeuttamisaineiden vaikutusta paksuntamisaineet voi vastustaa.

Raskaus ja imetys

Movicol voidaan raskauden aikana raskaus ja imetys käyttää olla. Oletko raskaana, luuletko olevasi raskaana olevasi ovat, haluatko raskaana tulla tai imetätkö sinä imetät? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin ennen kuin käytät tätä lääkettä ..

ja ja se käyttö koneiden

Movicol ei vaikuta kykyyn ajaa tai koneiden käyttöön . Movicol sisältää natriumia käyttää.

Movicol sisältää natrium

Ota yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin jos sinä pitkäaikaisesti 3 tai enemmän pussia päivässä tarvitset on ,erityisesti jos sinulle on suositeltu yksi yksi vähäsuolainen (vähänatriuminen) ruokavalio noudattaa ..

sisältää 186,87 mg natriumia (yksitärkeä ainesosa keittosuolassa / pöytäsuolassa) perpussi) per pussi. Tämä tulee vastaamaan 9,3%:a suositellusta maksimi päivittäisestä määrästä natriumia ravinnossa aikuiselle yhdelle aikuiselle.

3. Kuinka käytätte Movicolia?

Tämä lääke voi milloin tahansa ottaa olla, ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Liuita sisältö jokaisesta pussista 125 ml:aan vettä. Juo se sitten.

Ummetus:

Yksi annos Movicol on 1 pussi liuotettuna 125 ml:aan vettä.

Ota 1 jopa 3 kertaa päivässä päivässä pussi pussi riippuen vakavuudesta vakavuudesta vakavuudesta ummetukseksi ummetukseksi.

Fekaali impaktio:

Ennen u Movicol ottaa ennen uloste impaktio täytyy olla vahvistettu että te tämän sairauden on ..

annos ennen hoitoa hoito hoito alkaen fekaalinen impaktio on 8 pussia Movicol per päivä. Jokainen pussi täytyy olla liuotettu 125 ml veteen. Nämä 8 pussia täytyy ottaa 6 tunnin kuluessa tulla en tämä, tarvittaessa , enintään 3päivää ajan. Jos sinulla on sydänongelma , et saa ottaa enempääkuin 2 pussia tunnissa ottaa yhdessä tunnissa ottaa yhdessä tunnissa.

Kuinka sekoittaa:

Avaa pussi ja kaada sen sisältö siihen lasiin yksi lasi. Lisää noin 125 ml vettä siihen lasiin lasi asti. Sekoita hyvin kunnes kaikki jauhe liukenee on ja Movicol liuos kirkas tai hieman samea on, ja juo sitten liuos liuos op. Jos käytät Movicol ottaa ulosteen impaktio ,voi olla helpompaa olla 8 pussia liuottaa yhteen litraan vettä. Hoitajakson kesto yksi litra vettä.

Kesto hoito:

Ummetus:

Een hoito Movicolilla kestää yleensä noin 2 viikkoa. Jos käytät Movicolia pidempään täytyy ottaa, mene lääkärisi luo . Jos sinun ummetus aiheutuu on kautta sairaus kuten Parkinsonin tauti tai multippeliskleroosi (MS), tai jos sinä lääkkeitä käytät jotka ummetus aiheuttavat , voi sinunsairaus kuten Parkinsonin tauti tai multippeliskleroosi (MS), tai lääkäriä suositella Movicolia pidempään kuin 2 viikkoa ottaa . Jos sinun on otettava Movicoliapidempään , mene lääkärin luo. Annostus pitkäaikaiseen käyttöön

on seuraava ohjeiden mukaan käyttö voi yleensä alentaa 1 tai 2 pussia per päivä ..

impaktio ::

Movicolilla voi kestää 3 päivää päivät kestää.

Onko teillä liikaa Movicolia otettu ?Voitte

saada runsasta ripulia mikä voi johtaa kuivumiseen . dehydraatio voi kärsiä. In tässä tapauksessa tulee sinun lopettaa Movicolin ottaminen ja juoda riittävästi . Jos olet huolissasi , ota yhteyttä lääkäriisi tai huolehtia tekee, ota yhteyttä sinun lääkäri apteekki.

Kun sinä liian paljon Movicolia on ottanut, ota sitten välittömästi yhteyttä sinun lääkäriin, apteekki tai Myrkytystietokeskus (070/245.245).

Oletko unohtanut Movicolia ottaa?

Ota annos heti kun muistat sen ..

4. sivuvaikutukset Kuten

mikä tahansa lääke voi myös tämä tämä lääke sivuvaikutukset olla. Ei kaikki saa siitä kärsiä ..

se lääkärillesi heti ja lopeta Movicolin käyttö välittömästi Movicolista jos sinä:

Yksi vakava allerginen reaktio saa joka vaikeuksia hengityksen kanssa, tai turvotus kasvojen alueella, huulten , kielen tai kurkunaiheuttaa aiheuttaa.

Muut sivuvaikutukset ovat:

Allergiset reaktiot jotka voivat aiheuttaa ihottumaa, kutinaa, ihon punoitusta ,
tainokkosihottumaa ,turvonneet kädet kädet, jalat tai nilkat ja päänsärky voivat aiheuttaa,
korkea tai matala määrät kaliumia veressä ..

voi sinä saada yksi ruoansulatushäiriö (lievä häiriö ruoansulatuksessa
ruoansulatusolla ,vatsakipu tai kurniminen vatsassa . Sinulla voimyös olla turvonnut olo
turvonnut tunne olla, viime olla alkaen ilmavaivat, pahoinvointi olla tai oksentelu. Sinä voit
myös kipu peräaukon (takapuoli) kokea ja u voi lievää ripulia olla aloittaessasi Movicolin
ottamisen Movicolista. Nämä sivuvaikutukset paranevat yleensä kun vähennät otettavaa
määrää Movicolia vähennät ..

Het ilmoittaminen van haittavaikutuksista
Saatteko haittavaikutuksia, haittavaikutuksia, ottakaa yhteyttä teidän lääkäriin, apteekkariin tai
sairaanhoitajaan. Tämä koskee myös niitä haittavaikutuksia jotka ei sisään tämä
pakkauseloste ovat. Sinä voit haittavaikutukset myös ilmoittaa kautta:

Liittovaltion Virasto lääkkeille ja terveydenhuollon tuotteille www.fagg.be

[Osasto](#)

Valvonta Valppaus

Verkkosivusto: www.eenbijwerkingmelden.be

sähköposti: adr@fagg-afmps.be

Ilmoittamalla haittavaikutuksista tee ilmoittaa autatte meitä saamaan enemmän tietoa lisää
turvallisuudesta tee saada lääkkeen turvallisuudesta alkaen tämä lääke.

5. Kuinka säilytätte Movicolia?

Pidä näkyvistä ja ulottuvilta alkaen lasten poissa.

Älä käytä Movicolia enää sen jälkeen ei de viimeinen viimeinen käyttöpäivä. Se löytyy
pakkauksesta pussi ja de laatikko. Siinä on kuukausi ja vuosi . Viimeinen päivä päivä päivä
kuukauden kuukausi on viimeinen viimeinen käyttöpäivä.

Ennen tätä lääkettä ei ole mitään erityisiä säilytysolosuhteita.

Jos olet liuottanut Movicolin liuennut olet veteen ja u kunt het ei heti juoda, säilytä se sitten
peitettyinä ja jääkaapissa (2°C - 8°C). Hävitä jokainen liuos joka ei 24 tunnin kuluessa de 6
tunti käytetty oli pois.

Huuhtelee lääkkeitä ei viemäriin pesuallas tai wc ja heitä niitä ei roskakoriin .. Kysy
apteekkariltasi mitä sinun tulee tehdä lääkkeiden kanssa joita et enää käytä . Jos lääkkeet
hävitetään oikealla tavalla , ne käsitellään asianmukaisesti. Kysy apteekkariltasi yksi oikea tapa
hävitetty ja tulevat he eivät ympäristöön päädy.

6. Sisältö pakkauksen sisältö ja muut tiedot

Mitkä aineet sisältää Movicolissa?

Jokainen pussi 13,8 g Movicol sisältää seuraavat aineet:

Makrogoli 3350	13,125 g
Natriumkloridi	0,3507 g

Natriumbikarbonaatti 0,1785 g
Kaliumkloridi 0,0466 g

Movicol sisältää myös lime- ja sitruuna-aromi ja kalium-asesulfaami makeutusaineena .
Sitruuna- ja limearomi sisältää seuraavat ainesosat : arabikumi: maltodekstriini gom,
maltodekstriini, limettiöljy, sitruunaöljy, sitral, sitruunahappo ja vesi.

Kun liuos valmistettu on 125 ml vettä, antaa jokainen pussi vastaavuuden: Natrium

Natrium 65 millimol/liter
Kloridi 53 millimol/liter
Kalium 5,4 millimol/liter
Bikarbonaatti 17 millimol/liter

Miltä näyttää Movicol ja ja mitä sisältää yksi pakkaus?

Movicol on saatavilla suorakulmaisissa pusseissa ja putkimaisissa pusseissa . Movicol onvalkoinen jauhe . Movicol on.

Movicol on saatavilla 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 tai 100 kappaleen pakkauksissa pussit. Ei kaikki mainitut pussit ja pakkauskoot tuoda markkinoille kauppa tuodaan.

Luvan haltija myyntilupa myöntämiseen markkinoille kauppa tuonti:
Norgine NV, Philipssite 5 bus 1, 3001 Heverlee

Valmistaja:

Laboratoires Macors, Rue des Caillottes, ZI La Plaine des Isles, 89000 Auxerre, Ranska

Tai

Sophartex, 21 Rue du Pressoir, 28500 Vernouillet, Ranska

Tai

Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Alankomaat Tai

Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, Höganäs, 263 35, Ruotsi

Tai

Delpharm Orleans, 5 avenue de Concyr, ORLEANS CEDEX 2, 45071, Ranska

Tämä lääke on rekisteröity in jäsenvaltioissa ei käännettävää sisältöä Euroopan talousalueen alueella alla de seuraavilla nimillä:

Belgia	MOVICOL
Saksa	Makrogoli Norgine Sitruuna- ja Limearomi Jauhe käyttöön Valmistus yksi liuos suun kautta
Suomi	MOVICOL
Irlanti	MOVICOL
Italia	MOVICOL 13,8 g jauhe liuosta suun kautta
Itävalta	MOVICOL-jauhe
Portugali	MOVICOL
Espanja	MOVICOL
Ruotsi	MOVICOL

Numero lupa tuoda markkinoille kauppa tuoda: BE180196

Toimitustapa: Vapaa toimitus

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty hyväksytty hyväksytty in 03/2025.

Transtoyou