

Notice: information pour le patient

MOVICOL® 13,8 g sachet, poudre pour solution buvable
macrogol 3350, chlorure de sodium, bicarbonate de sodium, chlorure de potassium

Lisez bien toute la notice avant que vous ce médicament allez utiliser car il contient des informations importantes pour vous. Utilisez

ce médicament médicament toujours précisément comme dans cette notice décrit ou comme votre médecin, pharmacien ou infirmier/infirmière vous l' a dit.

- Conservez ce notice. Peut-être avez vous en aurez besoin plus tard de nouveau besoin.
- Avez vous encore des questions? Contactez alors votre pharmacien.
- Avez vous des effets secondaires un de effets secondaires qui dans rubrique 4 sont? Ou avez -vous un effet secondaire qui n'est pas cette notice mentionné? Contactez alors votre médecin, pharmacien ou infirmier.
- Votre symptôme ne diminue pas, ou s'aggrave même ? Contactez alorsvotre médecin.

Contenu

de cette notice d'information:

1. Qu'est-ce que Movicol et à quoi sert il utilisé?
2. Quand ne devez-vous pas utiliser Movicol pas utiliser ou devez vous faire particulièrement attention avec être?
3. Comment utilisé vous Movicol ?
4. Effets indésirables
5. Comment conservez vous Movicol ?
6. Contenu de l' emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Movicol et à quoi sert-il ? utilisé?

Le nom de ce médicament est Movicol 13,8 g sachet, poudre pour boisson. C'est un laxatif pour le traitement de la constipation chez les adultes, adolescents et personnes âgées. Le usage chez enfants de moins de 12 ans n'est pas recommandé.

Movicol vous aide à avoir un transit intestinal plus facile à faire même si vous êtes déjà longtemps constipé . Movicol est également efficace dans les cas de sévère constipation constipationappelée fécale impaction ..

2. Quand ne devez-vous pas utiliser Movicol ne pas utiliser ou devez vous faire preuve de prudence avec être?

Ne prenez pas Movicol ne pas si votre médecin a dit a dit a que vous :

- un obstruction interne avez (occlusion intestinale, iléus)
- une paroi intestinale perforée avez
- une maladie inflammatoire grave de l' intestin avez ,, comme colite ulcéreuse, maladie de Crohn ou mégacôlon toxique
- allergique êtes à un des composants de ce médicament. Ces composants pouvez vous trouver dans rubrique 6 de cette notice.

Quand devez vous faire attention être avec Movicol ?

Lors de l'utilisation de Movicol devez vous suffisamment liquide rester prendre. La solution Movicol solution est pas remplacement pour la régulière consommation de liquide.

Maladies cardiaques

Suivez les instructions spéciales instructions en cas de rubrique 3 si vous prenez Movicol prenez pour fécale impaction.

Utilisez vous encore d'autres médicaments?

Prenez vous en plus de Movicol encore autres médicaments, avez vous que récemment fait ou allez vous le peut-être bientôt faire ? Informez que alors puis votre médecin ou pharmacien.

Certains médicaments, par exemple anti-épileptiques, peuvent éventuellement moins bien fonctionner pendant l'utilisation de Movicol.

Vous ne devez pas d'autres médicaments par voie orale prendre avec Movicol et pendant une heure avant et une heure après la prise de Movicol.

Si vous liquides devez épaissir pour les en toute sécurité pouvoir avaler avalergardez à l'esprit que Movicol peut réduire l'effet des épaississants . Movicol l'effet de agents épaississants peut combattre.

Grossesse et allaitement

Movicol peut pendant la grossesse et allaitement utilisé être. Êtes-vous enceinte, pensez -vous enceinte être sont, voulez-vous enceinte devenir ou donnez vous allaitement? Contactez alors votre médecin ou pharmacien avant vous ce médicament utilisez.

Aptitude à conduire et le utilisation de machines

Movicol n'a aucun effet sur votre aptitude à conduire ou utiliser des machines des machines Movicol contient.

Movicol contient sodium

Contactez votre médecin ou pharmacien si vous à long terme 3 ou plus sachets par jour avez besoin ,surtout si il vous est recommandé un un pauvre en sel (pauvre en sodium) régime suivre ..

contient 186,87 mg de sodium (unélément important de sel de cuisine /sel de table) parsachet sachet. Dit vient correspond à 9,3% de la dose maximale quotidienne de sodium dans l' alimentation pour un adulte.

3. Comment utilisez- vous Movicol ?

Ce médicament peut à tout moment pris être, avec ou sans nourriture.

Dissoudre le contenu de chaque sachet dans 125 ml d'eau. Buvez-le ensuite.

Constipation:

Une dose de Movicol est 1 sachet dissous dans 125 ml d'eau.

Prenez 1 à 3 fois par jour un sachet selon la gravité de votre constipation.

Fécalome ::

Avant u Movicol prend pour fécale impaction doit il confirmé être que vous cette affection avez.

La dose pour le traitement de fécale impaction est 8 sachets Movicol par jour. Chaque sachet doit être dissous dans 125 ml d'eau. Les 8 sachets doivent être dans les 6 heures pris devenir en ceci, si nécessaire, jusqu'à 3 jours de suite. Si vous avez un problème cardiaque , vous ne devez pas plus de 2 sachets en une heure prendre prendre.

Comment mélanger:

Ouvrez le sachet et versez le contenu dans un verre .. environ 125 ml d'eau 125 ml d'eau le le verre jusqu'à. Remuez bien jusqu'à ce que toute la poudre dissoute soit et le Movicol solution claire ou légèrement trouble soit, et buvez ensuite la solution en cas de. Si vous prenez Movicol prenez pour fécale impaction, peut il être plus facile de dissoudre 8 sachets dans un litre d'eau. Durée du

traitement traitement:

Constipation:

Un traitement avec Movicol dure habituellement environ 2 semaines. Si vous devez prendre Movicol plus longtemps , consultez votremédecin. Si votre votre médecin. Si votre constipation provoquée est par une maladie comme la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques (SEP), ou si vous médicaments prenez qui constipation provoquent, peut votre médecin vous recommander de Movicol plus longtemps que 2 semaines prendre .Si vous devez prendre Movicol plus longtemps devez prendre, consultez votre médecin. La

posologie pour un usage prolongé prolongé utilisation peut habituellement être réduit à 1 ou 2 sachets par jour.

Fécalome ::

traitement avec Movicol peut durer jusqu'à 3 jours jours durer.

Avez -vous trop de Movicol pris?

Vous pourriez avoir des diarrhées abondantes qui peuvent entraîner une déshydratation. En ce cas doit vous de arrêter de prendre le prendre de Movicol et suffisamment de boire. Si vous vous inquiétez , contactezvotre médecin ou médecin de pharmacien.

Quand vous trop de Movicol avez pris, contactez immédiatement votre médecin, pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245). Avez-vous

oublié oublié Movicol dans prendre prendre?

Prenez la posologie dès que vous y pensez.

4. Effets indésirables

Comme tout médicament peut également ceci médicament effets secondaires avoir. Pas tout le monde reçoit avec cela à faire.

Informez votre médecin immédiatement et arrêtez de prendre Movicol de Movicol si vous :

Une réaction allergique grave provoque des difficultés à respirer, ou un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge cause.

Autres effets secondaires sont:

Réactions allergiques qui une éruption cutanée, démangeaisons, rougeur de la peau, ou urticaire, mains enflées, pieds ou chevilles et maux de tête peuvent provoquer, hautes ou faibles quantités de potassium dans le sang.

Parfois peut vous un indigestion (léger trouble de la digestion) avoir, douleur abdominale ou gargouillements dans le ventre. Vous pouvez aussi une sensation de ballonnement avoir, dernier avoir de flatulences, nauséux être ou vomissements. Vous pouvez aussi douleur à l'anus (fessier) éprouver et u pouvez avoir une diarrhée légère au début de la prise de Movicol. Ces effets secondaires s'améliorent généralement lorsque vous réduisez la quantité de Movicol à prendre.

Le signaler des effets secondaires

Avez-vous des effets secondaires, effets secondaires, contactez votre médecin, pharmacien ou infirmier/infirmière. Cela s'applique également aux effets secondaires qui non dans ce notice sont. Vous pouvez effets secondaires également signaler via :

Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé

www.fagg.be

Département Vigilance

Site web : www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail : adr@fagg-afmps.be

En effets indésirables à signaler, aidez nous à obtenir plus d' informations sur la sécurité de de ce médicament.

5. Comment conservez vous Movicol ?

Hors de la vue et portée des enfants garder.

Utilisez Movicol plus après na de date de péremption. Vous trouvez sur le sachet et la boîte. Il indique un mois et une année. Le dernier jour de ce mois est la date limite de péremption.

Pour ce médicament il n'y a pas de conditions spéciales.

Si vous prenez Movicol Si vous avez dissous Movicol dans l'eau u pouvez le pas immédiatement boire, conservez le alors couverts et dans le réfrigérateur (2°C - 8°C). Jetez toute solution qui n'est pas de 6 heure utilisé était parti.

Rincez médicaments pas par l' évier ou les toilettes et jetez les pas dans la poubelle.

Demandez à votre pharmacien ce que vous devez faire avec les médicaments que vous ne utilisez plus . Si vous éliminezles médicaments de la bonne manière , ilsseront traités de manière un correcte manière détruit et arrivent elles pas dans l'environnement se retrouvent.

6. Contenu de l' emballage et autres informations

Quelles substances contiennent y a-t-il dans Movicol ?

Chaque sachet de 13,8 g de Movicol contient les suivants:

Macrogol 3350	13,125 g
Chlorure de sodium	0,3507 g
Bicarbonate de sodium	0,1785 g
Chlorure de potassium	0,0466 g

Movicol contient également citron vert- et arôme de citron et acésulfame de potassium comme édulcorant. Citron- et arôme de citron vert contient les suivants ingrédients: gomme arabique, maltodextrine, huile de lime, huile de citron, citral, acide citrique et eau.

Une fois la solution préparée avec 125 ml d'eau, fournit chaque sachet l'équivalent de :

Sodium	65 millimol/liter
Chlorure	53 millimol/liter
Potassium	5,4 millimol/liter
Bicarbonate	17 millimol/liter

Comment ressemble Movicol ? et que contient-il un emballage?

Movicol est disponible en sachets rectangulaires et sachets tubulaires. Movicol est un poudre blanc.

Movicol est disponible en boîtes de 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 ou 100 sachets. Pas tous mentionnés sachets et tailles d'emballage sont sur le marché mis.

Titulaire de l' autorisation de mise sur le marché apporter:

Norgine NV, Philipssite 5 bus 1, 3001 Heverlee

Fabricant:

Laboratoires Macors, Rue des Caillottes, ZI La Plaine des Isles, 89000 Auxerre, France
Ou

Sophartex, 21 Rue du Pressoir, 28500 Vernouillet, France

Ou

Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Pays-Bas Ou

Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, Höganäs, 263 35, Suède

Ou

Delpharm Orléans, 5 avenue de Concyr, ORLEANS CEDEX 2, 45071, France

Ce médicament est enregistré dans États membres de l' Union européenne Espace économique européen sous le noms ::

MOVICOL	Allemagne
Macrogol	Norgine arôme citron et citron vert poudre pour zur Fabrication d'une solution à prendre
Finlande	MOVICOL
Irlande	MOVICOL
Italie	MOVICOL 13,8 g poudre pour solution orale
Autriche	MOVICOL-poudre
Portugal	MOVICOL
Espagne	MOVICOL
Suède	MOVICOL

Numéro de la licence pour la mise sur le marché : BE180196 Mode de délivrance

: Libredélivrance Cette

notice a été pour la dernière approuvée approuvé en 03/2025.

Transtoyou