

## Pakuotės lapelis: informacija skirta pacientui MOVICOL

Ⓣ<sup>13,8g</sup> paketėlis ,milteliai geriamajam tirpalui makrogolis 3350, natrio chloridas makrogolis 3350, natrio vandenilio karbonatas, kalio chloridas, kalio chloridas

Perskaitykite gerai visą pakuotės lapelį prieš jūs šį vaistą pradėsite vartoti nes jame yra svarbi informacija apie jums. Naudokite

šį vaistą vaistas visada tiksliai kaip in šiame pakuotės lapelyje aprašyta arba kaip jūsų gydytojas, vaistininkas arba slaugytoja jums tai pasakė ..

- Laikyti šį pakuotės lapelį. Galbūt turėsite jį vėliau vėl reikės.
  - Ar turite dar klausimų? Tada susisiekit su savo vaistininku.
  - Ar jums pasireiškia vienas iš šalutinių poveikių kurie skyriuje 4 nurodyti? Ar jums pasireiškė šalutinis poveikis kuris nėra šiame lapelyje nurodytas ? Susisiekit su savogydytoju, jūsų menai, vaistininkas arba slaugytojas.
  - Ar jūsų skundas ne mažėja, ar jis netgi blogėja ? Tada susisiekit su jūsų gydytoju.
- Turinys

šio šio pakuotės lapelio pakuotės lapelis:

1. Kas yra Movicol ir kam jis naudojamas ?Kada
2. jūs negalite vartoti Movicol arba turite būti ypač atsargūs su juo ? Kaip atsargiai su yra?
3. Kaip naudojamas jūs Movicol?
4. Galimos šalutinės reakcijos
5. Kaip laikote jūs Movicol?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija 1.

1. ir kam naudojamas jis yra naudojamas?

Vaisto pavadinimas šis vaistas yra Movicol 13,8 g paketėlis, milteliai gėrimui . Tai yra vidurius laisvinantis preparatas suaugusiems skirta gydyti vidurių užkietėjimą nuo vidurių užkietėjimas prie suaugusieji, paaugliai ir senjorai. Het vartojimas vaikams iki 12 12 nėra rekomenduojamas . Movicol.

jums lengvesnį tuštinimąsi vienas lengvesnis išmatos te daryti net jei jūs jau ilgą laiką užkietėję esate. Movicol yra taip pat veiksmingas esant labai stipriam vidurių užkietėjimui, vadinamam fekaline impakcija.

2. Kada negalite vartoti Movicol ne vartoti arba turite būti ypač atsargūs su juo būti?

Nevartokite Movicol ne jei jūsų gydytojas pasakė sakė turi kad jūs:

- turi vidinę obstrukciją turite (žarnų obstrukcija, ileusas)
- turi prakiurusią žarnyno sienelę turite
- rimtą uždegiminę ligą žarnyno turite žarną turite, kaip kolitas opinis, liga Krono arba toksinis megakolonas
- alergiškas esate tam vienai iš medžiagų šiame vaistiniame preparate. Šios medžiagos galite u rasti in skyriuje 6 iš šio pakuotės lapelio.

Kada turite u papildomai būti atsargūs su Movicol?

Naudojant Movicol Movicol turite u pakankamai skystis likti vartoti. Movicol tirpalas yra ne pakeitimas vietoj įprasto reguliaraus skysčių vartojimo.

## Širdies ligos

Laikykitės specialių specialių nurodymų dėl rubrika 3 jei jūs Movicol vartojate dėl fekalinės obstrukcijos.

Vartojate jūs dar kitus vaistus?

Vartojate jūs be Movicol dar kiti vaistai, ar jūs tai neseniai padarėte arba ketinate jūs tai galbūt netrukus padaryti? Pasakykite tai tada tada jūsų gydytojas arba vaistininkas.

Kai kurie vaistai, pavyzdžiui antiepileptikai, gali galimai mažiau gerai veikti vartojant Movicol. tai naudojimas iš Movicol.

Jūs galite ne kitus vaistus per burną vartoti kartu su Movicol ir per vieną valandą prieš ir vieną valandą po vartojimo Movicol.

Jeigu jūs skysčius turite sutirštinti kad juos saugiai galėtumėte nuryti prarytiatkreipkite dėmesį į tai, kad Movicol gali sutirštino priemonių poveikį sumažinti gali priešintis.

## Nėštumas ir žindymas

Movicol gali nėštumo metu nėštumo ir žindymo naudoti būti Ar esate nėščia, manote jūs nėščia būti yra, norite nėščia tapti ar duodate jūs žindote? Tada susisieki su savo gydytoju arba vaistininku prieš jūs šį vaistą vartojate.

Vairavimo gebėjimai ir tas vartojimas mašinų

Movicol neturi įtakos jūsų gebėjimui vairuoti ar valdyti mašinas. Movicol sudėtyje yra natrio naudoti.

Movicol sudėtyje yra natrio

Susisieki su savo gydytoju arba vaistininku jei jums ilgą laiką 3 ar daugiau pakelių per dieną reikia, ypač jei jums buvo patarta vartoti vienas mažai druskos turintis (mažai natrio turintis) dieta laikytis ..

turi 186,87 mg natrio ( svarbisudėtinė dalis valgomoji druska sudedamoji dalis stalo druska ) viename pakelyje valgomoji druska) per maišelį. Šis atitinka 9,3% rekomenduojamos maksimalios dienos natrio kiekio mityboje suaugusiam žmogui . 3..

## 3. Movicol? Šis vaistas

Tai vaistas gali bet kuriuo metu būti vartojamas būti, su arba be maisto.

Ištirpinkite turinį kiekvieno pakelio 125 ml vandens. Tada išgerkite.

Vidurių užkietėjimas:

Viena dozė Movicol yra 1 pakelis ištirpintas į 125 ml vandens.

Vartokite 1 iki 3 kartus per dieną vieną pakelį priklausomai nuo sunkumo jūsų vidurių užkietėjimo vidurių užkietėjimas.

sukietėjimas ::

Prieš u Movicol vartojate prieš fekalinę impakciją turi būti patvirtinta yra kad jūs šį sutrikimą turite.

Dozė dozė prieš gydymą gydymui iš fekalinės impakcijos yra 8 paketai Movicol per dieną. Kiekvienas paketas turi būti ištirpintas 125 ml vandens. 8 paketai turi per 6 valandas suvartoti būti en šį, jei reikia, iki 3 dienų iš eilės. Jei turite širdies problemą, negalite daugiau nei 2 paketus per vieną valandą vartoti valanda vartoti.

Kaip sumaišyti:

Atidarykite maišelį ir supilkite turinį į stiklinę. Įpilkite 125 ml vandens į 125 ml vandens prie tas stiklinė iki. Maišykite gerai kol visas milteliai ištirpsta yra ir Movicol tirpalas skaidrus arba šiek tiek drumstas yra, ir gerkite tada tą tirpalą op. Jei vartojate Movicol vartojate dėl fekalinės obstrukcijos, gali būti lengviau kad 8 paketus į ištirpinti viename litre vandens. Gydymo trukmė

Gydymo trukmė gydymas:

Vidurių užkietėjimas:

Vienas gydymas su Movicol trunka paprastai apie 2 savaites. Jei Movicol ilgiau reikia vartoti, kreipkitės į savo gydytoją. Jei jūsų vidurių užkietėjimas sukeltas yra dėl ligos tokios kaip Parkinsono liga arba išsėtinė sklerozė (IS), arba jei Parkinsono liga arba išsėtinė sklerozė (IS), arba vaistus vartojate kurie vidurių užkietėjimą sukelia vidurių užkietėjimas galijusių gali jūsų gydytojas rekomenduoti Movicol ilgiau nei 2 savaites vartoti. Jei Movicol ilgiau reikia vartoti, kreipkitės į savo gydytoją. Dozavimas

ilgalaikiam vartojimui yra toks naudojimas gali paprastai būti sumažintas iki 1 arba 2 paketai per dieną.

Fekalinė impakcija:

Gydymas su Movicol gali iki 3 dienos trukti trukmė.

Ar jūs per daug Movicol išgėrėte?

Jūs galėtumėte gausiai viduriuoti galite gauti kas iki dehidracijos gali prieš. In šiuo atveju turite jūs nustoti vartoti Movicol ir pakankamai gerti. Jei jums kelianerimą, susisiekite su savo gydytoju arba jūsų menai vaistininkas.

Kai jūs per daug Movicol išgėrėte, nedelsdamis susisiekite su savo gydytoju, vaistininku arba ar (070/245.245). Ar jūs

pamiršote pamiršti Movicol pa imti?

Paimkite dozę kai tik jūs apie tai pagalvojate.

#### 4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir kiekvienas vaistas gali taip pat šis vaistas šalutinis poveikis turėti. Ne visi gauna su tuo susidurti ..

tai savo gydytojui nedelsiant ir nustokite vartoti Movicol Movicol jei jūs:

Sunki alerginė reakcija sukelia sunkumą su kvėpavimu, arba patinimą veido, lūpų, liežuvio ar gerklės., de lūpos, liežuvis arba kylis sukelia.

Kiti šalutiniai poveikiai yra:

Alerginės reakcijos kurios gali sukelti odos bėrimą, niežulį, odos paraudimą , arbadilgėlinę ,patinusias rankas rankos, kojos arba kulkšnys ir galvos skausmas gali sukelti, aukštas arba žemas kiekis kalio kraujyje ..

gali jums būti vienas nevirškinimas (lengvas sutrikimas virškinimo sistemos) turėti, pilvo skausmas arba gurguliavimas pilve . Jūs galite taip pat jausti išsipūtusį pojūtį jausmas turėti, paskutinis turėti nuo vidurių pūtimas, pykinimas būti arba vėmimas. Jūs gali taip pat skausmas prie išangės (sėdmenys) patirti ir u gali lengvas viduriavimas turėti pradžioje Movicol vartojimo pradžioje. Šie šalutiniai poveikiai paprastai pagerėja jei jūs pradėdate vartoti kiekį Movicol sumažinate.

Het pranešimas apie šalutinius poveikius

Jei Jums pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Tai taikoma taip pat ir šalutiniams poveikiams kurie ne į šiame pakuotės lapelyje nurodyta. Jūs galite šalutinius poveikius taip pat pranešti per:

Federalinė Agentūra vaistams ir sveikatos produktams [www.fagg.be](http://www.fagg.be)

[Skyrius](http://www.skyrius.lt)

Vigilancija Budrumas

Svetainė: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

el. paštas: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

Pranešdami apie nepageidaujamas reakcijas ar pranešti, padėdate mums mūsų gauti daugiau informacijos te apie saugumą saugumas nuo šis vaistas.

## 5. Kaip laikyti Jūs Movicol?

Laikyti matymo ir pasiekiamumo vaikams toliau ..

Movicol daugiau po daugiau ne de galiojimo data. Ją rasite ant pakelio ir dėžutės .

Tennurodyta mėnuo ir metai . Paskutinė diena galiojimoyra nurodyta etiketėje iš mėnuo yra galiojimo data.

Prieš šį vaistą yra nėra jokių specialių laikymo sąlygų.

Jei Movicol ištirpintas turite vandenyje ir u galite tai ne iškart išgerti, laikykite tada uždengtą ir šaldytuve šaldytuve (2°C - 8°C). Išmeskite kiekvieną tirpalą kuris ne per de 6 valandos naudotas buvo šalinamas.

Neskalaukite vaistų ne per kriauklę ar tualetą ir išmeskite jų ne į šiukšliadėžę. Klauskite savo vaistininko ką daryti su vaistais turite daryti kurių jūs nebe naudojate . Jei jūsų vaistus tinkamai išmetate , jie bus perdirbti tinkamai jie į vienas teisingas būdas sunaikintas ir patenka jie ne į aplinką patenka.

## 6. Turinys pakuotės ir kita informacija Kokios

medžiagos medžiagos yra Movicol sudėtyje?

Kiekvienas pakelis po 13,8 g Movicol turi šiuos ingredientus:

Makrogolis 3350	13,125 g
Natrio chloridas	0,3507 g

Natrio bikarbonatas	0,1785 g
Kalio chloridas	0,0466 g

Movicol turi taip pat žalioji citrina- ir citrinos aromatas ir kalio acesulfamas kaip saldiklis. Citrinos- ir žaliosios citrinos aromatas turi šiuos ingredientus ingredientai: guma ,maltodekstrinas maltodekstrinas, limoenų aliejus, citrinų aliejus, citralis, citrinų rūgštis ir vanduo.

Kai tirpalas paruoštas su 125 ml vandens, suteikia kiekvienas pakelis ekvivalentą: Natris

Natris	65 milimolliter
Chloridas	53 milimolliter
Kalis	5,4 milimolliter
Bikarbonatas	17 milimolliter

Kaip atrodo Movicol ir ir kas yra sudėtyje vienas pakuotė?

Movicol yra prieinamas į stačiakampiai maišeliai ir vamzdiniai maišeliai. Movicol yra vienas baltas milteliai.

Movicol yra prieinamas dėžutėse po 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 arba 100 maišeliai. Ne visi paminėti maišeliai ir pakuočių dydžiai yra prekyboje pateikiami rinkai.

Leidimo turėtojas leidimas dėl prekyboje pateikimo rinkai:

Norgine NV, Philipssite 5 bus 1, 3001 Heverlee

Gamintojas:

Laboratoires Macors, Rue des Caillottes, ZI La Plaine des Isles, 89000 Auxerre, Prancūzija  
Arba

Sophartex, 21 Rue du Pressoir, 28500 Vernouillet, Prancūzija  
Arba

Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nyderlandai Arba

Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, Höganäs, 263 35, Švedija

Arba

Delpharm Orleanas, 5 avenue de Concyr, ORLEANS CEDEX 2, 45071, Prancūzija

Šis vaistas yra registruotas į valstybėse narėse iš Europos Ekonominės Erdvės pagal de šiuos pavadinimus:

Belgija	MOVICOL
Vokietija	Makrogolis Norgine Citrinų ir Laimų aromatas Milteliai skirti Gamyba vieno tirpalo gerti Finlandija
MOVICOL	Airija
MOVICOL	Italija
MOVICOL 13,8 g	milteliai tirpalui gerti Austrija MOVICOL milteliai
Portugalija	MOVICOL
Ispanija	MOVICOL
Ispanija	MOVICOL
Švedija	MOVICOL

Numeris leidimas dėl pateikimo rinkai : BE180196Išdavimo būdas

: Laisvasišdavimas Šis

pakuotės lapelis yra dėl paskutinį kartą patvirtintas patvirtintas in 03/2025.

Transtoyou