

## Pakningsvedlegg: informasjon for pasienten MOVICOL

®13,8 g pose, pulver til drikk makrogol 3350,  
natriumklorid natriumkloridnatriumhydrogenkarbonat natriumhydrogenkarbonatkaliumklorid  
kaliumklorid

Les godt hele pakningsvedlegget før du dette legemidlet skal bruke for det står viktig informasjon i for deg.

Bruk dette legemidlet alltid nøyaktig som i denne pakningsvedlegget beskrevet eller som din lege, apotek eller sykepleier du det har fortalt.

- Oppbevar denne pakningsvedlegget. Kanskje har du det senere igjen trenger.
- Har du flere spørsmål? Ta da kontakt med din apotek.
- Får du problemer med én av bivirkninger som i avsnitt 4 står? Eller får du en bivirkning som ikke i denne pakningsvedlegget står? Ta da kontakt med din lege, apotek eller sykepleier.
- Blir dine plager ikke mindre, eller blir de til og med verre? Ta da kontakt med din lege.

Innhold av denne pakningsvedlegget:

1. Hva er Movicol og hva brukes det til?
2. Når bør du ikke bruke Movicol ikke bruke eller må du være ekstra forsiktig med det?
3. Hvordan bruker du Movicol?
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan oppbevarer du Movicol?
6. Innhold av pakken og annen informasjon 1.

1. og hva brukes det til brukes?

Navnet på dette legemidlet er Movicol 13,8 g pose, pulver til drikk. Det er et avføringsmiddel for behandling av forstoppelse hos voksne voksne, ungdommer og eldre. Det bruk hos barn under 12 år anbefales ikke ..

hjelper deg med en lettere avføring avføring te lage selv hvis du allerede lang tid forstoppet er. Movicol er også effektiv ved veldig alvorlig forstoppelse, fekal obstruksjon kalt.

2. Når kan du ikke bruke Movicol ikke bruke eller må du være ekstra forsiktig med være?

Ikke ta Movicol ikke hvis legen din har sagt har har at du:

- en indre obstruksjon har (tarmobstruksjon, ileus)
- en perforert tarmvegg har
- en alvorlig inflammatorisk sykdom i tarmen har, slik som colitis ulcerosa, sykdom av Crohn eller toksisk megakolon
- allergisk er for én av de stoffene i dette legemidlet. Disse stoffene kan du finne i rubrikk 6 i denne pakningsvedlegget.

Når må du være ekstra forsiktig med Movicol?

Ved bruk av Movicol må du tilstrekkelig væske forbli inntak. Movicol løsning er ingen erstatning for den regulære væskeinntaket.

Hjertesykdommer

Følg de spesielle instruksjonene ved rubrikk 3 hvis du Movicol tar for fekal obstruksjon.

Bruker du andre legemidler legemidlerTar

du i tillegg til Movicol andre ennå andre legemidler, har du det nylig gjort eller skal du dette kanskje snart gjøre ?Fortell det da da din lege eller apotek.

Noen legemidler, for eksempel anti-epileptika, kan muligens mindre godt virke under bruk av Movicol.

Du må ikke andre legemidler via munnen ta sammen med Movicol og i løpet av en time før og en time etter inntak av Movicol. av Movicol.

Hvis du væsker må tykne for å disse trygt å kunne svelge, vær oppmerksom på at Movicol kan motvirke effekten av fortykningsmidler kan motvirke.

Svangerskap og amming

Movicol kan under svangerskapet og amming brukes . Er du gravid, trordu gravid å gravid te er, ønsker du gravid bli eller gir du amming? Ta kontakt med din lege eller apotek før du dette legemidlet bruker.

Kjøreevne og det bruk av maskiner

Movicol har ingen påvirkning på din evne til å kjøre eller bruke maskiner å bruke.

Movicol inneholder natrium

Kontakt din lege eller apotek hvis du langvarig 3 eller flere poser per dag trenger har, spesielt hvis du har blitt anbefalt en saltfattig (natriumfattig) diett å følge.

Movicol inneholder 186,87 mg natrium (en viktig bestanddel av bordsaltbordsalt) per pose. Dette tilsvarer 9,3% av den anbefalte maksimale daglige mengden natrium i kosten for en voksen ..

3. bruker du Movicol? Dette

legemidlet legemiddel kan når som helst tas bli, med eller uten mat.

Løs opp innholdet av hver pose i 125 ml vann. Drikk det deretter.

Forstoppelse:

En dose av Movicol er 1 pose oppløst i 125 ml vann.

Ta 1 til 3 ganger per dag en pose avhengig av alvorlighetsgraden av alvorlighetsgraden av din forstoppelse.

Fekal innvirkning:

Før u Movicol tar for fekal obstruksjon må det bekreftes være at du denne tilstanden har.

Dosen for behandling av tilstanden av fekal obstruksjon er 8 poser Movicol per dag. Hver pose må bli oppløst i 125 ml vann. De 8 posene må innenfor de 6 timer inntas bli en dette, hvis nødvendig, opptil 3 dager lang. Hvis du et hjerteproblem har, må du ikke mer enn 2 poser i én time ta.

Hvordan blande:

Åpne posen og hell innholdet i et glass . Tilsett. 125 ml vann til det til det glass til. Rør godt til alt pulver oppløst er og Movicol løsning klar eller lett uklar er, og drikk deretter løsningen løsning på. Hvis du tar Movicol tar for fekal obstruksjon, kan det være lettere å løse opp 8 poser i en liter vann. Varighet av behandlingen en liter vann.

Varighet av behandling:

Forstoppelse:

En behandling med Movicol varer vanligvis omtrent 2 uker. Hvis du må ta Movicol lenger , gå tillegen din. Hvis legen din din forstoppelse forårsaket blir av en sykdom som sykdommen sykdom Parkinsons sykdom eller multippel sklerose (MS), eller hvis du legemidler tar som forstoppelse forårsaker, kan din legen din anbefale å ta Movicol lenger enn 2 uker å ta. Hvis du må ta Movicol lenger må ta, gå da til legen din. Dosen

for langvarig bruk langvarig bruk kan vanligvis bli redusert til 1 eller 2 poser per dag.

Fekal impaksjon:

En behandling med Movicol kan ta opptil 3 dager vare.

Har du for mye av Movicol inntatt?

Du kan få diaré som kan føre til dehydrering . I. I dette tilfelle bør du å stoppe med å ta Movicol og tilstrekkelig å drikke. Hvis du er bekymret , ta kontakt med din lege eller lege av apotek.

Når du for mye av Movicol har inntatt, kontakt da umiddelbart med din lege, apotek eller Giftinformasjonen (070/245.245).

Har du glemt Movicol i ta ta?

Ta dosen dosen så snart du tenker på det.

#### 4. Mulige bivirkninger

Som ethvert legemiddel kan også dette legemiddel bivirkninger ha. Ikke alle får det med ..

det legen din umiddelbart og stopp med inntaket av Movicol av Movicol hvis du:

En alvorlig allergisk reaksjon får som vanskeligheter med pust, eller hevelse i ansiktet, leppene , tungen eller halsenforårsaker forårsaker.

Andre bivirkninger er:

Allergiske reaksjoner som kan hudutslett, kløe, rødhet i huden, eller elveblest, hovne hender, føtter eller ankler og hodepine kan forårsake, høye eller lave mengder kalium i blodet.

Noen ganger kan du en fordøyelsesbesvær (mild forstyrrelse av fordøyelsen) ha, magesmerter eller rumling i magen. Du kan også føle oppblåst følelse ha, siste ha av luft i magen, kvalm være eller kaste opp. Du kan også smerte i anus (bakdel) oppleve og u kan mild diaré ha ved starten av inntak av Movicol. Disse bivirkningene forbedres vanligvis hvis du reduserer å ta mengde Movicol reduserer.

Det rapportere av bivirkninger

Får du plager av bivirkninger, ta kontakt med din lege, apotek eller sykepleier. Dette gjelder også for bivirkninger som ikke i denne pakningsvedlegget står. Du kan bivirkninger også rapportere via:

Føderalt Byrå for Legemidler og Helseprodukter

[www.fagg.be](http://www.fagg.be)

Avdeling Vigilans

Nettsted: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

e-post: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

Ved bivirkninger å rapportere, hjelper du oss med mer informasjon å få om sikkerheten til dette legemiddel.

## 5. Hvordan oppbevarer du Movicol?

Utenfor syn og rekkevidde av barn holde.

Bruk Movicol ikke mer etter de siste holdbarhetsdato. Den finner du på posen og boksen . Derstår en måned og et år . Densiste dag dag av den måned er den siste holdbarhetsdatoen.

For dette legemidlet er det ingen spesielle lagringsbetingelser.

Hvis du har Movicol oppløst i vann og du kan det ikke med en gang drikke opp, oppbevar det da tildekket og i kjøleskapet (2°C - 8°C). Kast hver løsning som ikke innen de 6 time brukt ble bort.

Skulle legemidler ikke gjennom vasken eller toalettet og kast dem ikke i søppelbøtta. Spør din apotek hva du skal gjøre med legemidler må gjøre med de ikke lenger bruker. Hvis du legemidler på den riktige måten kaster, blir de på en riktig måte ødelagt og komme de ikke i miljøet havner.

## 6. Innhold av pakken emballasjen og annen informasjon

Hvilke stoffer sitter er i Movicol?

Hver pose på 13,8 g Movicol inneholder det følgende:

Macrogol 3350	13,125 g
Natriumklorid	0,3507 g
Natriumbikarbonat	0,1785 g
Kaliumklorid	0,0466 g

Movicol inneholder også lime- og sitronaroma og kaliumacesulfam som søtningmiddel. Sitron- og limearoma inneholder de følgende ingredienser: arabisk gummi, maltodekstrin, limeolje, sitronolje, citral, sitronsyre og vann.

Når løsningen er laget med 125 ml vann, gir hver pose ekvivalenten av: Natrium

Natrium	65 millimol/liter
Klorid	53 millimol/liter
Kalium	5,4 millimol/liter
Bikarbonat	17 millimol/liter

Hvordan ser Movicol ut og hva inneholder en emballasje?

Movicol er tilgjengelig i rektangulære poser og rørformede poser. Movicol er en hvit pulver.

Movicol er tilgjengelig i esker med 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 eller 100 poser. Ikke alle nevnte poser og pakningsstørrelser blir i handelen brakt.

Innehaver av tillatelsen for å bringe på markedet:

Norgine NV, Philipssite 5 bus 1, 3001 Heverlee

Produsent:

Laboratoires Macors, Rue des Caillottes, ZI La Plaine des Isles, 89000 Auxerre, Frankrike

Eller

Sophartex, 21 Rue du Pressoir, 28500 Vernouillet, Frankrike

Eller

Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederland Eller

Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, Höganäs, 263 35, Sverige

Eller

Delpharm Orleans, 5 avenue de Concyr, ORLEANS CEDEX 2, 45071, Frankrike

Dette legemidlet er registrert i medlemsstatene i Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde under de følgende navn:

Belgia	MOVICOL
Tyskland	Macrogol Norgine Sitron- og Limearoma Pulver til Fremstilling av en løsning til inntak
Finland	MOVICOL
Irland	MOVICOL
Italia	MOVICOL 13,8 g pulver for oral løsning
Østerrike	MOVICOL-pulver
Portugal	MOVICOL
Spania	MOVICOL
Sverige	MOVICOL

Nummer på tillatelse for å sette i handel : BE180196Utleveringsmåte

: Friutlevering Denne

pakningsvedlegget er for siste gang godkjent i 03/2025.