

Ulotka: informacja dla pacjenta MOVICOL

@^{13,8g} saszetka ,proszek do napoju makrogol 3350,
chlorek sodu chlorek soduwodorowęglan sodu wodorowęglan soduchlorek potasu chlorek
potasu

Przeczytaj dokładnie całą ulotkę zanim użyjesz tego leku zaczniesz stosować ponieważ zawiera ważne informacje dla Ciebie. Stosuj ten lek zgodnie z zaleceniami zawsze dokładnie jak w tej ulotce opisano lub jak twój lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka ci to powiedział ..

- Przechowywać ten ulotka. Może masz go później znowu potrzebny.
- Masz u jeszcze pytania? Skontaktuj się z swoim farmaceutą.
- Czy masz problemy z jednym z działania niepożądane które w sekcja 4 są wymienione? Lub czy masz działanie niepożądane które nie w tej ulotce jest wymienione ? Skontaktuj się wtedy z swoim lekarzem, lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka.
- Czy Twoja dolegliwość nie zmniejsza się, lub staje się nawet gorsza? Skontaktuj się wtedy z swoim lekarzem.

Zawartość tej ulotki ulotka:

1. Co to jest Movicol i do czego jest on stosowany?
2. Kiedy nie wolno stosować Movicol nie stosować lub należy zachować szczególną ostrożność przy nim?
3. Jak używa Pan/Pani Movicol?
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowuje Pan/Pani Movicol?
6. Zawartość opakowania i pozostałe informacje 1.

1. Co to jest Movicol w jakim celu jest stosowany ? używany?

Nazwa tego leku to Movicol 13,8 g saszetka, proszek do napoju. Jest to środek przeczyszczający do leczenia zaparcí u dorosłych . dorośli, adolescentów i osób starszych. Het stosowanie u dzieci poniżej 12 lat nie jest zalecane ..

pomaga Ci w łatwiejszym wypróznieniu łatwiejszym wypróznieniu te maken nawet jeśli już długi czas zaparcia masz. Movicol jest również skuteczny przy bardzo ciężkich zaparciach, zwanych niedrożnością kałową.

2. Kiedy nie wolno stosować Movicol nie używać lub musisz być szczególnie ostrożny z nim być?

Nie przyjmuj Movicol nie jeśli twój lekarz powiedział powiedział ma że masz:

- wewnętrzną niedrożność (niedrożność jelit , ileus)perforacjęściany jelita
- masz poważną chorobę zapalną jelita
- masz poważną chorobę zapalną jelita masz ,, jak colitis ulcerosa, choroba Leśniowskiego-Crohna lub toksyczne megacolon
- alergiczny jesteś na jeden z substancji w tym leku. Te substancje możesz znaleźć w sekcji rubryce 6 tej ulotki.

Kiedy musisz być szczególnie ostrożny z Movicol?

Podczas stosowania Movicol musisz być wystarczająco płyn pozostać przyjmować. Roztwór Movicol roztwór jest nie zamiennik dla regularnego regularnego spożycia płynów.

Choroby serca

Postępuj zgodnie z specjalnymi instrukcjami przy rubryka 3 jeśli używasz Movicol przyjmujesz na masy kałowe.

Czy używasz jeszcze inne leki?

Czy przyjmujesz oprócz Movicol jeszcze inne leki, czy Pan/Pani to niedawno zrobił/zrobiła czy zamierza Pan/Pani to może wkrótce zrobić? Proszę to wtedy następnie twój lekarz lub farmaceuta.

Niektóre leki, na przykład leki przeciw-padaczkowe, mogą mniej skutecznie działać podczas stosowania Movicol. użycie z Movicol.

Nie wolno przyjmować innych leków doustnie wraz z Movicol jednocześnie z Movicol i przez godzinę przed i godzinę po przyjęciu Movicol. podanie z Movicol.

Jeśli płyny musisz zagęścić aby je bezpiecznie móc przełknąć połącz pamiętaj o tym, że rachunek zagęszczaczy może przeciwdziałać zagęstniki może przeciwdziałać.

Ciąża i karmienie piersią

Movicol może podczas ciąży ciąży karmienia piersią być stosowany . Czy jesteś w ciąży ,myślisz że jesteś w ciąży lub to są, chcesz w ciąży zajść lub karmisz piersią? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą zanim użyjesz tego leku lekarstwo Zdolność prowadzenia pojazdów.

Zdolność prowadzenia pojazdów w het użycie maszyn

Movicol nie ma żadnego wpływu na twoją zdolność do prowadzenia lub maszyn używać . Movicol.

sód zawiera sód

Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą jeśli potrzebujesz długotrwale 3 lub więcej saşetek na dzień potrzebujesz ,zwłaszcza jeśli zalecono Ci stosowanie jednego jeden ubogi w sól (ubogi w sól) dieta stosować ..

zawiera 186,87 mg sodu (ważny składnik soli kuchennej składnik soli stołowej) nasaszetkęsól kuchenna) na saşetka. Dł przychodzi odpowiada z 9,3% zalecanej maksymalnej dziennej ilości sodu w diecie dla dorosłego . 3..

3. Movicol? Ten lek

To lekarstwo może w dowolnym momencie przyjmowany być, z lub bez jedzenia.

Rozpuść zawartość każdego saşetki w 125 ml wody. Następnie wypij.

Zaparcia:

Jedna dawka Movicol to 1 saşetka rozpuszczona w 125 ml wody.

Weź 1 do 3 razy na dzień saşetkę w zależności od nasilenia zaparcia . Zatwardzenie : Przed.

Kałowe wpuklina:

Przed u Movicol przyjmuje na masy kałowe musi być potwierdzone że u tej choroby cierpi ..

dawka na leczenie tej choroby z kałowej zalegania to 8 saszetek Movicol na dzień. Każda saszетка musi być rozpuszczona w 125 ml wody. Te 8 saszetek musi zostać w ciągu 6 godzin przyjęte zostać w tym, jeśli potrzebne, do 3 dni długo. Jeśli masz problem z sercem , nie możesz więcej niż 2 saszetki w jednej godzinie przyjmować godzina przyjmować.

Jak wymieszać:

Otwórz saszetkę i wlej zawartość jej do szklanki . Dodaj. 125 ml wody do szklanki do to szklanka do. Mieszaj dobrze aż cały proszek rozpuszczony jest i Movicol roztwór przezroczysty lub lekko mętny jest, i wypij następnie roztwór roztwór op. Jeśli przyjmujesz Movicol przyjmujesz na zaleganie kału ,może być łatwiej rozpuścić 8 saszetek w jednym litrze wody. Czas trwania leczenia jeden litr wody.

Czas trwania leczenie:

Zaparcie:

Een leczenie z Movicol trwa zwykle około 2 tygodnie. Jeśli musisz przyjmować Movicol dłużej musisz przyjmować, skonsultuj się z swoim lekarzem. Jeśli twój zaparcie powodowane jest przez chorobę taką jak choroba Parkinsona lub stwardnienie rozsiane (SM), lub jeśli przyjmujesz leki które powodują zaparcia , może to wpływać na twoje lekarz zalecać aby Movicol dłużej niż 2 tygodnie przyjmować . Jeśli musisz przyjmować Movicol dłużej , skontaktuj się z swoim lekarzem. Dawkowanie dla długotrwałego

De dawkowanie dla długotrwały użycie może zwykle być obniżona do 1 lub 2 saszetek na dzień.

Zatwardzenie ::

Movicol może trwać do 3 dni do 3 dni trwać.

Czy Pan/Pani za dużo Movicolu zażył(a)?

Może Pan/Pani doświadczyć biegunki obfitej która może prowadzić do odwodnienia . W. W ten przypadek należy u przestać przyjmować Movicol i pić wystarczająco dużo płynów . Jeśli się martwisz , skontaktuj się z swoim lekarzem lub sztuka farmaceuta.

Kiedy u za dużo Movicol przyjąłeś , skontaktuj się natychmiast natychmiast swoim lekarzem, farmaceutą lub Centrum Zatruc (070/245.245). Czy

zapomniałeś zapomnieć Movicol w przy jmować?

Przyjmij dawkę gdy tylko Pan/Pani o tym pomyśli.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek może również ten lek działania niepożądane mieć. Nie każdy dostaje z tym do czynienia.

Powiedz to swojemu lekarzowi natychmiast i przestań przyjmować Movicol jeśli ty:

Poważna reakcja alergiczna wystąpi która powoduje trudności z oddychaniem, lub obrzęk twarzy , warg, języka lub gardła powoduje, język lub mostek powoduje.

Inne działania niepożądane to:

Reakcje alergiczne które mogą obejmować wysypkę, świąd, zaczerwienienie skóry ,
lub pokrzywkę ,spuchnięte ręce , stopy lub kostki i ból głowy mogą powodować, wysokie
lub niskie ilości potasu we krwi.

Czasami może Pan/Pani mieć niestrawność (łagodna dysfunkcja układu trawiennego) mieć,
ból brzucha lub burczenie w brzuchu. Możesz również odczuwać uczucie wzdęcia uczucie
mieć, dolegliwości mieć z wzdęcia, nudności być lub wymioty. Możesz również odczuwać ból
w odbycie (pośladki) doświadczać i u może łagodną biegunkę mieć przy rozpoczęciu
przyjmowania Movicol. Te działania niepożądane zwykle poprawiają się gdy zmniejszy się do
przyjmowaną ilość Movicol zmniejsza.

Het melden van działania niepożądane

Czy masz problemy z działania niepożądane, skontaktuj się z swoim lekarzem, farmaceutą lub
pielęgniarką. To dotyczy również dla działania niepożądane które nie w tej ulotce są. Możesz
zgłosić działania niepożądane również zgłosić przez:

Federalna Agencja ds. Leków i Produktów Zdrowotnych

www.fagg.be

Dział Nadzoru

Strona internetowa: www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Zgłaszając działania niepożądane herbata zgłaszać, pomagasz nam uzyskać więcej informacji
informacja uzyskać o bezpieczeństwie leku z ten lek.

5. Jak przechowywać Movicol?

Poza zasięgiem i dostępem dzieci trzymać ..

Movicol po upływie terminu ważności de ostateczna data ważności. Ta znajduje się na
saszetce i pudełku . Tam jest miesiąc i rok . Ostatni dzień miesiąca jest ważny . z tego miesiąca
jest ostateczny termin ważności.

Dla tego leku nie ma żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Jeśli rozpuścisz Movicol w wodzie masz i w u możesz go nie od razu wypić, przechowaj go
wtedy przykryty i w lodówce (2°C - 8°C). Wyrzucić każdy roztwór który nie w ciągu de 6
godzina używany został z dala.

Spłucz leki nie przez zlew lub toaletę i wyrzucić je nie do kosza na śmieci. Zapytaj swojego
farmaceutę co zrobić z lekami które należy których już nie używasz. Jeśli leki w odpowiedni
sposób utylizujesz, zostaną one w jeden właściwy sposób zniszczone i trafić one nie do
środowiska dostać.

6. Zawartość opakowania opakowania i pozostałe informacje

Jakie substancje zawiera w Movicol?

Każda saszetka 13,8 g Movicol zawiera następujące składniki:

Makrogol 3350	13,125 g
Chlorek sodu	0,3507 g
Wodorowęglan sodu	0,1785 g
Chlorek potasu	0,0466 g

Movicol zawiera również limonka- i aromat cytrynowy i acesulfam potasu jako substancja słodząca. Cytrynowy- i aromat limonkowy zawiera następujące składniki: , maltodekstryna, maltodekstryna, olejek limetkowy, olejek cytrynowy, cytral, kwas cytrynowy i woda.

Gdy roztwór przygotowany jest z 125 ml wody, daje każda saszетка równowartość: Sód

Sód	65 milimolFlitr
Chlorek	53 milimolFlitr
Potas	5,4 milimolFlitr
Wodorowęglan	17 milimolFlitr

Jak wygląda Movicol i jak co jest w jedno opakowanie?

Movicol jest dostępny w prostokątnych saszetkach i tubowych saszetkach. Movicol jest białym proszkiem ..

dostępny dostępny w opakowaniach po 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 lub 100 saszetki. Nie wszystkie wymienione saszetki i wielkości opakowań są w handlu dostępne.

Posiadacz pozwolenia na wprowadzenie do obrotu handlowego przynieść:

Norgine NV, Philipssite 5 bus 1, 3001 Heverlee

Producent:

Laboratoires Macors, Rue des Caillottes, ZI La Plaine des Isles, 89000 Auxerre, Francja
Lub

Sophartex, 21 Rue du Pressoir, 28500 Vernouillet, Francja

Lub

Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederland Of

Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, Höganäs, 263 35, Szwecja

Of

Delpharm Orleans, 5 avenue de Concyr, ORLEANS CEDEX 2, 45071, Francja

Ten lek jest zarejestrowany w państwach członkowskich Unii Europejskiej Gospodarczej Przestrzeni pod nazwą następującymi nazwami:

Belgia	MOVICOL
Niemcy	Makrogol Norgine o smaku cytrynowym i limetkowym Proszek do Produkcja roztworu do spożycia Finlandia
MOVICOL	Irlandia
MOVICOL	Włochy
MOVICOL 13,8 g	proszek do roztworu doustnego Austria
MOVICOL-proszek	Portugalia
MOVICOL	Hiszpania
Hiszpania	MOVICOL
Szwecja	MOVICOL

Numer zezwolenia na wprowadzenie do obrotu : BE180196Sposób wydawania

: Wydawanie bez recepty Niniejsza

ulotka została ostatnio zatwierdzona to ostatni zatwierdzony w 03/2025.

Transtoyou