

## Folheto informativo: informação para o paciente

MOVICOL® 13,8 g saqueta, pó para solução oral  
macrogol 3350, cloreto de sódio, bicarbonato de sódio, cloreto de potássio

Leia bem todo o folheto informativo antes de você este medicamento for usar pois há informações importantes nele para você. Use este medicamento medicamento sempre exatamente como in este folheto informativo descrito ou como seu médico, farmacêutico ou enfermeiro lhe isso disse ..

- Guardar este folheto. Talvez tenha você ele mais tarde novamente precisar.
- Tem você mais perguntas? Entre em contato com seu farmacêutico.
- Sente você desconforto de um de efeitos secundários que na seção 4 estão? Ou tem você um efeito secundário que não neste folheto está ? Entre em contato com seu médico, médico, farmacêutico ou enfermeiro.
- Está sua queixa não diminui, ou fica ele até pior? Entre em contato com seu médico.

Conteúdo deste folheto informativo:

1. O que é Movicol e para que é usado ?Quando
2. não deve usar Movicol ou deve ter cuidado extra com ? Como com são?
3. Como usado você Movicol?
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como armazenar você Movicol?
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

### 1. O que é Movicol e para que é ele usado?

O nome de este medicamento é Movicol 13,8 g saqueta, pó para bebida. É um laxante para o tratamento de constipação em adultos, adolescentes e idosos. Het uso em crianças abaixo 12 anos não é recomendado ..

ajuda você a uma evacuação mais fácil fezes te fazer mesmo se você já longo tempo constipado está. Movicol é também eficaz em casos de grave constipação, impactação fecal chamada.

### 2. Quando pode usar Movicol não usar ou deve ter cuidado especial com ele?

Não tome Movicol não se seu médico disse disse tem que você:

- um bloqueio interno tem (obstrução intestinal, íleo)
- uma perfuração da parede intestinal tem
- uma doença inflamatória grave do intestino tem, como colite ulcerativa, doença de Crohn ou megacólon tóxico
- alérgico é a um dos componentes neste medicamento medicamento. componentes substâncias pode você encontrar em seção 6 deste este folheto.

Quando deve você extra cautela ser com Movicol?

Ao uso de Movicol deve você suficiente líquido continuar tomar. A solução Movicol solução é não substituição para a regular ingestão de líquidos.

Doenças cardíacas

Siga as instruções especiais em rubrica 3 se você Movicol toma para impactação fecal.

Usa você ainda outros medicamentos?

Toma você além de Movicol ainda outros medicamentos, tem você isso recentemente feito ou vai você isso talvez em breve fazer? Informe isso então seu médico ou farmacêutico.

Alguns medicamentos, por exemplo anti-epiléticos, podem possivelmente menos bem funcionar durante o uso de Movicol.

Você pode não outros medicamentos via oral tomar junto com Movicol e durante uma hora antes e uma hora após tomar Movicol.

Se você líquidos precisa engrossar para estes com segurança a poder engolir, lembre-se de que Movicol pode neutralizar o efeito de espessantes pode contrariar.

Gravidez e amamentação

Movicol pode durante a gravidez e amamentação ser usado. Está grávida, acha que está grávida de chá são, deseja grávida ficar ou dá você amamentação? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico antes de você este medicamento usar.

Habilidade de condução e o uso de máquinas

Movicol não tem nenhuma influência sobre sua capacidade de dirigir ou operar máquinas usar. Movicol.

sódio contém sódio

Entre em contato com seu médico ou farmacêutico se você prolongadamente 3 ou mais sachês por dia necessário tem, especialmente se você foi aconselhado um baixo teor de sal (baixo teor de sódio) dieta seguir ..

contém 186,87 mg de sódio (um importante componente do sal de cozinha 2Fsal de mesa) porsaqueta saquinho. Dit vem corresponde a 9,3% da recomendada máxima diária quantidade de sódio na alimentação para um adulto.

3. Como usa você Movicol?

Este medicamento pode a qualquer momento ser tomado, com ou sem alimento ..

conteúdo de cada saquinho em 125 ml de água. Beba em seguida. Constipação

Constipação:

dose de Movicol é 1 saquinho dissolvido resolvido em 125 ml de água.

Tome 1 a 3 vezes por dia um sachê conforme a gravidade da sua constipação.

Impactação fecal:

Antes de u Movicol toma para fecal impactação deve há confirmado estar que você esta condição tem.

A dose para o tratamento de fecal impactação é 8 saquetas Movicol por dia. Cada saqueta deve ser dissolvida em 125 ml de água. As 8 saquetas devem dentro de 6 horas ingeridas ser

em isto, se necessário, até 3 dias de duração. Se você um problema cardíaco tem, não deve mais de 2 saquetas em uma hora tomar ingerir.

Como misturar:

Abra o sachê e despeje o conteúdo dele em um copo. Adicione aproximadamente 125 ml de água ao o copo em seguida. Mexa bem até que todo o pó dissolvido esteja e a Movicol solução clara ou ligeiramente turva esteja, e beba então a solução op. Se você estiver tomando Movicol toma para impactação fecal, pode ser mais fácil ser dissolver 8 saquetas em um litro de água. Duração do

tratamento tratamento:

Constipação:

Um tratamento com Movicol dura geralmente cerca de 2 semanas. Se você precisar tomar Movicol por mais tempo , consulte seu médico . Se seu médico seu constipação causada é por uma doença como a doença de Parkinson ou esclerose múltipla (EM), ou se você medicamentos toma que constipação causam, pode seu médico recomendar o Movicol mais de 2 semanas tomar .Se você precisar tomar Movicol mais deve tomar, então vá ao seu médico.

A dosagem para prolongado uso pode geralmente ser reduzida a 1 ou 2 saquetas por dia.

Impactação fecal:

Um tratamento com Movicol pode durar até 3 dias duração.

Tem você demais de Movicol tomado?

Você poderia ter diarreia excessiva que pode levar à desidratação . Em. Em este caso deve você parar de tomar Movicol de Movicol beber suficiente para hidratar-se. Se você estiver preocupado , entre em contato com seu médico ou artes de farmacêutico.

Quando você muito de Movicol tomou , entre em imediato contato com seu médico, farmacêutico ou o Centro de Intoxicações (070/245.245). Esqueceu-se de

tomar esquecido Movicol em te tomar?

Tome a dosagem assim que você se lembrar ..

4. efeitos colaterais Como

qualquer medicamento pode também este este medicamento efeitos colaterais ter. Não todos recebem com isso a ver.

Informe o seu médico imediatamente e pare com a ingestão de Movicol se você:

Uma grave reação alérgica tiver que dificuldades com respiração, ou inchaço do rosto, dos lábios, língua ou garganta causar.

Outros efeitos colaterais são:

Reações alérgicas que uma erupção cutânea, coceira, vermelhidão da pele, ou urticária, mãos inchadas, pés ou tornozelos e dor de cabeça podem causar, altas ou baixas quantidades potássio no sangue.

Às vezes pode sentir um indigestão (leve distúrbio da digestão) ter, dor abdominal ou borborigmos no abdômen. Você pode também uma sensação de inchaço sensação ter, último ter de flatulência, náusea estar ou vômito. Você pode também dor no ânus (nádegas) experimentar e u pode leve diarreia ter no início da administração de Movicol. Estes efeitos colaterais melhoram geralmente se você a tomar quantidade Movicol reduz Movicol reduz.

O relatar de efeitos colaterais

Sente efeitos colaterais, entre em contato com seu médico, farmacêutico ou enfermeiro .  
Issotambém se aplica a efeitos colaterais que morrer não em este folheto estão. Você pode efeitos colaterais também relatar via:

Agência Federal para Medicamentos e Produtos de Saúde

[www.fagg.be](http://www.fagg.be)

Departamento Vigilância

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

e-mail: [adr@fagg-afmps.be](mailto:adr@fagg-afmps.be)

Ao efeitos secundários relatar ,ajuda a nos a mais informação obter sobre a segurança de segurança de este medicamento.

5. Como armazenar o Movicol?

Fora da vista e alcance de crianças manter.

Use Movicol não mais após de data de validade. Você encontra no sachet e a caixa. Lá está um mês e um ano. O último dia de mês é a data de validade final.

Para este medicamento não há nenhuma condição especial.

Se você estiver tomando Movicol Se você dissolveu Movicol em água e u pode o não imediatamente beber, guarde então coberto e na geladeira (2°C - 8°C). Descarte qualquer solução que não dentro de 6 hora usado foi fora.

Enxágue medicamentos não pelo ralo ou o vaso sanitário e jogue eles não no lixo. Pergunte ao farmacêutico o que você deve fazer com medicamentos que fazer que você não mais usa. Se você medicamentos da maneira correta descartar, eles serão eliminados de um correta maneira destruído e chegar eles não no meio ambiente acabar.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Quais substâncias estão no Movicol?

Cada saquinho de 13,8 g de Movicol contém o seguinte:

Macrogol 3350	13,125 g
Cloreto de sódio	0,3507 g
Bicarbonato de sódio	0,1785 g
Cloreto de potássio	0,0466 g

Movicol contém também limão- e aroma de limão e acesulfame de potássio como adoçante. Aroma de limão- e aroma de limão contém os seguintes ingredientes: goma arábica, maltodextrina, óleo de limão, óleo de citronela, citral, ácido cítrico e água.

Uma vez a solução preparada com 125 ml de água, fornece cada sachê o equivalente a:

Sódio	65 milimol/litro
Cloreto	53 milimol/litro
Potássio	5,4 milimol/litro
Bicarbonato	17 milimol/litro

Como parece Movicol parece e o que está em um embalagem?

Movicol é disponível em saquetas retangulares e saquetas tubulares .Movicol é um pó branco.

Movicol é disponível em caixas de 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 ou 100 saquetas. Não todas mencionadas saquetas e tamanhos de embalagem são no comércio colocadas.

Titular da autorização para a colocação no mercado trazer:

Norgine NV, Philipssite 5 bus 1, 3001 Heverlee

Fabricante:

Laboratoires Macors, Rue des Caillottes, ZI La Plaine des Isles, 89000 Auxerre, França

Ou

Sophartex, 21 Rue du Pressoir, 28500 Vernouillet, França

Ou

Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Países Baixos Ou

Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, Höganäs, 263 35, Suécia

Ou

Delpharm Orleans, 5 avenue de Concyr, ORLEANS CEDEX 2, 45071, França

Este medicamento está registrado em Estados-Membros da Europeia Econômica Espaço sob o seguintes nomes:

Bélgica	MOVICOL
Alemanha	Macrogol Norgine Aroma de Limão e Lima Pó para Fabricação de uma solução para ingestão
Finlândia	MOVICOL
Irlanda	MOVICOL
Itália	MOVICOL 13,8 g pó para solução oral
Áustria	MOVICOL-Pulver
Portugal	MOVICOL
Espanha	MOVICOL
Suécia	MOVICOL

Número da autorização para a introdução no comércio : BE180196Modo de entrega

: Entrega livreEsta folha informativa

foi pela última vez aprovada último aprovado em 03/2025.