

Prospect: informații pentru pacientul MOVICOL

®^{13,8g} plic ,pulbere pentru soluție orală macrogol 3350,
clorură de sodiu clorură de sodiubicarbonat de sodiu bicarbonat de sodiuciorură de potasiu
clorură de potasiu

Citiți bine tot prospectul înainte să utilizați acest medicament să utilizați deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră. Utilizați acest medicament acest medicament întotdeauna exact cum în acest prospect descris sau cum medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală v-a spus a spus ..

- Păstrați acest prospect. Poate aveți nevoie de el mai târziu din nou nevoie.
- Aveți dumneavoastră întrebări ? Contactați farmacistul dumneavoastră ..
- probleme cu unul unu de efecte secundare care sunt în rubrica 4 menționate? Sau aveți dumneavoastră un efect secundar care nu în acest prospect este menționat? Contactați medicul dumneavoastră, farmacist sau asistent medical.
- Devine dumneavoastră simptomul nu mai puțin, sau devine el chiar mai grav? Contactați atunci medicul dumneavoastră.

Conținutul acestui prospect prospect medicamentos:

1. Ce este Movicol și pentru ce se utilizează ? Când
2. Când sau trebuie să fiți deosebit de precaut cu el precauție Cum sunt?
3. Cum utilizat dumneavoastră Movicol?
4. Posibile efecte secundare
5. Cum păstrați dumneavoastră Movicol?
6. Conținutul al ambalajului și alte informații

1. Ce este Movicol și pentru ce se utilizează ??

Numele acestui medicament este Movicol 13,8 g plic, pulbere pentru băutură. Este un laxativ pentru tratamentul constipației la adulți la adulți, adolescenți și vârstnici. Het utilizarea la copii sub 12 ani nu este recomandată ..

ajută să aveți o defecație mai ușoară scaun te a face chiar dacă ați fost deja lungă perioadă constipat sunteți. Movicol este de asemenea eficient în cazuri severe de constipație, numită impactare fecală.

2. Când nu trebuie să utilizați Movicol nu utilizați sau trebuie să fiți precaut cu fiți?

Nu luați Movicol nu dacă medicul dumneavoastră v-a spus a spus are că u:

- un internă obstrucție aveți (obstrucție intestinală, ileus)
- un perete intestinal perforat aveți
- o boală inflamatorie gravă a intestinului aveți, cum ar fi colită ulceroasă, boala Crohn sau megacolon toxic
- alergic sunteți la unul dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe puteți dumneavoastră găsi în rubrica 6 din acest prospect.

Când trebuie să fiți precaut cu Movicol?

La utilizarea Movicol trebuie să suficient lichid continuați a lua. Soluția Movicol soluție este nu înlocuire pentru aportul regulat de lichide.

Boli de inimă

Urmați instrucțiunile speciale instrucțiuni pentru rubrică 3 dacă luați Movicol luați pentru impact fecal ..

dumneavoastră alte medicamente ? Luați dumneavoastră pe lângă Movicol alte medicamente încă alte medicamente, ați tu asta recent făcut sau de veți tu face poate în curând faceți? Spuneți asta atunci medicul sau farmacistul.

Unele medicamente, de exemplu anti-epileptice, pot să fie mai puțin eficiente în timpul utilizării Movicol . de Movicol.

Nu trebuie să luați alte medicamente pe cale orală împreună cu Movicol și timp de o oră înainte și o oră după administrarea de Movicol. de Movicol.

Dacă lichide trebuie îngroșați pentru a acestea în siguranță a putea înghiți, țineți cont de faptul că Movicol poate reduce efectul agenților de îngroșare poate contracara.

Sarcină și alăptare

Movicol poate în timpul sarcinii și alăptării utilizat fi . Sunteți însărcinată , credeți că însărcinată să te sunt, doriți însărcinată să rămâneți sau alăptați dumneavoastră alăptare? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament ..

și în utilizarea mașinilor Movicol

nu are nicio influență asupra capacității dumneavoastră de a conduce sau de a folosi mașini . Movicol.

sodiu conține sodiu

Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă aveți nevoie de 3 sau mai multe plicuri pe zi pentru o perioadă lungă, mai ales dacă vi s-a recomandat un sărac în sare (sărac în sodiu) dietă a urma ..

conține 186,87 mg sodiu (uncomponent important al sării de bucătărie /sării de masă) per pliculeț. vine corespunde cu 9,3% din cantitatea maximă zilnică recomandată de sodiu în dietă pentru un adult.

3. Cum utilizați Movicol?

Acest medicament poate în orice moment luat fi, cu sau fără alimente.

Dizolvați conținutul fiecărui plic în 125 ml de apă. Apoi beți-l.

Constipație:

O doză de Movicol este 1 plic dizolvat în 125 ml apă.

Luați 1 până la 3 ori pe zi un plic în funcție de severitatea constipației dumneavoastră. Impact fecal: Înainte de.

Fecale impactare:

Înainte de u Movicol luați pentru fecală impactare trebuie să confirmat fie că dumneavoastră această afecțiune aveți.

Doza pentru tratamentul de tratament de fecală impactare este 8 plicuri Movicol pe zi. Fiecare plic trebuie să fie dizolvat în 125 ml de apă. Cele 8 plicuri trebuie în decurs de 6 ore administrate să fie en acest, dacă necesar, până la 3 zile la rând. Dacă aveți o problemă cardiacă , nu trebuie săluați mai mult de 2 pliculețe în o oră luați a lua.

Cum amestecați:

Deschideți pachetul și turnați conținutul acestuia într-un pahar . Adăugați. 125 ml apă la 125 ml apă la acesta pahar apoi. Amestecați bine până când tot pulberea s-a dizolvat este și soluția Movicol soluție clară sau ușor tulbure este, și beți apoi soluția soluție op. Dacă luați Movicol luați pentru impactare fecală, poate fi mai ușor să dizolvați 8 plicuri în un litru de apă. Durata

tratamentului tratament:

Constipație:

Un tratament cu Movicol durează de obicei aproximativ 2 săptămâni. Dacă luați Movicol mai mult trebuie să luați, mergeți la medicul dumneavoastră. Dacă dumneavoastră constipație cauzată este de o boală precum boala boală de Parkinson sau scleroză multiplă (SM), sau luați medicamente care provoacă constipație constipație poatesă vă afecteze medicul recomanda să luați Movicol mai mult de 2 săptămâni să luați. Dacă trebuie să luați Movicol mai mult trebuie să luați, mergeți la medicul dumneavoastră.

Doza pentru utilizare pe termen lung de lungă durată utilizare poate de obicei fi redusă plicuri pe zi ..

fecală ::

tratament cu Movicol poate dura până la 3 zile zile duren.

Aveți dumneavoastră prea mult de Movicol luat?

Ați putea diaree abundentă avea care la deshidratare poate duce . În. În acest caz trebuie să opriți administrarea de Movicol și să consumați suficient lichide. Dacă vă faceți griji , contactați medicul dumneavoastră medic de familie farmacist.

Când dumneavoastră prea mult de Movicol ați luat, contactați imediat medicul dumneavoastră , farmacistul sau Centrul de Toxicologie (070/245.245). Ați

uitat uitat Movicol în a lua?

Luați doza imediat ce vă aduceți aminte.

4. Posibile efecte secundare

Ca orice medicament poate și acest medicament efecte secundare au. Nu toată lumea primește cu asta de a face.

Spuneți acest medicului medic imediat și opriți administrarea de Movicol dacă dumneavoastră:

O gravă alergică reacție aveți care dificultăți cu respirația, sau umflarea feței feței, buzelor , limbii sau gâtuluicauzează cauzează.

Alte efecte secundare sunt:

Reacții alergice care provoacă erupții cutanate, mâncărime, roșeață a pielii, sau urticarie, mâini umflate, picioare sau glezne și dureri de cap pot cauza, cantități mari sau mici cantități de potasiu în sânge.

Uneori poate să aveți un indigestie (ușoară tulburare a digestiei) aveți, dureri abdominale sau zgomote în abdomen. Vă puteți de asemenea simți balonat senzație aveți, disconfort aveți de flatulență, greață sunteți sau vărsături. Dumneavoastră puteți de asemenea durere la anus (posterior) experimenta și u puteți ușoară diaree avea la începutul administrării administrare de Movicol. Aceste efecte secundare se îmbunătățesc de obicei dacă reduceți a lua cantitatea Movicol reduceți.

Het raportarea a efectelor secundare

Aveți probleme cu efecte secundare, contactați medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală. Acest lucru se aplică de asemenea pentru efecte secundare care nu în acest prospect sunt. Dumneavoastră puteți efecte secundare de asemenea raporta prin:

Agenția Federală pentru Medicamente și Produse de Sănătate

www.fagg.be

Departamentul Vigilență

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail: adr@fagg-afmps.be

Prin reacții adverse a raporta, ajutați ne să obținem mai multe informații despre siguranța medicamentului și eficacitatea acestuia acest medicament.

5. Cum păstrați Movicol?

A se păstra vederea și accesul copiilor departe ..

Movicol după data de expirare de ultimă data de expirare. Aceasta găsiți pe plic și cutie . Acoloeste o lună și un an . Ultimazi a lunii din lună este data de expirare.

Pentru acest medicament nu există condiții speciale de păstrare.

Dacă ați dizolvat Movicol în apă , și în u puteți să nu imediat bea, păstrați atunci acoperit și în frigider (2°C - 8°C). Aruncați orice soluție care nu în de 6 oră utilizat a fost departe.

Clătiți medicamentele nu prin chiuvetă sau toaletă și aruncați le nu în coșul de gunoi. Întrebați farmacistul dumneavoastră ce să faceți cu medicamentele pe care nu le mai folosiți . Dacă eliminațimedicamentele în mod corespunzător , vor fi eliminateîn siguranță . un corectă mod distrus și ajung ele nu în mediu ajung.

6. Conținutul al ambalajului și alte informații

Ce substanțe sunt în Movicol?

Fiecare plic de 13,8 g Movicol conține următoarele ::

13,125 g	Clorură de sodiu
0,3507 g	Bicarbonat de sodiu
0,1785 g	Clorură de potasiu
0,0466 g	Movicol

conține de asemenea de asemenea lime- și aromă de lămâie și acesulfam de potasiu ca îndulcitor. Lămâie- și aromă de lime conține următoarele ingrediente ingrediente: , maltodextrină, maltodextrină, ulei de lime, ulei de lămâie, citral, acid citric și apă.

Odată ce soluția este pregătită cu 125 ml de apă, fiecare plic oferă echivalentul a: Sodiu

Sodiu	65 milimolFlitru
Clorură	53 milimolFlitru
Potasiu	5,4 milimolFlitru
Bicarbonat	17 milimolFlitru

Cum arată Movicol și în ce conține un ambalaj?

Movicol este disponibil în plicuri dreptunghiulare și plicuri tubulare. Movicol este un praf alb.

Movicol este disponibil în cutii de 2, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 60 sau 100 plicuri. Nu toate menționate plicuri și mărimi de ambalaj sunt pe piață comercializate ..

al autorizației pentru punerea pe piață comercializare aduce:

Norgine NV, Philipssite 5 bus 1, 3001 Heverlee

Producător:

Laboratoires Macors, Rue des Caillottes, ZI La Plaine des Isles, 89000 Auxerre, Franța

Sau

Sophartex, 21 Rue du Pressoir, 28500 Vernouillet, Franța

Sau

Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederland Sau

Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, Höganäs, 263 35, Suedia

Sau

Delpharm Orleans, 5 avenue de Concyr, ORLEANS CEDEX 2, 45071, Franța

Acest medicament este înregistrat în statele membre ale Europene Economice Spațiu sub denumirea următoare nume:

Belgia	MOVICOL
Germania	Macrogol Norgine Aromă de lămâie și lime Pulbere pentru Producerea unei soluții pentru administrare orală
Finlanda	MOVICOL
Irlanda	MOVICOL
Italia	MOVICOL 13,8 g pulbere pentru soluție orală
Austria	MOVICOL-Pulbere
Portugalia	MOVICOL
Spania	MOVICOL
Suedia	MOVICOL

Numărul de autorizație pentru introducerea pe piață : BE180196Mod de eliberare

: Eliberare liberăacest prospect

este pentru ultima dată aprobat ultimă dată aprobat în 03/2025.