

Prospecto: información para el usuario

Nasonex 50 microgramos/pulverización, spray nasal, suspensión Mfuroato de mometasona

Lea detenidamente todo el prospecto antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted. Guarde este prospecto. Puede que necesite leerlo de nuevo.

- ¿Tiene alguna pregunta? Entonces, póngase en contacto con
- ¿Tiene alguna pregunta? Entonces póngase en contacto con médico o farmacéutico. No dé este medicamento a otras personas, ya que es solo para usted.
- No dé este medicamento a otras personas, ya que solo se le ha recetado a usted. El ser perjudicial para otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted.
¿Experimenta alguno de los efectos secundarios mencionados en la sección 4? ¿O experimenta un efecto secundario que no
- aparece en este prospecto? Entonces, póngase en contacto con en este prospecto dice? Póngase en contacto con médico o farmacéutico. Contenido de este prospecto

¿Qué es Nasonex y para qué se utiliza este medicamento?

1. ¿Qué es Nasonex y para qué se utiliza este medicamento?
2. ¿Cuándo no debe usar este medicamento o debe tener especial cuidado?
3. ¿Cómo usar este medicamento?
4. Posibles efectos secundarios
5. ¿Cómo almacenar este medicamento?
6. Contenido del envase y demás información

1. ¿Qué es Nasonex y para qué se utiliza este medicamento?

¿Qué es Nasonex?

El spray nasal Nasonex contiene furoato de mometasona, un medicamento que pertenece a un grupo de medicamentos llamados corticosteroides. Cuando se pulveriza furoato de mometasona en la nariz, puede reducir la inflamación (hinchazón e irritación de la nariz), los estornudos y el picor, y proporcionar alivio en caso de nariz congestionada o que gotea.

¿Para qué se utiliza Nasonex?

Rinitis alérgica estacional y no estacional

Nasonex se utiliza en adultos y niños de 3 años y mayores para los síntomas de rinitis alérgica estacional (también conocida como fiebre del heno) y rinitis no estacional tratar.

La fiebre del heno, que ocurre en ciertas épocas del año, es una reacción alérgica causada por la inhalación de polen (polen) provenientes de árboles, pastos, malezas y también hongos y esporas de hongos. La rinitis no estacional ocurre durante todo el año y los síntomas pueden ser causados por una sensibilidad a diversas sustancias, como ácaros del polvo, pelo de animales (o caspa), plumas y ciertos nutrientes. Nasonex reduce la hinchazón y la irritación en la nariz y alivia así los estornudos, la picazón y la nariz tapada o que gotea causados por la fiebre del heno o la rinitis no estacional.

Pólipos nasales

Nasonex se utiliza en adultos de 18 años y mayores para el tratamiento de pólipos nasales.

Los pólipos nasales son pequeños crecimientos que se desarrollan en la mucosa nasal y generalmente ocurren en ambas cavidades nasales. Nasonex reduce la inflamación de su nariz, reduciendo así el tamaño de los pólipos disminuyen gradualmente. Esto puede la sensación de congestión en su nariz, que puede afectar su respiración, ser aliviada.

2. ¿Cuándo no debe usar este medicamento o debe tener especial cuidado?

¿Cuándo no debe usar este medicamento?

- Es alérgico a alguno de los componentes de este medicamento. Estos componentes se pueden encontrar en la sección 6.
- Tiene una infección no tratada en su nariz. El uso de Nasonex durante una infección no tratada en su nariz, como el herpes, puede empeorar la infección. Debe esperar hasta que la infección esté curada antes de comenzar a usar el spray nasal.
- Recientemente se ha sometido a una operación de nariz o ha tenido una lesión en su nariz. Debe esperar hasta que las lesiones se hayan curado antes de comenzar a usar el aerosol nasal a usar.

¿Cuándo debe tener especial cuidado con este medicamento?

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento

- si tiene o ha tenido tuberculosis (TB)
- si tiene otro tipo de infección
- si está tomando otros corticosteroides, ya sea por vía oral o en forma de inyecciones
- si tiene fibrosis quística.

Durante el uso de Nasonex, informe a su médico: si

- su sistema inmunológico no funciona bien (lo que le dificulta combatir una infección) y entra en contacto con alguien que tenga sarampión o varicela. Debe cada vez que tenga evitar el contacto con personas que tienen estas infecciones.
- si tiene una infección en la nariz o garganta
- si usa este medicamento durante varios meses o más
- si tiene irritación persistente en la nariz o garganta.

Cuando se utilizan aerosoles nasales que contienen corticosteroides en dosis altas durante períodos prolongados, pueden ocurrir efectos secundarios debido a que el medicamento es absorbido en el cuerpo.

Si sus ojos pican o se irritan, su médico puede recomendarle usar otros tratamientos además de Nasonex.

Póngase en contacto con su médico si experimenta visión borrosa u otros trastornos visuales.

Niños

Con el uso prolongado de altas dosis puede un aerosol nasal a base de corticosteroides causar ciertos efectos secundarios como el retraso del crecimiento en los niños.

Se recomienda controlar regularmente la estatura de los niños que reciben un tratamiento a largo plazo con un spray nasal a base de corticosteroides y notificar a su médico si se observan cambios en el crecimiento.

¿Está usando otros medicamentos?

¿Está usando otros medicamentos además de Nasonex, lo ha hecho recientemente o existe la posibilidad de que use otros medicamentos en el futuro cercano? Informe a su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a los medicamentos que no requieren receta de farmacéutico. Esto también se aplica a los medicamentos para los que no necesita receta.

está usando otros corticosteroides para la alergia, ya sea por vía oral o en forma de inyecciones, su médico puede inyecciones, puede a usar Nasonex. A veces puede ocurrir que los pacientes, una vez que han dejado de usar corticosteroides orales para la alergia, o corticosteroides inyectados, experimentar de efectos secundarios como dolor articular o dolor muscular, debilidad y depresión (tristeza severa). Puede desarrollar también otras alergias, como ojos llorosos y con picazón o manchas de piel roja y con picazón. Si experimenta alguno de estos efectos secundarios, contacte a su médico.

Algunos medicamentos pueden aumentar los efectos de Nasonex y puede ser que su médico quiera controlarlo cuidadosamente si está usando estos medicamentos (incluyendo algunos medicamentos para el VIH: ritonavir, cobicistat).

Embarazo y lactancia

No hay o hay muy pocos datos disponibles sobre el uso de Nasonex en mujeres embarazadas. No se sabe si el furoato de mometasona pasa a la leche materna.

¿Está embarazada, cree que está embarazada o está, quiere quedar embarazada o está amamantando? Entonces consulte con su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No hay datos disponibles sobre el efecto de Nasonex en la capacidad de conducir o usar máquinas.

El spray nasal Nasonex contiene cloruro de benzalconio

El cloruro de benzalconio puede causar irritación o hinchazón en la nariz, especialmente con el uso prolongado.

3. ¿Cómo usar este medicamento?

Use este medicamento siempre exactamente como su médico le ha indicado. ¿Tiene dudas sobre el uso correcto? Consulte entonces con su médico o farmacéutico. No use una dosis más alta ni pulverice más frecuentemente o por más tiempo que su médico le ha dicho.

Tratamiento de la fiebre del heno y la rinitis

Uso en adultos y niños mayores de 12 años

La dosis recomendada es dos pulverizaciones en cada fosa nasal una vez al día.

Una vez que sus síntomas estén controlados, su médico puede recomendarle reducir la dosis.

Si no comienza a sentirse mejor, debe ponerse en contacto con su médico; él/ella puede eventualmente recomendarle aumentar la dosis; la dosis máxima diaria es cuatro pulverizaciones en cada fosa nasal una vez al día.

Uso en niños de 3 a 11 años

La dosis recomendada es una pulverización en cada fosa nasal una vez al día.

En algunos pacientes, los síntomas comienzan a disminuir dentro de las 12 horas después de la primera dosis de Nasonex; sin embargo, a veces puede tardar hasta dos días para que el tratamiento tenga pleno efecto. Por lo tanto, debe seguir usando el aerosol nasal regularmente para lograr el efecto completo del tratamiento.

Si usted o su hijo sufren mucho de fiebre del heno, su médico puede recomendarle que use Nasonex unos días antes del comienzo de la temporada de polen, ya que esto ayudará a prevenir los síntomas de la fiebre del heno.

Pólipos nasales

Uso en adultos de 18 años y mayores

La dosis inicial recomendada es de dos pulverizaciones en cada fosa nasal una vez al día.

- Si los síntomas no están suficientemente controlados después de 5 a 6 semanas, su médico puede aumentar su dosis a dos pulverizaciones en cada fosa nasal dos veces al día. Una vez que los síntomas estén controlados, su médico puede recomendarle reducir la dosis. su médico le recomendará reducir la dosis.
- después de 5 a 6 semanas no se observa mejoría de los síntomas con una administración dos veces al día, póngase en contacto con su médico. Prepare

su aerosol nasal para su uso Su aerosol nasal Nasonex tiene una tapa protectora que protege y mantiene limpia la boquilla. Recuerde

Su aerosol nasal Nasonex tiene una tapa protectora que protege el cabezal del pulverizador y lo mantiene limpio. Recuerde este que quitar antes de usar el spray y volver a colocarlo después de usarlo.

Cuando use el spray por primera vez, debe 'activar' el frasco presionando 10 veces el bombeo que presionar hasta que se produzca una fina niebla:

1. Agite el frasco suavemente.
2. Coloque el dedo índice y el dedo medio a ambos lados del cabezal del spray y su pulgar en la parte inferior del frasco. No perfore el mecanismo del spray.

3. Apunte el cabezal del spray lejos de usted y luego presione 10 veces con sus dedos en el bombeo hasta que se produzca una fina niebla.

Si no ha usado el spray nasal durante 14 días o más, debe reactivar el frasco presionando 2 veces el bombeo hasta que se produzca una fina niebla. funcionamiento estableciendo al presionar 2 veces la bomba hasta que se produzca una fina niebla.

Cómo usar su aerosol nasal?

1. Agite suavemente el frasco y retire la tapa (Figura 1).
2. Suénese suavemente su nariz.
3. Cierre una fosa nasal con y coloque el aplicador en la otra fosa nasal como se muestra (Figura 2). Inclíne ligeramente la cabeza hacia adelante, manteniendo el frasco en posición vertical.
4. Comience a inhalar lenta y suavemente por la nariz y mientras inhala, rocíe una fina niebla en su nariz presionando UNA VEZ el aplicador con los dedos.
5. Exhale por la boca. Repita el paso 4 para rociar una segunda dosis en la misma fosa nasal, si es necesario.
6. Retire el aplicador de esta fosa nasal y exhale por la boca.
7. Repita los pasos 3 al 6 para la otra fosa nasal (Figura 3).

Seco después de usar el spray nasal, limpie cuidadosamente la boquilla con un pañuelo limpio o un pañuelo de papel y vuelva a colocar la tapa.

Su limpieza del spray nasal

- Es importante que limpie el spray nasal regularmente porque de lo contrario posiblemente no funcione correctamente. funciona.
- Retire la tapa y desmonte cuidadosamente la boquilla.
- Lave la boquilla y la tapa en agua tibia y luego enjuáguelas bajo agua corriente corriente.
- Si el mecanismo de pulverización se obstruye, no intente liberarlo con un alfiler u otro objeto afilado, ya que esto dañará el mecanismo de pulverización, lo que podría resultar en una dosis incorrecta de su medicamento.
- Deje secar la tapa y la boquilla en un lugar cálido.
- Vuelva a colocar la boquilla en el frasco y coloque la tapa de nuevo.
- El spray debe ser reactivado con 2 pulverizaciones cuando se usa por primera vez después de la limpieza.

¿Ha usado demasiado de este medicamento?

Póngase en contacto con su médico si accidentalmente ha usado más de lo que le fue prescrito.

Si usa esteroides por un período prolongado o en grandes cantidades, en casos raros puede afectar algunas de sus hormonas. En niños puede afectar el crecimiento y desarrollo. afectar el crecimiento y desarrollo.

¿Ha olvidado usar este medicamento usar ?

Si olvidó usar su aerosol nasal en el momento adecuado, úselo tan pronto como lo recuerde y luego continúe como antes. No tome una dosis doble piensa y luego continúa como antes. No tomes una dosis doble compensar una dosis olvidada. recuperar una dosis olvidada.

deja de usar este medicamento En algunos pacientes, los síntomas deberían disminuir dentro de las 12 horas

En algunos pacientes, los síntomas deberían disminuir dentro de 12 horas de la primera dosis la primera dosis muy importante que muy importante que usted aerosol nasal se use regularmente. No detenga spray nasal regularmente. Detener tratamiento, incluso si se siente mejor, a menos que su médico lo aconseje. ¿Tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento? Entonces, póngase en contacto con

¿Tiene alguna otra pregunta sobre el uso de este medicamento? Entonces póngase en contacto con médico o artes de farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios

Como cualquier medicamento puede también este medicamento tener efectos secundarios, aunque no todos los padecen. afectar.

Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad aguda (reacciones alérgicas) después del uso de este producto. Estas reacciones pueden ser graves. Deje de usar Nasonex y busque ayuda médica de inmediato si experimenta los siguientes síntomas:

- hinchazón de la cara, lengua o garganta
- dificultades para tragar
- erupción cutánea con picazón intensa (urticaria)
- sibilancias o problemas para respirar.

Cuando se utilizan aerosoles nasales que contienen corticosteroides en dosis altas durante períodos prolongados, pueden efectos secundarios se previenen porque el medicamento se absorbe en el cuerpo.

Otros efectos secundarios

La mayoría de las personas no experimentan problemas después de usar el aerosol nasal. Sin embargo, algunas personas después del uso de Nasonex u otro aerosol nasal a base de corticosteroides pueden notar que tienen molestias como:

Efectos secundarios comunes (ocurren en menos de 1 de cada 10 usuarios):

- dolor de cabeza
- estornudos
- hemorragias nasales (ocurrieron muy frecuentemente [en más de 1 de cada 10 usuarios] en personas con pólipos nasales que recibieron dos pulverizaciones de Nasonex en cada fosa nasal dos veces al día)
- dolor de nariz o garganta
- úlceras en la nariz
- infección de las vías respiratorias

No conocido (la frecuencia no puede determinarse con los datos disponibles):

- aumento de la presión intraocular (glaucoma) y/o cataratas (opacidad del cristalino), que causan alteraciones en la visión causar

- daño al tabique nasal, que separa las fosas nasales
- cambios en el gusto y el olfato
- sibilancias o problemas para respirar
- visión borrosa

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta efectos secundarios, póngase en contacto con su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a posibles efectos secundarios que no se mencionan en este prospecto. También puede informar de los efectos secundarios directamente a través de el Centro de Efectos Secundarios de los Países Bajos Lareb, sitio web: www.lareb.nl. Al informar de los efectos secundarios puede ayudarnos a obtener más información sobre la seguridad de este medicamento. 5. ¿Cómo debe almacenar este medicamento? Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Conservar por debajo de 25 °C. No congelar.

- No use este medicamento
- después de la fecha de caducidad. Esta fecha es
- No use este medicamento más después de la fecha de caducidad. Esta es te encontrar en el frasco y el empaque después de EXP. Allí se indica un mes y un año. El último día de ese mes es la fecha de caducidad.
- Use el frasco dentro de 2 meses después de la primera apertura. Abra un frasco a la vez.

No tire medicamentos por el fregadero o el inodoro y no los deseche en la basura. Pregunte a su farmacéutico qué hacer con los medicamentos que ya no usa. Serán destruidos de manera responsable y no llegarán al medio ambiente.

6. Contenido del envase y otra información

¿Qué sustancias contiene este medicamento?

- La sustancia activa en este medicamento es furoato de mometasona. Cada spray contiene 50 microgramos de furoato de mometasona, como monohidrato.
- Las otras sustancias en este medicamento son celulosa dispersable, glicerol, citrato de sodio, monohidrato de ácido cítrico, polisorbato 80, cloruro de benzalconio, agua purificada.
- Este medicamento contiene 0,02 mg de cloruro de benzalconio por pulverización.

¿Cómo se ve Nasonex y cuánto hay en un paquete?

Nasonex es una suspensión en spray nasal.

Cada frasco contiene 60 o 140 pulverizaciones.

Los frascos con 60 pulverizaciones se suministran en envases con 1 frasco.

Los frascos con 140 pulverizaciones se suministran en envases de 1, 2 o 3 frascos.

No todos los tamaños de envase mencionados se comercializan en el mercado .

Titular de la autorización de comercialización N.V. Organon Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Países Bajos

Tel.: 00800 66550123

Correo electrónico:

Tel.: 00800 66550123

Correo electrónico: dpoc.benelux@organon.com

Fabricante

Organon Heist bv

Industriepark 30

2220 Heist-op-den-Berg

Bélgica

Inscrito en el registro bajo:

Nasonex 50 microgramos/pulverización, spray nasal, suspensión - RVG 21613

Este medicamento está registrado en los estados miembros del EEE bajo los siguientes nombres:

- Bélgica, Dinamarca, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Croacia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Eslovenia, Reino Unido, Suecia: Nasonex
- Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Chequia: NASONEX
- Austria: Nasonex aquosum – Nasenspray
- Letonia: Nasonex 50 mikrogrami/deva deguna aerosols, suspensija
- Portugal: Nasomet
- España: NASONEX 50 microgramos suspensión para pulverización nasal

Este prospecto fue aprobado por última vez en noviembre 2022.

Más información sobre este medicamento está disponible en el sitio web del CBG:

www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.