

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Nasonex 50 mikrogrammi/pihustus, ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat

Lugege kogu pakendi infoleht hoolikalt läbi enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest see sisaldab olulist teavet teie jaoks.

- Hoidke see infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.
- Kas teil on veel küsimusi? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.
- Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla kahjulik teistele, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.
- Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või tekib teil kõrvaltoime, mis ei ole selles infolehes loetletud? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Selle infolehe sisu

1. Mis on Nasonex ja milleks seda ravimit kasutatakse?
2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?
3. Kuidas seda ravimit kasutada?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu informatsioon

1. Mis on Nasonex ja milleks seda ravimit kasutatakse?

Mis on Nasonex?

Nasonex ninasprei sisaldab mometasoonfuroaati, mis on ravim, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kortikosteroidideks. Kui mometasoonfuroaat pihustatakse ninna, võib see vähendada põletikku (nina turset ja ärritust), aevastamist ja sügelust ning leevendada ummistunud või voolavat nina.

Milleks kasutatakse Nasonexi?

Heinapalavik ja mittehooajaline riniit

Nasonexi kasutatakse täiskasvanutel ja lastel alates 3. eluaastast et leevendada heinapalaviku (tuntud ka kui hooajaline allergiline riniit) ja mittehooajalise riniidi sümptomeid ravida.

Heinapalavik, mis esineb teatud aastaegadel, on allergiline reaktsioon, mis on põhjustatud õietolmu sissehingamisest, mis pärineb puudelt, rohttaimedelt, umbrohtudelt ja ka seentest ja seenesporidest. Mittehooajaline riniit esineb kogu aasta vältel ja sümptomeid võivad põhjustada tundlikkus erinevate ainete suhtes, nagu tolmuosakesed, loomakarvad (või kõõm), sulged ja teatud toitained. Nasonex vähendab turset ja ärritust ninas, leevendades seeläbi aevastamist, sügelust ja kinnist või tilkuvat nina, mida põhjustab heinapalavik või mittehooajaline riniit.

Ninapolüübid

Nasonexi kasutatakse täiskasvanutel alates 18. eluaastast ninapolüüpide raviks. ninapolüübid.

ninaõõnes. Nasonex vähendab põletikku teie ninas, vähendades seeläbi nende suurust polüüpide järk-järguline vähenemine. Selle tulemusena võib ummistustunne teie ninas, mis võib teie hingamist mõjutada, leeveneda.

2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?

Millal ei tohi te seda ravimit kasutada?

- Te olete allergiline mõne selle ravimi koostisosa suhtes. Neid aineid leiate jaotisest 6.
- Teil on ravimata infektsioon teie ninas. Nasonexi kasutamine ravimata infektsiooni korral teie ninas, nagu herpes, võib infektsiooni halvendada. Te peate ootama, kuni infektsioon on paranenud, enne kui hakkate ninaspreid kasutama. kasutada.
- Olete hiljuti läbinud ninaoperatsiooni või saanud vigastuse teie nina. Te peate ootama kuni kahjustused on paranenud, enne kui hakkate ninaspreid kasutama kasutama. kasutama.

Võtke ühendust oma arsti või apteekriga enne selle ravimi kasutamist kui teil on tuberkuloos (tbc) või olete seda kunagi põdenud

- kui teil on mõni muu infektsioon
- kui te võtate teisi kortikosteroide, kas suu kaudu või süstide vormis
- kui te võtate teisi kortikosteroide, kas suu kaudu või süstide vormis
- teil on tsüstiline fibroos. Nasonexi kasutamise ajal rääkige sellest

Nasonex'i kasutamise ajal teavitage sellest arstile: kui

- teie immuunsüsteem ei tööta korralikult (mis raskendab teil infektsioonide vastu võitlemist) ja te puutute kokku kellegagi, kes on leetrite või tuulerõugetega haige. Te peate igakes põevad leetrid või tuulerõugeid on. Te peate iga vältige kontakti inimestega, kellel on need infektsioonid.
- kui teil on infektsioon ninas või kurgus
- kui te kasutate seda ravimit mitu kuud või kauem
- kui teil on püsiv nina või kurgu ärritus.

Kui kortikosteroide sisaldavaid ninaspreid kasutatakse suurtes annustes pikema aja jooksul, võivad kõrvaltoimed tekkida, kuna ravim imendub kehasse.

Kui teie silmad sügelevad või muutuvad ärritatuks, võib arst soovitada kasutada muid ravimeetodeid lisaks Nasonexile.

Võtke ühendust oma arstiga, kui teil esineb ähmane nägemine või muud nägemishäired.

Lapsed

Pikaajaline suurte annuste kasutamine võib kortikosteroididel põhineva ninasprei põhjustada teatud kõrvaltoimeid, nagu laste kasvupeetus.

Soovitatakse lastele, kes saavad pikaajalist ravi kortikosteroididel põhineva ninaspreiga, regulaarselt kontrollida pikkust ja teavitada nende arsti, kui kasvus on muutusi. Kas te kasutate veel teisi ravimeid?

Kas te kasutate lisaks Nasonexile veel teisi ravimeid, olete seda hiljuti teinud või on

võimalik, et te hakkate lähitulevikus teisi ravimeid kasutama? Rääkige sellest võimalus, et hakkate lähitulevikus kasutama teisi ravimeid? Rääkige sellest siis arstile või apteekrile. See kehtib ka ravimite kohta, mille jaoks te ei vaja retsepti. apteekrilt. See kehtib ka ravimite kohta, mille jaoks retsepti pole vaja.

te kasutate teisi kortikosteroide allergia vastu, kas suukaudselt või süstide vormis, võibteie arst soovitada nende kasutamise lõpetamist, kui te hakkate Nasonexi kasutama. Mõnikord võib juhtuda, et patsiendid, kui nad lõpetavad suukaudsete ravimite kasutamise, võivad kogeda mõningaid sümptomeid. ettevaatlik suukaudsete kasutamisel või süstitud kortikosteroidid, tekivad kõrvaltoimed nagu liigese- või lihaskasvalu, nõrkus ja depressioon (raske masendus). Teil võib võimalik, et tekivad ka muud allergiad, nagu sügelevad, vesised silmad või punased ja sügelevad nahalaigud. Kui teil tekib mõni neist kõrvaltoimetest, võtke ühendust oma arstiga. Mõned ravimid võivad Nasonexi toimet suurendada ja

Mõned ravimid võivad Nasonexi toimeid suurendada ja seda olla, et teie arst soovib teid hoolikalt jälgida, kui te neid ravimeid kasutate (sealhulgas mõned ravimid HIV jaoks: ritonaviir, kobitsistaat). Rasedus ja imetamine

Peaaegu puuduvad või puuduvad andmed Nasonexi kasutamise kohta rasedatel naistel. Ei ole teada, kas mometasoonfuroaat eritub rinnapiima. Kas olete rase, arvate, et olete rase

Kas olete rase, arvate, et olete rase tee olete, soovite rasestuda või toidate last rinnaga? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga enne selle ravimi kasutamist.

Autojuhtimine ja masinate kasutamine

Puuduvad andmed Nasonexi mõju kohta autojuhtimisele või võimele kasutada masinaid.

Nasonexi ninasprei sisaldab bensalkooniumkloriidi

Bensalkooniumkloriid võib põhjustada ärritust või turset ninas, eriti pikaajalisel kasutamisel.

3. Kuidas seda ravimit kasutada?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu teie arst on teile öelnud. Kui kahtlete õiges kasutamises? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga. Ärge kasutage suuremat annust ega pihustage sagedamini või pikema aja jooksul kui teie arst on teile öelnud.

Heinapalaviku ja mittehooajalise riniidi

Kasutamine täiskasvanutel ja lastel alates 12. eluaastast

Soovitav annus on kaks pihustust igasse ninasõõrmesse üks kord päevas.

Kui teie sümptomid on kontrolli all, võib arst soovitada annust vähendada.

Kui te ei tunne end siiski paremini, peate võtma ühendust oma arstiga; ta võib teile soovitada annust suurendada; maksimaalne ööpäevane annus on neli pihustust igasse ninasõõrmesse üks kord päevas.

Kasutamine lastel vanuses 3 kuni 11 aastat

Soovitav annus on üks pihustus igasse ninasõõrmesse üks kord päevas.

Mõnel patsiendil hakkavad sümptomid vähenema 12 tunni jooksul pärast esimest Nasonexi annust; kuid mõnikord võib ravi täieliku toime saavutamiseks kuluda kuni kaks päeva. Seetõttu peate teie ninasprei regulaarselt kasutada, et saavutada ravi täielik mõju.

Kui teil või teie lapsel on tugevad heinapalaviku sümptomid, võib arst soovitada Nasonexi kasutamist mõni päev enne õietolmuhoodaja algust, kuna see aitab heinapalaviku sümptomeid ennetada.

Ninapolüübid

Kasutamine täiskasvanutel alates 18. eluaastast

Soovitav algannus on kaks pihustust igasse ninasõõrmesse üks kord päevas.

- Kui sümptomid ei ole 5 kuni 6 nädala pärast piisavalt kontrolli all, võib arst teie annust suurendada kahe pihustuseni igasse ninasõõrmesse kaks korda päevas. Kui sümptomid on kontrolli all, võib arst soovitada annust vähendada.
- Kui 5 kuni 6 nädala pärast ei ole sümptomite paranemist täheldatud kahekordse päevase manustamisega, võtke ühendust oma arstiga. kaks korda päevas manustamine, võtke ühendust oma arstiga.

ninasprei ettevalmistamine kasutamiseks Teie Nasonexi ninaspreil on kaitsekork, mis kaitseb pihustusotsikut ja hoiab selle puhtana. Pidage meeles

Teie Nasonexi ninaspreil on kaitsekork, mis kaitseb pihustuspead ja hoiab selle puhtana. Pidage meeles seda eemaldada enne pihusti kasutamist ja pärast kasutamist tagasi panna.

Kui kasutate pihustit esimest korda, peate pudelit 'käivitama', vajutades 10 korda pumbale vajutada kuni tekib peen udu:

1. Raputage pudelit ettevaatlikult.
2. Asetage nimetissõrm ja keskmine sõrm pihusti mõlemale küljele ja oma põial pudeli alla. Ärge puurige pihustusmehhanismi läbi. pudelit. Ärge puurige pihustusmehhanismi läbi.
3. Suunake pihusti ots teist eemale ja vajutage seejärel 10 korda oma sõrmedega pumbale, kuni tekib peen udu. peen udu.

Kui te ei ole ninaspreid 14 päeva või kauem kasutanud, peate pudeli uuesti käivitama, vajutades 2 korda pumbale, kuni tekib peen udu.

Kuidas kasutada oma ninasprei?

1. Raputage pudelit ettevaatlikult ja eemaldage kaitsekork (Joonis 1).
2. Nuusake ettevaatlikult oma nina.
3. Sulgege üks ninasõõre kinni ja asetage pihustiotsik teise ninasõõrmesse nagu näidatud (Joonis 2). Kallutage pea kergelt ettepoole, hoides pudelit püsti.

4. Alustage aeglaselt ja õrnalt sisse hingamist läbi nina ja samal ajal, kui hingate sisse, pihustage peen udu oma ninna, vajutades KORRA sõrmedega pumbale.
5. Hingake välja suu kaudu. Korrake sammu 4 et pihustada teine annus samasse ninasõõrmesse, kui see on asjakohane.
6. Eemaldage pihustiotsik sellest ninasõõrmest ja hingake välja suu kaudu.
7. Korrake samme 3 kuni 6 teise ninasõõrme jaoks (Joonis 3).

Kuiv pärast ninasprei kasutamist pihustusotsikut ettevaatlikult puhta taskurätiku või paberi salvrätikuga ja asetage kork tagasi.

Teie ninasprei puhastamine

- On oluline, et puhastaksite ninaspreid regulaarselt, sest muidu võib see enam mitte korralikult töötada.
- Eemaldage kork ja võtke pihustusotsik ettevaatlikult lahti.
- Peske pihustusotsik ja kork sooja veega ning loputage need siis jooksva vee all puhtaks.
- Kui pihustusmehhanism ummistub, ärge proovige seda vabastada nõela või muu terava esemega, sest see kahjustab pihustusmehhanismi, mille tulemusena saate vale annuse oma ravimist.
- Laske korgil ja pihustusotsikul kuivada soojas kohas.
- Asetage pihustusotsik uuesti pudelile ja asetage kork tagasi.
- Pihustit tuleb uuesti kasutusele võtta 2 pihustusega, kui seda esimest korda pärast puhastamist kasutatakse.

Kas olete liiga palju seda ravimit kasutanud?

Võtke ühendust oma arstiga, kui olete kogemata kasutanud rohkem kui teile ette kirjutatud.

Kui kasutate steroide pikaajaliselt või suurtes kogustes, võib see harvadel juhtudel mõjutada mõningaid teie hormoone. Lastel võib see mõjutada kasvu ja arengut. mõjutada.

Kas unustasite seda ravimit kasutada? kasutada?

Kui olete unustanud oma ninaspreid õigel ajal kasutada, kasutage seda niipea, kui sellele mõtlete ja jätkake siis nagu varem. Ärge võtke kahekordset annust et unustatud annust tasa teha.

Kui lõpetate selle ravimi kasutamise

Mõnel patsiendil peaksid sümptomid vähenema 12 tunni jooksul pärast esimest annust Nasonex; kuid mõnikord võib ravi täieliku mõju saavutamiseks kuluda kuni kaks päeva. On väga oluline, et te oma ninaspreid regulaarselt kasutaksite. Ärge lõpetage oma ravi, isegi kui tunnete end paremini, välja arvatud juhul, kui arst on seda soovitanud.

Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteeker.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu iga ravim, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi mitte kõigil ei pruugi neid esineda.

Võivad esineda ägedad ülitundlikkusreaktsioonid (allergilised reaktsioonid) pärast selle toote kasutamist. Need reaktsioonid võivad olla tõsised. Lõpetage Nasonexi kasutamine ja otsige kohe meditsiinilist abi kui teil tekivad järgmised sümptomid:

- tursunud nägu, keel või kurk
- neelamisraskused
- nahalööve tugeva sügelusega (nõgestõbi)
- vilistav hingamine või hingamisraskused.

Kui ninaspreisid, mis sisaldavad kortikosteroide, kasutatakse suurtes annustes pikema aja jooksul, võivad kõrvaltoimed ennetatakse, kuna aine imendub kehas.

Muud kõrvaltoimed

Enamik inimesi ei koge probleeme pärast ninasprei kasutamist. Siiski võivad mõned inimesed pärast Nasonexi või mõne muu kortikosteroididel põhineva ninasprei kasutamist märgata, et neil on probleeme järgneva:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1-l 10-st kasutajast):

- peavalu
- aevastamine
- ninaverejooksud (esinevad väga sageli [rohkem kui 1-l 10-st kasutajast] inimestel, kellel on ninapolüübid, kes said kaks korda päevas kaks pihustust Nasonexi igasse ninasõõrmesse)
- valulik nina või kurk
- haavandid ninas
- hingamisteede infektsioon

Pole teada (sagedus ei saa olemasolevate andmete põhjal kindlaks määrata):

- suurenenud silmasisene rõhk (glaukoom) ja/või katarakt (hallkae), mis põhjustavad nägemishäireid põhjustama
- kahjustus nina vaheseinale, mis eraldab ninasõõrmeid
- maitse ja lõhna muutused
- vilistav hingamine või hingamisraskused
- hägune nägemine

Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti või apteekriga. See kehtib ka võimalike kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole mainitud. Kõrvaltoimetest saate ka otse teatada Hollandi kõrvaltoimetekeskus Lareb, veebisait: www.lareb.nl. Kõrvaltoimetest teatades saate aidata meil saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas seda ravimit säilitada?

- Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- Hoida temperatuuril alla 25 °C. Mitte hoida sügavkülmas.
- Ärge kasutage seda ravimit enam pärast kõlblikkusaja lõppu. See on te leida pudelil ja pakendil pärast EXP. Seal on kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on aegumiskuupäev.
- Kasutage pudelit 2 kuu jooksul pärast esimest avamist. Avage korraga ainult üks pudel.

Ärge visake ravimeid kraanikaussi või WC-sse ega prügikasti. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Need hävitatakse vastutustundlikult ja ei satu keskkonda. 6. Pakendi sisu ja muu

teave Millised ained on selles ravimis?

Selle ravimi toimeaine on mometasoonfuroaat. Iga pihustus sisaldab 50 mikrogrammi

- mometasoonfuroaati, monohüdraadina. Muud ained selles ravimis on dispergeeruv tselluloos, glütserool, naatriumtsitraat, monohüdraat.
- Selle ravimi teised ained on dispergeeruv tselluloos, glütserool, naatriumtsitraat, sidrunhappe monohüdraat, polüsorbaat 80, bensalkooniumkloriid, puhastatud vesi.
- See ravim sisaldab 0,02 mg bensalkooniumkloriidi pihustuse kohta.

Kuidas Nasonex välja näeb ja kui palju on pakendis?

Nasonex on ninasprei suspensioon.

Iga pudel sisaldab 60 või 140 pihustust.

60 pihustusega pudelid tarnitakse pakendites, mis sisaldavad 1 pudelit.

140 pihustusega pudelid tarnitakse pakendites, mis sisaldavad 1, 2 või 3 pudelit.

Mitte kõiki nimetatud pakendisuurusi ei turustata. turule viidud.

Müügiloa hoidja turule viimiseks

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Holland

Tel.: 00800 66550123

E-post: dpoc.benelux@organon.com

Tootja

Organon Heist bv

Industriepark 30

2220 Heist-op-den-Berg

Belgia

Registrisse kantud:

Nasonex 50 mikrogrammi/pihustus, ninasprei, suspensioon - RVG 21613

See ravim on registreeritud EEA liikmesriikides järgmiste nimede all:

- Belgia, Taani, Saksamaa, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Island, Itaalia, Horvaatia, Leedu, Luksemburg, Malta, Madalmaad, Norra, Poola, Sloveenia, Ühendkuningriik, Rootsi: Nasonex Bulgaaria, Rumeenia, Slovakkia, Tšehhi: NASONEX
- Austria: Nasonex aquosum – Nasenspray
- Läti: Nasonex 50 mikrogrammi/annus ninasprei, suspensioon
- Portugal: Nasomet
- Hispaania: NASONEX 50 mikrogrammi suspensioon ninasprei jaoks
- See pakendi infoleht on viimati heaks kiidetud

novembris 2022. 2022.

Lisateavet selle ravimi kohta leiate CBG veebisaidilt:
www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.

Transtoyou