

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle

Nasonex 50 mikrogrammaa/suihkaus, nenäsumute, suspensio Mometasonifuroaatti

Lue huolellisesti koko pakkausseloste ennen kuin käytät tätä lääkettä, sillä se sisältää tärkeitä tietoja sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.
- Onko sinulla kysyttävää? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.
- Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle. Se voi olla haitallista muille, vaikka heillä olisi samat oireet kuin sinulla.
- Saatko jonkin haittavaikutuksen, joka on mainittu kohdassa 4? Tai saatko haittavaikutuksen, joka ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Tämän pakkausselosteen sisältö

1. Mikä Nasonex on ja mihin sitä käytetään?
2. Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää tai milloin sitä on käytettävä erityisen varovaisesti?
3. Kuinka käytät tätä lääkettä?
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Kuinka säilytät tätä lääkettä?
6. Pakkauksen sisältö ja muut tiedot

1. Mitä Nasonex on ja mihin sitä käytetään?

Mitä Nasonex on?

Nasonex-nenäsumute sisältää mometasonifuroaattia, joka on lääkeaine, joka kuuluu lääkeryhmään nimeltä kortikosteroidit. Kun mometasonifuroaattia suihkutetaan nenään, se voi vähentää tulehdusta (nenän turvotusta ja ärsytystä), aivastelua ja kutinaa sekä lievittää tukkoisen tai vuotavaa nenää.

Mihin Nasonexia käytetään?

Heinänuha ja ei-kausiluonteinen nuha

Nasonexia käytetään aikuisilla ja 3-vuotiailla ja sitä vanhemmilla lapsilla lievittämään oireet heinänuha (tunnetaan myös kausiluonteisena allergisena nuhana) ja ei-kausiluonteinen nuha hoitaa.

Heinänuha, joka esiintyy tiettyinä aikoina vuodesta, on allerginen reaktio, joka aiheutuu hengittämällä siitepölyä, joka on peräisin puista, heinistä, rikkaruohoista ja myös homeista ja homeitiöistä. Ei-kausiluonteinen nuha esiintyy ympäri vuoden ja oireet voivat johtua herkkyydestä erilaisille aineille, kuten talopölypunkille, eläinten karvoille (tai hilseelle), höyhenille ja tietyille ravintoaineille. Nasonex vähentää turvotusta ja ärsytystä nenässä, mikä lievittää aivastelua, kutinaa ja tukkoista tai vuotavaa nenää heinänuhan tai ei-kausiluonteisen nuhan aiheuttamana.

Nenän polyyppit

Nasonexia käytetään aikuisilla, jotka ovat 18-vuotiaita vanhempia nenäpolyyppien hoitoon. nenäpolyyppit.

nenäonteloissa. Nasonex vähentää nenän tulehdusta, mikä pienentää nenän kokoa. polyypit vähitellen vähenevät. Tämä voi tukkoinen tunne nenässäsi, joka voi vaikuttaa hengitykseesi, helpottua.

2. Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää tai milloin sitä on käytettävä erityisen varovaisesti?

Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää?

- Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineosalle. Nämä aineet löytyvät kohdasta 6.
- Sinulla on hoitamaton infektio nenässäsi. Nasonexin käyttö hoitamattoman infektion aikana nenässä, kuten herpes, voi pahentaa infektiota. Sinun tulee odottaa, kunnes infektio on parantunut ennen kuin aloitat nenäsumutteen käytön. Olet äskettäin käynyt nenäleikkauksessa tai sinulla on ollut vamma nenässäsi. Odota, kunnes nenäsi on parantunut, ennen kuin käytät nenäsumutetta. käyttää.
- Tämä lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten nenäverenvuotoa tai päänsärkyä. sinun nenäsi. Sinun on odotettava kunnes vauriot ovat parantuneet ennen kuin aloitat nenäsumutteen käytön käyttämään. käyttää.

Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi ennen tämän lääkkeen käyttöä jos sinulla on tuberkuloosi (tb) tai olet joskus sairastanut sen

- jos sinulla on jokin muu infektio
- jos käytät muita kortikosteroideja, joko suun kautta tai injektioina
- jos käytät muita kortikosteroideja, joko suun kautta tai injektioina
- sinulla on kystinen fibroosi. Nasonexin käytön aikana, kerro

sinun lääkäriillesi: jos

- immuunijärjestelmäsi ei toimi kunnolla (mikä vaikeuttaa infektioiden torjumista) ja joudut kosketuksiin jonkun kanssa jolla on tuhkarokko tai vesirokkoon. Sinun on kerrottava välttää kontaktia ihmisten kanssa, joilla on nämä infektiot.
- jos sinulla on infektio nenässä tai kurkussa
- jos käytät tätä lääkettä useita kuukausia tai pidempään
- jos sinulla on jatkuvaa nenän tai kurkun ärsytystä.

Kun kortikosteroideja sisältäviä nenäsuihkeita käytetään suurina annoksina pitkään aikaan, voi esiintyä sivuvaikutuksia koska aine imeytyy kehoon.

Jos silmäsi kutisevat tai ärtyvät, lääkärisi voi suositella muiden hoitojen käyttöä Nasonexin lisäksi.

Ota yhteyttä lääkäriisi jos sinulla on näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Lapset

Pitkäaikaisessa suurten annosten käytössä voi kortikosteroideihin perustuva nenäsuihke aiheuttaa tiettyjä sivuvaikutuksia, kuten kasvun hidastumista lapsilla.

On suositeltavaa, että lasten pituus, jotka saavat pitkäaikaishoitoa kortikosteroideihin perustuvalla nenäsuihkeella, tarkistetaan säännöllisesti ja heidän lääkäriilleen ilmoitetaan, jos kasvussa havaitaan muutoksia.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Käytätkö Nasonexin lisäksi muita lääkkeitä, oletko tehnyt niin äskettäin tai onko mahdollista, että aiot käyttää muita lääkkeitä lähitulevaisuudessa? Kerro siitä lääkärillesi tai apteekkarillesi. Tämä koskee myös lääkkeitä, joihin et tarvitse reseptiä.

Jos käytät muita kortikosteroideja allergiaan, jokosuun kautta tai injektioina, injektiot, voi käytön. Joskus voi käydä niin, että potilaat, kun he ovat lopettaneet suun kautta otettavien lääkkeiden käytön tai injektioituja kortikosteroideja, voi esiintyä haittavaikutuksia kuten nivel- tai lihaskipua, heikkoutta ja masennusta (vakavaa alakuloisuutta). Saatat myös kehittää muita allergioita, kuten kutiavat, vetiset silmät tai punaisia ja kutiavia ihoalueita. Jos saat jonkin näistä haittavaikutuksista, ota yhteyttä lääkäriisi. Jotkut lääkkeet voivat lisätä Nasonexin vaikutuksia ja

lääkärisi saattaa haluta seurata sinua tarkasti, jos käytät näitä lääkkeitä (mukaan lukien jotkut hiv-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti). Raskaus ja imetys lääkkeet varten Ei tiedetä, erittykö mometasonifuroaatti äidinmaitoon.

Oletko raskaana, luuletko olevasi raskaana

Nasonexin käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole juuri lainkaan tai ei lainkaan tietoja saatavilla. Ei tiedetä, erittykö mometasonifuroaatti äidinmaitoon.

Oletko raskaana, luuletko olevasi raskaana tee oletko raskaana, aiotteko tulla raskaaksi tai imetättekö? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei ole tietoa Nasonexin vaikutuksesta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Nasonex-nenäsumute sisältää bentsalkoniumkloridia

Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa nenän ärsytystä tai turvotusta, erityisesti pitkäaikaisessa käytössä.

3. Miten käytät tätä lääkettä?

Käytä tätä lääkettä aina täsmälleen kuten lääkärisi on sinulle kertonut. Epäiletkö oikeaa käyttöä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin. Älä käytä suurempaa annosta äläkä suihkuta useammin tai pidempään kuin sinun lääkäri on kertonut sinulle.

Heinänuhan ja ei-kausiluonteisen nuha

Käyttö aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille

Suosittelun annos on kaksi suihketta kumpaankin sieraimeseen kerran päivässä.

Kun sinun oireesi ovat hallinnassa, lääkäri voi suositella annoksen pienentämistä.

Jos et kuitenkaan ala tuntea oloasi paremmaksi, ota yhteyttä lääkäriisi; hän voi ehkä suositella annoksen suurentamista; enimmäispäiväannos on neljä suihketta kumpaankin sieraimeseen kerran päivässä.

Käyttö 3–11-vuotiaille lapsille

Suositteltu annos on yksi suihke kumpaankin sieraimen kerran päivässä.

Joillakin potilailla oireet alkavat vähettä 12 tunnin kuluessa ensimmäisestä Nasonex-annoksesta; kuitenkin voi joskus kestää jopa kaksi päivää ennen kuin hoito vaikuttaa täysin. Siksi sinun tulee sinun nenäsuihketta säännöllisesti saadaksesi hoidon täyden vaikutuksen.

Jos sinä tai lapsesi kärsitte paljon heinänuhasta, lääkärisi voi suositella Nasonexin käyttöä muutamia päiviä ennen siitepölykauden alkua, koska tämä auttaa ehkäisemään heinänuhan oireita.

Nenän polyypit

Käyttö aikuisille 18-vuotiaille ja vanhemmille

Suositteltu aloitusannos on kaksi suihketta kumpaankin sieraimen kerran päivässä.

- Jos oireet eivät ole riittävästi hallinnassa 5-6 viikon jälkeen, lääkärisi voi lisätä annostasi kahteen suihkeeseen kumpaankin sieraimen kahdesti päivässä. Kun oireet ovat hallinnassa, lääkärisi voi suositella annoksen pienentämistä. lääkärisi voi suositella annoksen pienentämistä.
- 5-6 viikon jälkeen ei havaita oireiden paranemista kahdesti päivässä annostuksella, ota yhteyttä lääkäriisi. Valmistele nenäsuihkeesi käyttöä varten

Nasonex-nenäsuihkeessasi on suojakorkki, joka suojaa ja pitää suihkepään puhtaana. Muista nenäsumutteen valmistaminen käyttöä varten

Nasonex-nenäsumutteessasi on suojakorkki, joka suojaa suihkupäätä ja pitää sen puhtaana. Muista tämä poistaa ennen suihkeen käyttöä ja asettaa se takaisin käytön jälkeen.

Kun käytät suihketta ensimmäistä kertaa, sinun on 'käynnistettävä' pullo painamalla 10 kertaa pumppua painaa kunnes hieno sumu muodostuu:

1. Ravista pulloa varovasti.
2. Aseta etusormi ja keskisormi suihkupään molemmille puolille ja peukalosi pullon alaosaan. Älä puhkaise suihkumekanismia. Suuntaa suihkupää poispäin itsestäsi ja paina sitten 10 kertaa
3. sormillasi pumppua, kunnes hieno sumu muodostuu. sormet pumpun päällä, kunnes et ole käyttänyt nenäsuihketta 14 päivään tai pidempään, sinun on käynnistettävä pullo uudelleen

painamalla pumppua 2 kertaa, kunnes hieno sumu muodostuu. Kuinka käytät toiminta asettamalla painamalla pumppua 2 kertaa, kunnes muodostuu hieno sumu.

Kuinka käyttää sinun nenäsumute?

1. Ravista pulloa varovasti ja poista suojakorkki (Kuva 1).
2. Niistä varovasti sinun nenäsi.
3. Sulje yksi sierain kiinni ja aseta suutin toiseen sieraimen kuvan mukaisesti (Kuva 2). Kallista päätä hieman eteenpäin, pitäen pullo pystyasennossa.

4. Aloita hitaasti ja kevyesti hengittämään nenän kautta ja samalla kun hengität sisään, suihkuta hieno sumu nenääsi painamalla KERRAN pumpusta.
5. Hengitä ulos suun kautta. Toista vaihe 4 suihkuttaaksesi toisen annoksen samaan sieraimeseen, jos tarpeen.
6. Poista suutin tästä sieraimeseen ja hengitä ulos suun kautta.
7. Toista vaiheet 3–6 toiselle sieraimelle (Kuva 3).

Kuivaa nenäsuihkeen käytön jälkeen suihkupää varovasti puhtaalla nenäliinalla tai paperisella liinalla ja aseta suojakorkki takaisin. Nenäsuihkeesi

puhdistaminen On tärkeää, että puhdistat nenäsuihkeen säännöllisesti, koska se

- On tärkeää, että puhdistat nenäsumutteen säännöllisesti, koska se toisin Poista suojakorkki ja irrota suihkupää varovasti. toimii.
- Poista sulkutiiviste ja irrota suihkupää varovasti.
- Pese suutin ja sulkekorkki lämpimässä vedessä ja huuhtelee ne sitten juoksevan veden alla suihkumekanismi tukkeutuu, älä yritä avata sitä neulalla tai muulla terävällä esineellä, koska tämä vahingoittaa suihkumekanismia,.
- Anna suojakorkin ja suihkupään kuivua lämpimässä paikassa. Aseta suihkupää takaisin pulloon ja aseta suojakorkki takaisin. neulaa tai muuta terävää esinettä, koska se vahingoittaa suihkutuskonetta, minkä vuoksi saatat saada väärän annoksen lääkettäsi.
- Anna sulkijan ja suihkupään kuivua lämpimässä paikassa.
- Aseta suutin takaisin pulloon ja laita korkki takaisin paikoilleen.
- Suihke on otettava uudelleen käyttöön kahdella suihkauksella, kun sitä käytetään ensimmäistä kertaa jälkeen puhdistuksen jälkeen.

Oletko liian paljon käyttänyt tätä lääkettä?

Ota yhteyttä lääkäriisi jos olet vahingossa käyttänyt enemmän kuin sinulle on määrätty.

Jos käytät steroideja pitkään tai suurina määrinä, se voi harvinaisissa tapauksissa vaikuttaa joihinkin hormoneihisi. Lapsilla se voi vaikuttaa kasvuun ja kehitykseen. Oletko unohtanut käyttää tätä lääkettä

liian käyttää? käyttää?

Jos unohdat käyttää nenäsumutettasi oikeaan aikaan, käytä sitä heti kun muistat ja jatka sitten kuten aiemmin. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen annoksen. unohtuneen annoksen ottaminen.

lopetat tämän lääkkeen käytön Joillakin potilailla oireiden pitäisi vähentyä 12 tunnin kuluessa ensimmäisestä annoksesta Nasonex; kuitenkin joskus voi kestää kaksi päivää ennen kuin hoito vaikuttaa täysin. On erittäin tärkeää, että käytät nenäsumutettasi säännöllisesti. Älä lopeta hoitoasi, vaikka tuntisitkin paremmalta, ellei lääkärisi toisin neuvo. Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai hoitoon, vaikka tuntisitkin olosi paremmin, ellei lääkärisi toisin neuvo.

Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota sitten yhteyttä sinä lääketieteen tohtori apteekki.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet voi myös tämä lääke aiheuttaa haittavaikutuksia, vaikka kaikille niitä ei tulekaan. kohdata.

Akutteja yliherkkyysoireita (allergisia reaktioita) voi esiintyä käytön jälkeen tämän tuotteen. Nämä reaktiot voivat olla vakavia. Lopeta Nasonexin käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon jos saat seuraavia oireita:

- turvonnut kasvot, kieli tai nielu
- nielemisvaikeudet
- ihottuma, johon liittyy voimakasta kutinaa (nokkosihottuma)
- hengityksen vinkuminen tai hengitysvaikeudet.

Kun nenäsuihkeita, jotka sisältävät kortikosteroideja, käytetään suurina annoksina pitkien aikojen kuluessa haittavaikutuksia estetään, koska aine imeytyy elimistöön.

Muut haittavaikutukset

Useimmat ihmiset eivät koe ongelmia nenäsumutteen käytön jälkeen. Kuitenkin jotkut ihmiset Nasonexin tai muun kortikosteroideihin perustuvan nenäsumutteen käytön jälkeen voivat huomata, että heillä on ongelmia: onko:

päänsärky

- aivastelu
- aivastaa
- kivulias nenä tai kurkku haavaumat nenässä
- hengitystieinfektio
- Tuntematon (yleisyyttä)
- hengitystieinfektio

saatavilla olevien tietojen perusteella voida määrittää): kohonnut silmänpaine (glaukooma) ja/tai kaihi (harmaakaihi), jotka aiheuttavat näköhäiriöitä

- kohonnut silmänpaine (glaukooma) ja/tai kaihi (harmaakaihi), jotka aiheuttavat näköhäiriöitä aiheuttaa
- vahinkoa nenän väliseinälle, joka erottaa sieraimet
- muutoksia maussa ja hajussa
- hengityksen vinkuminen tai hengitysvaikeudet
- näön hämärtyminen

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos koet haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan Hollannin Lääkehaittavaikutuskeskus Larebille, verkkosivusto: www.lareb.nl. Ilmoittamalla haittavaikutuksista autat meitä saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta. 5. Miten säilytät tätä lääkettä? Pidä lasten ulottumattomissa ja näkyvistä.

Säilytä alle 25 °C:ssa. Älä säilytä pakastimessa.

- Älä käytä tätä lääkettä
- Säilytä alle 25 °C. Ei saa säilyttää pakastimessa.
- viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Se on lisää parasta ennen -päivämäärän jälkeen. Se on te vinden op het pullossa ja pakkauksessa EXP:n jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Tämän kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivä.
- Käytä pullo 2 kuukauden kuluessa ensimmäisestä avaamisesta. Avaa yksi pullo kerrallaan.

Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai WC:hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekkariltasi mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Ne hävitetään sitten vastuullisesti eikä niitä päädy ympäristöön.

6. Pakkauksen sisältö ja muut tiedot

Mitkä aineet ovat tässä valmisteessa?

- Tämän valmisteen vaikuttava aine on mometasonifuroaatti. Jokainen suihke sisältää 50 mikrogrammaa mometasonifuroaattia, monohydraattina. monohydraatti.
- sitruunahappomonohydraatti, polysorbaatti 80, bentsalkoniumkloridi, puhdistettu vesi. sitruunahappomonohydraatti, polysorbaatti 80, bentsalkoniumkloridi, puhdistettu vesi.
- Tämä lääke sisältää 0,02 mg bentsalkoniumkloridia per suihkaus.

Miltä Nasonex näyttää ja kuinka paljon sitä on pakkauksessa?

Nasonex on nenäsumute suspensio.

Jokainen pullo sisältää 60 tai 140 suihkausta.

60 suihkauksen pullot toimitetaan pakkauksissa, joissa on 1 pullo.

140 suihkauksen pullot toimitetaan pakkauksissa, joissa on 1, 2 tai 3 pulloa.

Kaikkia mainittuja pakkaukokoja ei ole kaupallisesti saatavilla.

Myyntiluvan haltija kaupallisesti saatavilla

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Alankomaat

Puh.: 00800 66550123

Sähköposti: dpoc.benelux@organon.com

Valmistaja

Organon Heist bv

Industriepark 30

2220 Heist-op-den-Berg

Belgia

Rekisteröity seuraavasti:

Nasonex 50 mikrogrammaa/suihkaus, nenäsumute, suspensio - RVG 21613

Tämä lääke on rekisteröity EEA:n jäsenvaltioissa seuraavilla nimillä:

- Belgia, Tanska, Saksa, Viro, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Irlanti, Islanti, Italia, Kroatia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Norja, Puola, Slovenia, Yhdistynyt Kuningaskunta, Ruotsi: Nasonex
- Bulgaria, Romania, Slovakia, Tšekki: NASONEX
- Itävalta: Nasonex aquosum – Nasenspray
- Latvia: Nasonex 50 mikrogrammaa/annos nenäsumute, suspensio
- Portugali: Nasomet
- Espanja: NASONEX 50 microgramos suspensión para pulverización nasal

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty marraskuussa 2022.

Lisätietoja tästä lääkkeestä on saatavilla CBG:n verkkosivustolla:
www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.