

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Nasonex 50 mikrogramų/purškukas, nosies purškalas, suspensija Mometazono furoatas

Perskaitykite visą šį pakuotės lapelį prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama svarbi informacija jums.

- Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.
- Turite klausimų? Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.
- Neduokite šio vaisto kitiems, nes jis skirtas tik jums. Tai gali būti kenksminga kitiems, net jei jie turi tokius pačius simptomus kaip jūs.
- Ar pasireiškė šalutinis poveikis, nurodytas 4 skyriuje? Arba pasireiškė šalutinis poveikis, kuris nėra šiame pakuotės lapelyje? Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

Šio pakuotės lapelio turinys

1. Kas yra Nasonex ir kam jis vartojamas?
2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba kada reikia būti ypač atsargiems?
3. Kaip vartoti šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Nasonex ir kam šis vaistas vartojamas?

Kas yra Nasonex?

Nasonex nosies purškalas turi mometazono furoato, vaisto, priklausančio vaistų grupei, vadinamai kortikosteroidais. Kai mometazono furoatas purškiamas į nosį, gali tai sumažinti uždegimą (nosies patinimą ir dirginimą), čiaudulį ir niežulį bei palengvinti užsikimšusią ar bėgančią nosį.

Kam vartojamas Nasonex?

Šienligė ir nesezoninis rinitas

Nasonex vartojamas suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų amžiaus simptomams šienligės (dar vadinamos sezoniniu alerginiu rinitu) ir nesezoninio rinito gydyti.

Šienligė, kuri pasireiškia tam tikrais metų laikais, yra alerginė reakcija, kurią sukelia žiedadulkių įkvėpimas, kilusių iš medžių, žolių, piktžolių ir taip pat grybelių ir grybelių sporų. Nesezoninis rinitas pasireiškia visus metus, o simptomus gali sukelti jautrumas įvairioms medžiagoms, tokioms kaip namų dulkių erkutės, gyvūnų plaukai (arba pleiskanos), plunksnos ir tam tikros maistinės medžiagos. Nasonex mažina patinimą ir nosies dirginimą, taip palengvindamas čiaudulį, niežulį ir užsikimšusią ar bėgančią nosį, sukeltą šienligės ar nesezoninio rinito.

Nosies polipai

Nasonex vartojamas suaugusiems nuo 18 metų ir vyresniems nosies polipų gydymui.

Nosies polipai yra maži išaugos, kurios vystosi ant nosies gleivinės ir paprastai pasireiškia abiejose nosies ertmėse. Nasonex mažina uždegimą jūsų nosyje, taip sumažindamas jų dydį. polipų

palaiptams mažėja. Dėl to gali užsikimšimo jausmas jūsų nosyje, kuris gali paveikti jūsų kvėpavimą, būti palengvintas.

2. Kada negalite vartoti šio vaisto arba turite būti ypač atsargūs?

Kada negalite vartoti šio vaisto?

- Esate alergiškas bet kuriai šio vaisto sudedamajai daliai. Šias medžiagas galite rasti 6 skyriuje.
- Turite negydytą infekciją savo nosyje. Nasonex vartojimas negydytos infekcijos metu savo nosyje, pavyzdžiui, herpes, gali infekciją pabloginti. Turite palaukti, kol infekcija išgydoma, prieš pradėdami naudoti nosies purškalą pradėti naudoti.
- Neseniai jums buvo atlikta nosies operacija arba patyrėte sužalojimą jūsų nosį. Turite palaukti kol pažeidimai užgis, prieš pradėdami naudoti nosies purškalą naudoti. naudoti.

Pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku prieš vartodami šį vaistą jei sergate tuberkulioze (TB) arba kada nors sirgote

- jei turite kitokio tipo infekciją
- jei vartojate kitus kortikosteroidus, tiek per burną, tiek injekcijų forma
- jei vartojate kitus kortikosteroidus, tiek per burną, tiek injekcijų forma
- sergate cistine fibroze. Vartodami Nasonex, pasakykite

Vartojant Nasonex, pasakykite tai gydytojui: jei

- jūsų imuninė sistema neveikia tinkamai (dėl to jums sunku kovoti su infekcija) ir jūs susiduriate su asmeniu kuris serga tymais arba vėjaraupiaisserga. Turite kiekvieną turėti. Jūs turite kiekvieną vengti kontakto su žmonėmis, kurie turi šias infekcijas.
- jei turite nosies ar gerklės infekciją
- jei šį vaistą vartojate kelis mėnesius ar ilgiau
- jei turite nuolatinį nosies ar gerklės dirginimą.

Kai nosies purškalai, kuriuose yra kortikosteroidų, naudojami didelėmis dozėmis ilgą laiką, gali pasireikšti šalutinis poveikis, nes vaistas absorbuojamas į kūną.

Jei jūsų akys niežti ar yra sudirgusios, gydytojas gali rekomenduoti naudoti kitus gydymo būdus kartu su Nasonex.

Kreipkitės į savo gydytoją, jei turite neryškų matymą ar kitus regėjimo sutrikimus.

Vaikai

Ilgalaikis didelių dozių kortikosteroidų pagrindu pagamintas nosies purškalas nosies purškalas, pagamintas iš tam tikrų kortikosteroidų sukelti tam tikrą šalutinį poveikį, pavyzdžiui, vaikų augimo sulėtėjimą.

Rekomenduojama šviesavidutinis vaikų, kurie ilgalaikis gydymas su Rekomenduojama reguliariai tikrinti vaikų, kurie ilgą laiką gydomi kortikosteroidų pagrindu pagamintu nosies purškalu, kūno ilgį ir informuoti jų gydytoją, jei pastebimi augimo pokyčiai. Rekomenduojama reguliariai tikrinti vaikų, kurie ilgą laiką gydomi kortikosteroidų pagrindu pagamintu nosies purškalu, kūno ilgį ir informuoti jų gydytoją, jei pastebimi augimo pokyčiai.

Ar vartojate kitus vaistus?

Ar vartojate kitus vaistus be Nasonex, ar neseniai vartojote, ar planuojate vartoti kitus vaistus artimiausiu metu? Pasakykite tai galimybė, kad artimiausiu metu pradėsite vartoti kitus vaistus? Pasakykite tai tada gydytojui ar vaistininkui. Tai taip pat taikoma vaistams, kuriems nereikia recepto. Tai taip pat taikoma vaistams, kuriems nereikia recepto.

Jei vartojate kitus kortikosteroidus nuo alergijos, ar per burną, ar injekcijų forma, injekcijos, gali gydytojas gali rekomenduoti nustoti juos vartoti, kai tik pradėsite vartoti Nasonex. Kartais gali atsitikti taip, kad pacientai, kai tik nustoja vartoti geriamuosius kortikosteroidus, gali patirti tam tikrus simptomus. arba suleistų kortikosteroidų, gali pasireikšti šalutinis poveikis, pvz., sąnarių ar raumenų skausmas, silpnumas ir depresija (sunkus liūdesys). Jums gali taip pat išsivystyti kitos alergijos, tokios kaip niežtinčios, ašarojančios akys ar raudonos ir niežtinčios odos dėmės. Jei pasireiškia kuris nors iš šių šalutinių poveikių, kreipkitės į savo gydytoją.

Kai kurie vaistai gali sustiprinti Nasonex poveikį ir gali būti, kad jūsų gydytojas norės atidžiai jus stebėti, jei vartojate šiuos vaistus (įskaitant kai kuriuos vaistus nuo ŽIV: ritonaviras, kobicistatas).

Nėštumas ir žindymas

Praktiškai nėra arba nėra duomenų apie Nasonex vartojimą nėščioms moterims. Nežinoma, ar mometazono furoatas patenka į motinos pieną.

Ar esate nėščia, ar manote, kad esate nėščia? yra, norite pastoti ar maitinate krūtimi? Tada kreipkitės susisiekti su savo gydytoją arba vaistininką prieš vartodami šį vaistą.

Vairavimo gebėjimai ir mašinų naudojimas

Nėra duomenų apie Nasonex poveikį vairavimo gebėjimams ar gebėjimui naudoti mašinas.

Nasonex nosies purškalas turi benzalkonio chlorido

Benzalkonio chloridas gali sukelti nosies dirginimą ar patinimą, ypač ilgai vartojant.

3. Kaip vartoti šį vaistą?

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip jūsų gydytojas jums nurodė. Jei abejojate dėl tinkamo vartojimo, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Nevartokite didesnės dozės ir nepurškite dažniau ar ilgiau nei jūsų gydytojas jums pasakė.

Šienligės ir nesezoninio rinitas

Naudojimas suaugusiems ir vaikams vyresniems nei 12 metų

Rekomenduojama dozė yra du purškimai į kiekvieną šnervę kartą per dieną.

Kai tik jūsų simptomai yra kontroliuojami, gydytojas gali patarti sumažinti dozę.

Jei nesijaučiate geriau, turėtumėte susisiekti su savo gydytoju; jis/ji gali jums galbūt patarti padidinti dozę; maksimali paros dozė yra keturi purškimai į kiekvieną šnervę kartą per dieną.

Naudojimas vaikams nuo 3 iki 11 metų

Rekomenduojama dozė yra vienas purškimas į kiekvieną šnervę kartą per dieną.

Kai kuriems pacientams simptomai pradeda mažėti per 12 valandų po pirmosios Nasonex dozės; tačiau kartais gali prireikti iki dviejų dienų, kol gydymas visiškai veiks. Todėl turite jūsų nosies purškalą reguliariai naudoti, kad būtų pasiektas visas gydymo poveikis.

Jei jūs ar jūsų vaikas labai kenčia nuo šienligės, jūsų gydytojas gali rekomenduoti pradėti vartoti Nasonex kelias dienas prieš prasidedant žiedadulkių sezonui, nes tai padės išvengti šienligės simptomų.

Nosies polipai

Naudojimas suaugusiems nuo 18 metų ir vyresniems

Rekomenduojama pradinė dozė yra du purškimai į kiekvieną šnervę vieną kartą per dieną.

- Jei simptomai po 5–6 savaitių nėra pakankamai kontroliuojami, jūsų gydytojas gali padidinti dozę iki dviejų purškimų į kiekvieną šnervę du kartus per dieną. Kai simptomai bus kontroliuojami, gali jūsų gydytojas rekomenduoti sumažinti dozę. Gydytojas gali rekomenduoti sumažinti dozę.
- po 5–6 savaitių nepastebima simptomų pagerėjimo vartojant du kartus per dieną, susisiekite su savo gydytoju. du kartus per dieną vartojimas, kreipkitės į savo gydytoją.

nosies purškalą paruošti naudojimui Jūsų Nasonex nosies purškimas turi dangtelį, kuris apsaugo purškimo galvutę ir palaiko ją švarią. Atminkite

Jūsų Nasonex nosies purškimas turi apsauginį dangtelį, kuris apsaugo purškimo galvutę ir palaiko ją švarią. Atminkite šį nuimti prieš naudojant purškalą ir po naudojimo vėl uždėti.

Kai pirmą kartą naudojate purškalą, turite paruošti buteliuką, 10 kartų paspausdami pompą paspausti kol susidarys smulki dulksna:

1. Švelniai pakratykite buteliuką.
2. Padėkite rodomąjį ir vidurinį pirštus abiejose purkštuko pusėse ir savo nykštį po buteliuku. Nepažurkite purškimo mechanizmo.
3. Nukreipkite purkštuką nuo savęs ir tada 10 kartų paspauskite savo pirštais pompą, kol susidarys smulki dulksna.

Jei nenaudojote nosies purškalo 14 dienų ar ilgiau, turite vėl paruošti buteliuką, 2 kartus paspausdami pompą, kol susidarys smulki dulksna. Kaip naudoti

Kaip naudoti jūsų nosies purškimas?

1. Švelniai pakratykite buteliuką ir nuimkite dangtelį (1 pav.).
2. Atsargiai išsipūskite savo nosį.
3. Uždenkite vieną šnervę ir įkiškite purkštuką į kitą šnervę, kaip parodyta (2 pav.). Šiek tiek palenkite galvą į priekį, laikydami buteliuką vertikaliai.

4. Pradėkite lėtai ir švelniai įkvėpti per nosį ir įkvėpdami, purškite smulkią rūką į nosį, vieną kartą paspausdami pompą pirštais.
5. Iškvėpkite per burną. Pakartokite 4 žingsnį norėdami antrą dozę purkšti į tą pačią šnerve, jei reikia.
6. Ištraukite purkštuką iš šnervės ir iškvėpkite per burną.
7. Pakartokite 3–6 žingsnius kitai šnervei (3 pav.).

Sausas po naudojimo nosies purškalu atsargiai nuvalykite purkštuko galvutę švaria nosinaite arba popieriniu rankšluosčiu ir uždėkite atgal dangtelį.

Jūsų nosies purškalo valymas

- Svarbu reguliariai valyti nosies purškala, nes kitaip jis gali nebeveikti tinkamai .
- Nuimkite dangtelį ir atsargiai nuimkite purkštuko galvutę.
- Nuplaukite purkštuko galvutę ir dangtelį šiltu vandeniu ir tada praskalaukite po tekančiu vandeniu nuo.
- Jei purškimo mechanizmas užsikemša, nbandykite jo atlaisvinti adata ar kitu aštriu daiktu, nes tai gali sugadinti purškimo mechanizmą, dėl ko galite gauti neteisingą vaisto dozę.
- Leiskite dangteliui ir purkštuko galvutei išdžiūti šiltoje vietoje.
- Uždėkite purkštuko galvutę atgal ant buteliuko ir uždėkite dangtelį.
- Purškalas turi būti vėl paruoštas naudoti su 2 purškimais, kai jis pirmą kartą po valymo naudojamas.

Ar jūs per daug šio vaisto vartojote?

Susisieki su savo gydytoju, jei netyčia daugiau panaudojote nei jums buvo paskirta.

Jei steroidus vartojate ilgą laiką arba dideliais kiekiais, tai retais atvejais gali paveikti kai kuriuos jūsų hormonus. Vaikams gali paveikti augimą ir vystymąsi. paveikti.

Ar pamiršote šį vaistą vartoti? naudoti?

Jei pamiršote panaudoti savo nosies purškala tinkamu metu, naudokite jį, kai tik prisiminsite, ir tęskite kaip anksčiau. Nevartokite dvigubos dozės norėdami kompensuoti praleistą dozę.

Jei nustojate vartoti šį vaistą

Kai kuriems pacientams simptomai turėtų sumažėti per 12 valandų po pirmosios dozės Nasonex; tačiau kartais gali prireikti iki dviejų dienų, kol gydymas visiškai pasireikš. Labai svarbu, kad reguliariai naudotumėte savo nosies purškala. Nenutraukite gydymo, net jei jaučiatės geriau, nebent jūsų gydytojas patartų kitaip. Ar turite kitų klausimų apie šio vaisto vartojimą? Susisieki su geriau jaučiatės, nebent gydytojas patartų kitaip.

gydytoju arba savo gydytoju ar vaistininkas.

4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir kiekvienas vaistas gali šis vaistas taip pat turėti šalutinį poveikį, nors ne kiekvienas jį patiria. susidurti.

Gali pasireikšti ūminės padidėjusio jautrumo reakcijos (alerginės reakcijos) po šio produkto vartojimo. Šios reakcijos gali būti sunkios. Nutraukite Nasonex vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją jei jums pasireiškia šie simptomai:

- patinęs veidas, liežuvis ar gerklė
- rijimo problemos
- odos bėrimas su stipriu niežuliu (dilgėlinė)
- švokštimas kvėpavimas ar kvėpavimo problemos.

Kai nosies purškalai, kuriuose yra kortikosteroidų, vartojami didelėmis dozėmis ilgesniais laikotarpiais, gali šalutinis poveikis išvengiamas, nes priemonė absorbuojama organizme.

Kiti šalutiniai poveikiai

Dauguma žmonių nepatiria problemų po nosies purškalo naudojimo. Vis dėlto kai kurie žmonės po Nasonex ar kito kortikosteroidų pagrindu pagaminto nosies purškalo naudojimo gali pastebėti, kad jie kenčia nuo:

Dažnai pasitaikantys šalutiniai poveikiai (pasitaiko mažiau nei 1 iš 10 vartotojų):

- galvos skausmas
- čiaudulys
- nosies kraujavimas (labai dažnai pasitaikė [daugiau nei 1 iš 10 vartotojų] žmonėms su nosies polipais, kurie du kartus per dieną gavo po dvi Nasonex dozes į kiekvieną šnervę)
- skausminga nosis ar gerklė
- opos nosyje
- kvėpavimo takų infekcija

Nežinoma (dažnis negali būti nustatytas pagal turimus duomenis):

- padidėjęs akispūdis (glaukoma) ir/arba katarakta (katarakta), kurie sukelia regėjimo sutrikimus sukelti
- žalą nosies pertvarai, kuri skiria nosies sparnus
- skonio ir kvapo pokyčiai
- švokštimas arba kvėpavimo problemos
- neryškus matymas

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taip pat taikoma galimam šalutiniam poveikiui, kuris nėra paminėtas šiame pakuotės lapelyje. Taip pat galite pranešti apie šalutinį poveikį tiesiogiai per Nyderlandų šalutinio poveikiocentrą Lareb, svetainė: www.lareb.nl. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite pranešti, galite 5. Kaip laikyti šį vaistą?

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

- Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Nelaikyti šaldiklyje.
- Nenaudokite šio vaisto
- Nenaudokite šio vaisto galiojimo pabaigos datos. Ji yra po galiojimo pabaigos datos. Ji yra te rasti ant buteliuko ir pakuotės po EXP. Ten nurodytas mėnuo ir metai. Paskutinė to mėnesio diena yra galiojimo pabaigos data.

- Naudokite buteliuką per 2 mėnesius po pirmojo atidarymo. Atidarykite po vieną buteliuką vienu metu.

Neleiskite vaistų į kriauklę ar tualetą ir nemeskite jų į šiukšliadėžę. Klauskite savo vaistininko, ką daryti su vaistais, kurių nebevartojate. Jie bus sunaikinti atsakingai ir nepateks į aplinką. 6.
Pakuotės turinys ir kita

informacija informacinis

Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra mometazono furoatas. Kiekvienas purškalas turi 50 mikrogramų

- mometazono furoato, kaip monohidratas. monohidratas.
- citrinų rūgšties monohidratas, polisorbatas 80, benzalkonio chloridas, išgrynintas vanduo.
- Šis vaistas turi 0,02 mg benzalkonio chlorido per purškimą.

Kaip atrodo Nasonex ir kiek jo yra pakuotėje?

Nasonex yra nosies purškalas suspensija.

Kiekvienas buteliukas turi 60 arba 140 purškimų.

Buteliukai su 60 purškimų tiekiami pakuotėse su 1 buteliuku.

Buteliukai su 140 purškimų tiekiami pakuotėse po 1, 2 arba 3 buteliukus.

Ne visos nurodytos pakuotės dydžiai yra prekyboje .

Leidimo turėtojas dėl į prekybą išleidimo

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Nyderlandai

Tel.: 00800 66550123

El. paštas: dpoc.benelux@organon.com

Gamintojas

Organon Heist bv

Industriepark 30

2220 Heist-op-den-Berg

Belgija

Registruota registre:

Nasonex 50 mikrogramų/purškukas, nosies purškalas, suspensija - RVG 21613

Šis vaistas yra registruotas EEE valstybėse narėse šiais pavadinimais:

- Belgija, Danija, Vokietija, Estija, Suomija, Prancūzija, Graikija, Vengrija, Airija, Islandija, Italija, Kroatija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Slovėnija, Jungtinė Karalystė, Švedija: Nasonex
- Bulgarija, Rumunija, Slovakija, Čekija: NASONEX
- Austrija: Nasonex aquosum – Nasenspray
- Latvija: Nasonex 50 mikrogrami/deva deguna aerosols, suspensija

- Portugalija: Nasomet
- Ispanija: NASONEX 50 microgramos suspensión para pulverización nasal

Ši pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas lapkričio 2022 m.

Daugiau informacijos apie šį vaistą galima rasti CBG svetainėje:
www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.

Transtoyou