

Ulotka: informacje dla użytkownika

Nasonex 50 mikrogramów/rozpylenie, aerozol do nosa, zawiesina Mfuroinian mometazonu

Przeczytaj dokładnie całą ulotkę przed użyciem tego leku, ponieważ zawiera ważne informacje dla Ciebie.

- Zachowaj tę ulotkę. Może być potrzebna później.
- Masz pytania? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą.
- Nie przekazuj tego leku innym, ponieważ jest przepisany wyłącznie dla Ciebie. Może być szkodliwy dla innych, nawet jeśli mają takie same objawy jak Ty.
- Czy wystąpił u Ciebie któryś z działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4? A może wystąpiło działanie niepożądane, które nie jest wymienione w tej ulotce? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą.

Zawartość tej ulotki

1. Co to jest Nasonex i w jakim celu stosuje się ten lek?
2. Kiedy nie wolno stosować tego leku lub należy zachować szczególną ostrożność?
3. Jak stosować ten lek?
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać ten lek?
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Nasonex i w jakim celu się go stosuje?

Co to jest Nasonex?

Nasonex spray do nosa zawiera mometazon furoinian, lek należący do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Kiedy mometazon furoinian jest rozpylany do nosa, może to zmniejszać stan zapalny (obrzęk i podrażnienie nosa), kichanie i swędzenie oraz przynosić ulgę przy zatkanym lub ciekącym nosie.

W jakim celu stosuje się Nasonex?

Katar sienny i nie-sezonowy nieżyt nosa

Nasonex stosuje się u dorosłych i dzieci w wieku 3 lat i starszych w celu złagodzenia objawów kataru siennego (zwanego również sezonowym alergicznym nieżytem nosa) i nie-sezonowego nieżytu nosa leczyć.

Katar sienny, który występuje w określonych porach roku, jest reakcją alergiczną wywołaną wdychaniem pyłków pochodzących z drzew, traw, chwastów i również grzybów i zarodników pleśni. Niesezonowy nieżyt nosa występuje przez cały rok, a objawy mogą być spowodowane wrażliwością na różne substancje, takie jak roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt (lub łupież), pióra i niektóre składniki odżywcze. Nasonex zmniejsza obrzęk i podrażnienie w nosie oraz łagodzi w ten sposób kichanie, swędzenie i zatkały lub ciekący nos spowodowany katarem siennym lub niesezonowym nieżytem nosa.

Polipy nosa

Nasonex jest stosowany u dorosłych w wieku 18 lat i starszych do leczenia polipów nosa.

Polipy nosa to małe narośla rozwijające się na błonie śluzowej nosa i zwykle występujące w obu jamach nosowych. Nasonex zmniejsza stan zapalny twojego nosa, co zmniejsza wielkość polipy stopniowo zmniejszają się. Dzięki temu może uczucie zatkania w nosie, które może wpływać na oddychanie, zostać złagodzone.

2. Kiedy nie należy stosować tego leku lub zachować szczególną ostrożność?

Kiedy nie należy stosować tego leku?

- Jesteś uczulony na którykolwiek ze składników tego leku. Składniki te można znaleźć w punkcie 6.
- Masz nieleczoną infekcję w swoim nosie. Stosowanie Nasonexu podczas nieleczonej infekcji w swoim nosie, takiej jak opryszczka, może pogorszyć infekcję. Należy poczekać, aż infekcja zostanie wyleczona, zanim zaczniesz stosować spray do nosa. zacząć używać.
- Niedawno przeszedłeś operację nosa lub doznałeś urazu twój nos. Musisz poczekać aż zmiany się zagoją, zanim zaczniesz używać sprayu do nosa używać. używać.

Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą przed użyciem tego leku jeśli masz lub kiedykolwiek miałeś gruźlicę (tbc)

- jeśli masz inny rodzaj infekcji
- jeśli przyjmujesz inne kortykosteroidy, doustnie lub w formie zastrzyków
- jeśli przyjmujesz inne kortykosteroidy, doustnie lub w formie zastrzyków
- masz mukowiscydozę. Podczas stosowania Nasonex, powiedz

swojemu lekarzowi: jeśli

- twój układ odpornościowy nie działa prawidłowo (co powoduje trudności w zwalczaniu infekcji) i masz kontakt z osobą która ma odrę lub ospę wietrzną. Musisz każdeodra lub ospa wietrzna mieć. Musisz każde unikać kontaktu z osobami, które mają te infekcje.
- jeśli masz infekcję nosa lub gardła
- jeśli stosujesz ten lek przez kilka miesięcy lub dłużej
- jeśli masz uporczywe podrażnienie nosa lub gardła.

Gdy aerozole do nosa zawierające kortykosteroidy są stosowane w wysokich dawkach przez dłuższe okresy, mogą wystąpić działania niepożądane z powodu wchłaniania leku do organizmu.

Jeśli twoje oczy swędzą lub są podrażnione, lekarz może zalecić stosowanie innych metod leczenia oprócz Nasonex.

Skontaktuj się z swoim lekarzem, jeśli masz problemy z niewyraźnym widzeniem lub inne zaburzenia wzroku.

Dzieci

Przy długotrwałym stosowaniu wysokich dawek może aerozol do nosa na bazie kortykosteroidów powodować pewne działania niepożądane, takie jak opóźnienie wzrostu u dzieci.

Zaleca się regularne kontrolowanie wzrostudzieci, które są poddawane długoterminowemu leczeniu za pomocą sprayu do nosa na bazie kortykosteroidów i informowanie lekarza, jeśli zostaną stwierdzone zmiany we wzroście. Czy używasz innych leków?

Czy używasz innych leków oprócz Nasonex, czy używałaś ich niedawno lub czy istnieje możliwość, że w najbliższej przyszłości będziesz używać innych leków? Powiedz to czy istnieje możliwość, że w najbliższej przyszłości będziesz stosować inne leki? W takim razie powiedz to lekarzowi lub farmaceucie. Dotyczy to również leków, na które nie potrzebujesz recepty. farmaceuta. Dotyczy to również leków, na które nie potrzebujesz recepty.

używasz innych kortykosteroidów na alergię, czy to doustnie, czy w formie zastrzyków, lekarz może zalecić ich odstawienie, gdy zaczniesz używać Nasonex. Może się zdarzyć, że pacjenci, gdy przestaną używać doustnych kortykosteroidów, doświadczą pewnych objawów. lub wstrzykiwanych kortykosteroidów, mogą wystąpić skutki uboczne takie jak ból stawów lub mięśni, osłabienie i depresja (poważne przygnębienie). Możesz również rozwinąć inne alergię, takie jak swędzące, łzawiące oczy lub czerwone i swędzące plamy na skórze. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych skutków ubocznych, skontaktuj się z lekarzem. Niektóre leki mogą zwiększać działanie Nasonex i

Niektóre leki mogą zwiększać działanie Nasonex i jego być konieczne, aby lekarz starannie Cię monitorował, jeśli stosujesz te leki (w tym niektóre leki na HIV: ritonawir, kobicystat). Ciąża i karmienie piersią

Praktycznie nie ma danych lub są one ograniczone dotyczące stosowania Nasonex u kobiet w ciąży.

Nie wiadomo, czy mometazon furoinian przenika do mleka matki. Czy jesteś w ciąży, myślisz, że jesteś w ciąży

Czy jesteś w ciąży, myślisz, że jesteś w ciąży karmisz piersią jesteś, chcesz zajść w ciążę lub karmisz piersią? Skontaktuj się wtedy skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą przed użyciem tego leku.

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Brak danych dotyczących wpływu Nasonex na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

Nasonex spray do nosa zawiera chlorek benzalkoniowy

Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie lub obrzęk nosa, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu.

3. Jak stosować ten lek?

Zawsze stosuj ten lek dokładnie tak, jak twój lekarz ci zalecił. Masz wątpliwości co do prawidłowego stosowania? Skontaktuj się wtedy z lekarzem lub farmaceutą. Nie stosuj wyższej dawki i nie rozpylaj częściej lub dłużej niż twój lekarz ci powiedział.

Leczenie kataru siennego i całorocznego nieżyty nosa

Stosowanie u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat

Zalecana dawka to dwa rozpylenia do każdego nozdrza raz dziennie.

Gdy twoje objawy są pod kontrolą, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki. Jeśli jednak nie poczujesz się lepiej, skontaktuj się z lekarzem; może on/ona ewentualnie zalecić zwiększenie dawki; maksymalna dawka dzienna to cztery rozpylenia do każdego nozdrza raz dziennie.

Stosowanie u dzieci od 3 do 11 lat

Zalecana dawka to jedno rozpylenie do każdego nozdrza raz dziennie.

U niektórych pacjentów objawy zaczynają ustępować w ciągu 12 godzin po pierwszej dawce Nasonex; jednak czasami może to potrwać do dwóch dni, zanim leczenie w pełni zadziała. Dlatego powinieneś swój regularnie stosować spray do nosa, aby osiągnąć pełny efekt leczenia.

Jeśli Ty lub Twoje dziecko cierpicie na silną katar sienny, lekarz może zalecić stosowanie Nasonexu kilka dni przed rozpoczęciem sezonu pylenia, ponieważ to pomoże zapobiec objawom kataru siennego.

Polipy nosa

Stosowanie u dorosłych w wieku 18 lat i starszych

Zalecana dawka początkowa to dwa rozpylenia do każdego nozdrza raz dziennie.

- Jeśli objawy nie są wystarczająco kontrolowane po 5 do 6 tygodniach, lekarz może zwiększyć dawkę do dwóch rozpylenia do każdego nozdrza dwa razy dziennie. Gdy objawy są kontrolowane, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki. Jeśli
- po 5 do 6 tygodniach nie nastąpi poprawa objawów przy podawaniu dwa razy dziennie, skontaktuj się z lekarzem. jeśli po 5 do 6 tygodniach nie zaobserwuje się poprawy objawów za pomocą przygotowanie sprayu do nosa do użycia

Twój spray do nosa Nasonex ma nasadkę ochronną, która chroni i utrzymuje czystość dyszy. Pamiętaj, aby przygotowanie sprayu do nosa do użycia
Twój spray do nosa Nasonex ma nasadkę ochronną, która chroni i utrzymuje czystość dyszy. Pamiętaj to usunąć przed użyciem sprayu i umieścić z powrotem po użyciu.

Kiedy używasz sprayu po raz pierwszy, musisz 'uruchomić' butelkę, naciskając 10 razy na pompkę naciskając aż do wytworzenia się delikatnej mgiełki:

1. Delikatnie wstrząśnij butelką.
2. Umieść palec wskazujący i środkowy po obu stronach głowicy rozpylającej i swój kciuk na dole butelki. Nie przekłuwaj mechanizmu sprayu.
3. Skieruj głowicę rozpylającą od siebie i naciśnij 10 razy swoimi palcami na pompkę, aż do wytworzenia się delikatnej mgiełki.

Jeśli nie używałeś sprayu do nosa przez 14 dni lub dłużej, musisz ponownie uruchomić butelkę, naciskając 2 razy na pompkę, aż do wytworzenia się delikatnej mgiełki. Jak używać

Jak używać twój spray do nosa?

1. Delikatnie wstrząśnij butelką i zdejmij nasadkę (Rysunek 1).
2. Delikatnie wydmuchaj swoje nos.
3. Zamknij jedno nozdrze i wprowadź końcówkę rozpylacza do drugiego nozdrza, jak pokazano (Rysunek 2). Pochyl lekko głowę do przodu, trzymając butelkę pionowo.
4. Zaczynaj powoli i delikatnie wdychać przez nos, a podczas wdechu rozpyl delikatną mgiełkę do nosa, naciskając JEDEN RAZ palcami na pompkę.
5. Wydechaj przez usta. Powtórz krok 4 aby rozpylić drugą dawkę do tego samego nozdrza, jeśli to konieczne.
6. Wyjmij końcówkę rozpylacza z tego nozdrza i wydechaj przez usta.
7. Powtórz kroki od 3 do 6 dla drugiego nozdrza (Rysunek 3).

Suchy po użyciu sprayu do nosa delikatnie wytrzyj dyszę czystą chusteczką lub papierowym ręcznikiem i załóż z powrotem nasadkę.

Twoja czyszczenie sprayu do nosa

- Ważne jest, aby regularnie czyścić spray do nosa, ponieważ w przeciwnym razie może nie działać poprawnie. działa.
- Usuń nasadkę i delikatnie zdejmij dyszę.
- Umyj dyszę i nasadkę w ciepłej wodzie, a następnie spłucz je pod bieżącą wodą i.
- Jeśli mechanizm sprayu się zatka, nie próbuj go odblokować za pomocą szpilki lub innego ostrego przedmiotu, ponieważ może to uszkodzić mechanizm sprayu, co może spowodować podanie niewłaściwej dawki leku.
- Pozwól, aby nasadka i dysza wyschły w ciepłym miejscu.
- Załóż ponownie dyszę na butelkę i załóż z powrotem nasadkę.
- Spray należy ponownie uruchomić 2 rozpylaniami, gdy jest używany po raz pierwszy po czyszczeniu.

Czy użyłeś zbyt dużo tego środka?

Skontaktuj się z swoim lekarzem, jeśli przypadkowo użyłeś więcej niż przepisano.

Jeśli używasz sterydów przez dłuższy czas lub w dużych ilościach, może to w rzadkich przypadkach wpływać na niektóre z twoich hormonów. U dzieci może to wpływać na wzrost i rozwój. Czy zapomniałeś użyć tego środka

Czy zapomniałeś zażyć ten lek odpowiednim czasie? użyć?

Jeśli zapomniałeś użyć sprayu do nosa w odpowiednim momencie, użyj go, gdy tylko sobie o tym przypomnisz, a następnie kontynuuj jak wcześniej. Nie bierz podwójnej dawki aby nadrobić pominiętą dawkę.

Jeśli przestaniesz używać tego leku

U niektórych pacjentów objawy powinny ustąpić w ciągu 12 godzin po pierwszej dawce Nasonex; jednak czasami może to potrwać do dwóch dni, zanim leczenie w pełni zadziała. Jest

bardzo ważne, abyś swojego sprayu do nosa używał regularnie. Nie przerywaj swojego leczenia, nawet jeśli poczujesz się lepiej, chyba że na zalecenie lekarza.

Masz jeszcze inne pytania dotyczące stosowania tego leku? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek może również ten lek powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. wystąpić.

Mogą wystąpić ostre reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne) po zastosowaniu tego produktu. Te reakcje mogą być poważne. Przerwij stosowanie Nasonex i natychmiast zasięgnij pomocy medycznej jeśli wystąpią u Ciebie następujące objawy:

- opuchnięta twarz, język lub gardło
- problemy z przełykaniem
- wysypka skórna z silnym świądem (pokrzywka)
- świszczący oddech lub problemy z oddychaniem.

Gdy aerozole do nosa zawierające kortykosteroidy są stosowane w wysokich dawkach przez dłuższe okresy, mogą działania niepożądane zapobiegane są przez wchłanianie środka w organizmie.

Inne działania niepożądane

Większość ludzi nie doświadcza problemów po użyciu sprayu do nosa. Jednak niektórzy ludzie po użyciu Nasonexu lub innego sprayu do nosa na bazie kortykosteroidów mogą zauważyć, że mają problemy z:

Często występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 użytkowników):

- ból głowy
- kichanie
- krwawienia z nosa (występowały bardzo często [u więcej niż 1 na 10 użytkowników] u osób z polipami nosa, które otrzymywały dwa rozpylenia Nasonexu do każdego nozdrza dwa razy dziennie)
- bolesny nos lub gardło
- owrzodzenia w nosie
- infekcja dróg oddechowych

Nieznane (częstotliwość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe (jaskra) i/lub zaćma (katarakta), które powodują zaburzenia widzenia powodować
- uszkodzenie przegrody nosowej, która oddziela skrzydła nosa
- zmiany w smaku i zapachu
- świszczący oddech lub problemy z oddychaniem
- niewyraźne widzenie

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią działania niepożądane, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dotyczy to również możliwych działań niepożądanych, które nie są wymienione w tej ulotce. Możesz również zgłaszać działania niepożądane bezpośrednio poprzez Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, strona internetowa: www.lareb.nl. Zgłaszając działania niepożądane, możesz pomóc nam uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa tego leku. 5. Jak przechowywać ten lek? Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Nie zamrażać.

- Nie stosować tego leku
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Nie przechowywać w zamrażarce.
- upływie terminu ważności. Termin ważności jest po upływie terminu ważności. Jest on te znaleźć na butelce i opakowaniu po EXP. Tam znajduje się miesiąc i rok. Ostatni dzień tego miesiąca to ostateczna data ważności.
- Użyj butelki w ciągu 2 miesięcy po pierwszym otwarciu. Otwieraj jedną butelkę na raz.

Nie wylewaj leków do zlewu ani toalety i nie wyrzucaj ich do kosza. Zapytaj swojego farmaceutę, co zrobić z lekami, których już nie używasz. Zostaną one zniszczone w odpowiedzialny sposób i nie trafią do środowiska.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Jakie substancje zawiera ten lek?

- Substancją czynną w tym leku jest mometazon furoinian. Każdy spray zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoinianu, jako monohydrat.
- Inne substancje w tym leku to celuloza dyspergowalna, glicerol, cytrynian sodu, kwas cytrynowy jednowodny, polisorbitat 80, chlorek benzalkoniowy, woda oczyszczona.
- Ten lek zawiera 0,02 mg chlorku benzalkoniowego na jedno rozpylenie.

Jak wygląda Nasonex i ile jest w opakowaniu?

Nasonex to zawiesina do stosowania donosowego.

Każda butelka zawiera 60 lub 140 rozpyleń.

Butelki z 60 rozpyleń są dostarczane w opakowaniach z 1 butelką.

Butelki z 140 rozpyleń są dostarczane w opakowaniach po 1, 2 lub 3 butelki.

Nie wszystkie wymienione wielkości opakowań są w handlu dostępne.

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do handlu przynosić

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Holandia

Tel.: 00800 66550123

E-mail: dpoc.benelux@organon.com

Producent

Organon Heist bv

Industriepark 30

2220 Heist-op-den-Berg
Belgia

Zarejestrowany pod numerem:

Nasonex 50 mikrogramów/dawka, aerozol do nosa, zawiesina - RVG 21613

Ten lek jest zarejestrowany w państwach EOG pod następującymi nazwami:

- Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Islandia, Włochy, Chorwacja, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Słowenia, Zjednoczone Królestwo, Szwecja: Nasonex
- Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Czechy: NASONEX
- Austria: Nasonex aquosum – Nasenspray
- Łotwa: Nasonex 50 mikrogrami/deva deguna aerosols, suspensija
- Portugalia: Nasomet
- Hiszpania: NASONEX 50 microgramos suspensión para pulverización nasal

Ta ulotka została ostatnio zatwierdzona w listopad 2022.

Więcej informacji o tym leku jest dostępnych na stronie internetowej CBG:
www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.