

## Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle

Nicorette® Sokeriton 2 mg purukumi  
Nicorette® Sokeriton 4 mg purukumi  
Nicorette® Sokeriton Freshfruit 2 mg purukumi  
Nicorette® Sokeriton Freshfruit 4 mg purukumi

### Nikotiini

Lue koko pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää tärkeitä tietoja sinulle.

Käytä tätä lääkettä aina täsmälleen kuten tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuten lääkärisi tai apteekkihenkilökunta on sinulle kertonut.

- Säilytä tätä pakkausselostetta. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.
- Onko sinulla vielä kysymyksiä? Ota sitten yhteyttä sinun apteekkariin.
- Saatko jonkin haittavaikutuksen, joka on mainittu kohdassa 4? Tai saatko haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa? Ota sitten yhteyttäsinun lääkäriin tai apteekkariin. Koetko
- vielä 6 kuukauden jälkeen vaikeuksia lopettaa tupakointi? Ota sitten yhteyttä 6 kuukautta ja edelleen vaikeuksia lopettaa tupakointi? Ota sitten yhteyttä lääkäriin. Tämän pakkausselosteen sisältö

Mikä on Nicorette-purukumi ja mihin tätä lääkettä käytetään?

1. Milloin et saa käyttää tätä
2. lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen? Kuinka käytät tätä lääkettä?
3. Mahdolliset haittavaikutukset
4. Kuinka säilytät tätä lääkettä?
5. Kuinka säilytät tätä lääkettä?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mikä on Nicorette-purukumi ja mihin tätä lääkettä käytetään?

Nicorette on maustettu sokeriton purukumi, joka sisältää nikotiinia vaikuttavana aineena. vaikuttava aine.

Nikotiini Nicorette-valmisteessa kuuluu vieroitusaineiden ryhmään. Nicorette Sokeriton 2 mg ja Nicorette Sokeriton Freshfruit 2 mg käytetään voimakasta nikotiinintarvetta, joka voi ilmetä tupakoinnin lopettamisen tai vähentämisen yhteydessä. Jos tämä tarve on erittäin voimakas, voit käyttää Nicorette Sokeriton 4 mg ja Nicorette Sokeriton Freshfruit 4 mg. Kun pureskelet purukumia, nikotiini vapautuu hitaasti ja imeytyy suun kautta elimistöön. Tämä nikotiini riittää

vähentämään tupakoinnin tarvetta. Toisin kuin tupakansavu, Nicorette ei sisällä haitallista tervaa tai hiilimonoksidia. Tämä nikotiini riittää Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen? Milloin et saa käyttää tätä

2. Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineosalle. Nämä aineet löydät tämän pakkausselosteen kohdasta 6.

Milloin voit ottaa tämän älä käytä lääkettä?

- Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineosista. Nämä aineet löydät tämän pakkausselosteen kohdasta 6.
- Sinulla on vakava sydänsairaus:
  - äskettäinen sydäninfarkti;
  - sydämen rytmihäiriöt;
  - ahdistava, kivulias tunne rinnassa (angina pectoris);
  - niin sanottu Prinzmetal-angina.
- Olet äskettäin saanut aivoverenvuodon (aivohalvaus).
- Sinulla on tulehdus suussa, kurkussa tai ruokatorvessa.

Milloin sinun tulee olla erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?

Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkihenkilökuntaan ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lopeta tupakointi kokonaan tai vähennä tupakointia, kun aloitat Nicorette-valmisteen käytön.

Lääkärisi

tulee arvioida, voitko käyttää Nicorette-valmistetta: lääkärin on arvioitava, voitko käyttää Nicorettea:

- jos sinulla on sydän- ja verisuonisairaus, kuten resesydäninfarkti, epävakaa tai paheneva angina pectoris, mukaan lukien Prinzmetal-angina, vakavat rytmihäiriöt, hallitsematon hypertensio tai äskettäinen aivohalvaus on tai on ollut: mieluiten sinun tulisi lopettaa tupakointi ohjauksessa ilman nikotiinikorvaushoitoa. Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkihenkilökuntaan ennen tämän lääkkeen käyttöä, jos sinulla on angina pectoris, jos sinulle on äskettäin tehty ohitusleikkaus tai pallolaajennus sepelvaltimoissa, jos sinulla on jokin muu sydänsairaus tai jos sinulla on verisuonisairaus.
- jos sinulla on diabetes: verensokeritasoasi on seurattava tarkemmin.
- jos sinulla on munuais- ja maksasairaus: haittavaikutusten riski voi kasvaa.
- jos sinulla on kasvainlisämunuaisissa (feokromosytooma) tai kilpirauhasen hallitsematon lisääntynyt toiminta.
- sinulla on maha-suolikanavan sairauksia (ruokatorven tulehdus, maha- tai pohjukaissuolihaava): nikotiini voi pahentaa oireitasi. jos sinulla on maha-suolikanavan sairauksia (ruokatorven tulehdus, maha- tai pohjukaissuolihaava): nikotiini voi pahentaa oireitasi.
- sinulla on ollut aiemmin epi lepsiaa tai kohtauksia. Pitkäaikaista Nicorette-käyttöä entisille tupakoitsijoille ei suositella, koska nikotiini

pidetään riippuvuutta aiheuttavana. Nikotiini on myrkyllinen aine, joka näyttää olevan hyvin siedetty nikotiini on myrkyllinen aine, joka näyttää olevan hyvin siedetty käytetään käytetään nikotiinikorvaushoidon aikana.

Jos sinulla on hammasproteesi, purukumien pureminen voi olla ongelma. Purukumi voi tarttua hammasproteesiin ja harvinaisissa tapauksissa vahingoittaa sitä.

Lapset ja nuoret alle 18 vuotta

Nicorettea ei tule antaa henkilöille alle 18 vuotta ilman lääkärin määräystä.

Nicorette tulee säilyttää lasten ulottumattomissa pidettävä. Vaara lapsille: nikotiiniannokset, jotka ovat siedettäviä tupakoitsijoille, voivat aiheuttaa lapsille vakavia myrkytysoireita ja olla hengenvaarallisia. Nikotiinituotteita ei saa säilyttää paikoissa, joissa lapset voivat käsitellä tai nauttia niitä.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Käytätkö Nicoretten lisäksi muita lääkkeitä, oletko tehnyt niin äskettäin tai aiotko tehdä niin pian? Kerro siitalääkärillesi tai apteekkarillesi. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita voit saada ilman reseptiä. Tupakointi

Tupakointi voi nopeuttaa joidenkin lääkkeiden erittymistä elimistöstä. Tupakoinnin lopettaminen, nikotiinikorvaushoidolla tai ilman, ja tupakoinnin kanssa, nikotiinikorvaushoidolla tai ilman, muuttaa entisten tupakoitsijoiden reaktiota samanaikaisesti käytettyihin lääkkeisiin. Esimerkiksi, kun käytät lääkkeitä kuten teofylliini (astman hoitoon käytettävä lääke), takriini (Alzheimerin taudin hoitoon käytettävä lääke), klotsapiini tai olantsapiini (skitsofrenian hoitoon käytettävät lääkkeet), ropiniroli (Parkinsonin taudin hoitoon käytettävä lääke), imipramiini, klomipramiini tai fluvoksamiini (masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet), flekainidi (epäsäännöllisen sydämen sykkeen hoitoon käytettävä lääke) tai pentatsosiini (voimakas kipulääke), tupakoinnin lopettaminen voi johtaa lääkkeen määrän lisääntymiseen veressäsi. Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Oletko raskaana, epäiletkö olevasi raskaana, haluatko tulla raskaaksi tai imetätkö? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi ennen tämän lääkkeen käyttöä. Raskaus Nikotiini voi vaikuttaa syntymättömään sikiöön. Sinun tulee lopettaa

Raskaus

Nikotiini voi vaikuttaa sikiöön. Sinun tulee täysin tee lopu tupakoinnista raskauden aikana, erityisesti kun ilman nikotiinikorvaushoitoa. Siksi sinun ei tule käyttää Nicoretteä raskauden aikana, paitsi jos et voi lopettaa tupakointia ilman nikotiinikorvaushoitoa. Raskauden aikana tupakoinnin jatkaminen käyttö raskauden aikana, lukuun ottamatta naisia, jotka eivät voi lopettaa tupakointia ilman nikotiinikorvaushoitoa. Tupakoinnin jatkamisen vaara raskauden aikana lääkärisi kanssa, jos haluat käyttää Nicoretteä raskauden aikana. Imetys Nikotiini erittyy äidinmaitoon. Tämä voi vaikuttaa imeväiseen. Siksi sinun tulee välttää nikotiinin käyttöä imetyksen aikana. Tupakoinnin jatkaminen

voimuodostaa suuremman riskin lapselle kuin

nikotiinikorvaustuotteiden käyttö tupakoinnin lopettamisohjelmassa ohjauksessa. Jos olet voimakkaasti riippuvainen nikotiinista ja haluat imettää, Nicoretteä tulee käyttää vain lääkärisi ohjeiden mukaan. Nicorette-purukumia tulee käyttää mahdollisimman pian nikotiinikorvaustuotteiden käyttö tupakoinnin lopettamisohjelmassa ohjauksen alaisena. Jos olet voimakkaasti riippuvainen nikotiinista ja haluat imettää, Nicorette-valmisteen käyttö tulisi tapahtua vain neuvonnan perusteella jälkeen. Nicorette-purukumin käytön ja imetyksen välillä tulee olla mahdollisimman pitkä aika. lääkäri tapahtua. Nicorette purukumikumi on sitten mahdollisimman pian ei käytetä ruokinnan aikana. Aika Nicorette-purukumin käytön ja imetyksen välillä tulee olla niin lang mahdollista olla ja joka tapauksessa vähintään 2–3 tuntia. Lisäksi käytetyn Nicorette-purukumin vahvuus mahdollisimman alhainen olla. Hedelmällisyys

Sekä naisilla

että miehillä tupakointi lisää hedelmättömyyden riskiä. Ihmisillä ja eläimillä on osoitettu, että nikotiinilla on haitallisia vaikutuksia siemennesteen laatuun. Eläimillä on myös osoitettu hedelmällisyyden heikkenemistä. Ajaminen ja koneiden käyttö

Nicorette ei vaikuta tai sillä on vähäinen vaikutus ajokykyyn tai koneiden käyttöön. Nicorette Sokeriton

Nicorette Sokeriton Nicorette Sokeriton 2 mg ja Nicorette Sokeriton 4 mg sisältävät sorbitolia (E420). Nicorette Sokeriton 2 mg sisältää 190 mg sorbitolia per purukumi ja Nicorette Sokeriton 4 mg sisältää 179 mg sorbitolia per purukumi. Sorbitoli on fruktoosin lähde. lääkärisi on kertonut sinulle, että et siedä tiettyjä sokereita tai jos sinulla on todettu perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa henkilö ei pysty hajottamaan fruktoosia), ota yhteyttä lääkäriisi ennen tämän lääkkeen ottamista. lääkärisi on kertonut sinulle että Nicorette 2 mg ja 4 mg sisältävät makuaineita, joissa on kinnaamialdehydiä, kinnaamialkoholia, sitraalia, sitronellolia, eugenolia, geraniolia, isoeugenolia, limoneenia, linalooliacorette 2 mg ja 4 mg sisältävät makuaineita, joissa on kanelialdehydiä, kanelialkoholia, sitraalia, sitronellolia, eugenolia, geraniolia, isoeugenolia, limoneenia, linalooli. Nämä aineet voivat aiheuttaa allergisia reaktioita.

Nicorette Sokeriton 2 mg ja 4 mg purukumi sisältävät 0,616 mg alkoholia (etanolia) per purukumi. Tässä valmisteessa on pieni määrä alkoholia. Tämä on niin vähäinen, että et huomaa sitä.

Nicorette Sokeriton ja Nicorette Sokeriton Freshfruit sisältävät alle 1 mmol natriumia (23 mg) per purukumi, eli se on käytännössä 'natriumvapaa'.

Purukumipohja sisältää butyylihydroksitolueenia (E321), antioksidanttia. Tämä apuaine voi paikallisesti aiheuttaa iho-oireita (esim. kosketushottumaa) tai ärsytystä silmissä ja limakalvoilla.

### 3. Kuinka käytät tätä valmistetta?

Käytä tätä lääkettä aina täsmälleen kuten tässä pakkausselosteessa on kerrottu tai kuten sinun lääkärisi tai apteekkarisi on sinulle kertonut. Epäiletkö oikeaa käyttöä? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäriisi tai apteekkariisi.

### TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN

1. Lopeta tupakointi kokonaan ensimmäisestä päivästä alkaen.
2. Ota yksi Nicorette-purukumi, kun tunnet tarvetta om polttaa. Vahvasti riippuvaisille tupakoitsijoille suositellaan aluksi Nicorette Sokeriton (/Freshfruit) 4 mg käyttöä (enintään 14 purukumia päivässä). Muille tupakoitsijoille suositellaan 2 mg purukumia käyttöä (enintään 14 purukumia päivässä).
3. Pureskele hitaasti, säännöllisin tauoin.  
Noin 30 minuutin pureskelun jälkeen kaikki saatavilla oleva nikotiini on vapautunut purukumista. Nikotiinin vaikutukset huomaat vasta muutaman minuutin kuluttua; nopeaa tyydytystä, kuten tupakoinnin yhteydessä, et voi odottaa.  
Happamien juomien, kuten kahvin tai virvoitusjuomien, käyttöä tulee välttää 15 minuuttia ennen ja pureskelun aikana. Nämä juomat vaikuttavat nikotiinin imeytymiseen suuontelossa.  
Hidas pureskelu edistää nikotiinin optimaalista imeytymistä suun limakalvon kautta. Syljen nielemistä tulee siis rajoittaa mahdollisimman vähän.
4. Nicorette-purukumilla on erityinen voimakas maku, joka aluksi voi tuntua oudolta tuntua. Totut siihen nopeasti.

5. Riski uudelleen aloittaa tupakointi uudelleenensimmäisten 3–4 kuukauden aikana on suurin. Älä siis lopeta Nicorette-valmisteen käyttöä nopeasti tämän kriittisen ajanjakson aikana. Nicorette
6. voi vain auttaa. Tupakoinnin lopettaminen pysyvästi vaatii aina vain auttaa. Lopullinen tupakoinnin lopettaminen on aina henkilökohtaista panostasi. Neuvonta ja tuki parantavat onnistumisen mahdollisuutta. Pidä aina mukana purukumi
7. mukana . on.  
sinun sinun savukkeita säilytetty.
8. Vähennä vähitellen purukumien määrää päivässä.  
Hoidon kesto on yksilöllinen. On suositeltavaa jälkeen noin kolmen kuukauden hoidon jälkeen vähentää Nicorette-valmisteen käyttöä asteittain. Kun käytät päivittäin enää 1-2 purukumia, voit lopettaa hoidon. Jatkuva Nicorette-valmisteen käyttö yli yhden vuoden ajan ei ole suositeltavaa.
9. Pidä mukana varapurukumi taskussa sillä tupakointihimo voi palata yllättäen.
10. Pidä lääkärisi tai apteekkihenkilökunta säännöllisesti ajan tasalla. He voivat antaa sinulle neuvoja.

## VÄHENNÄ TUPAKOINTIA

1. Korvaa mahdollisimman monta tupakkaasi purukumilla.  
Purukumia tulee käyttää heti, kun on tarve polttaa tupakointia ja pidä savuton jakso mahdollisimman pitkänä. Tämä vähentää savukkeiden määrää.  
Vahvasti riippuvaisille tupakoitsijoille suositellaan aluksi Nicorette Sokeriton (Freshfruit) 4 mg käyttämään (enintään 14 purukumia päivässä). Muille tupakoitsijoille suositellaan 2 mg purukumia käyttämään (enintään 14 purukumia päivässä).
2. Pureskele hitaasti, säännöllisintauoin.  
Noin 30 minuutin pureskelun jälkeen kaikki saatavilla oleva nikotiini on vapautunut purukumista. Nikotiinin vaikutukset huomaat vasta muutaman minuutin kuluttua; nopeaa tyydytystä, kuten tupakoinnissa, ei siis voi odottaa.  
Happamien juomien, kuten kahvin tai virvoitusjuomien, käyttöä tulee välttää 15 minuuttia ennen ja pureskelun aikana. Nämä juomat vaikuttavat nikotiinin imeytymiseen suun limakalvolla.  
Hidas pureskelu edistäänikotiinin optimaalista imeytymistä suun limakalvon kautta. Syljen nielemistä tulee siis rajoittaa mahdollisimman vähän.
3. Nicorette:lla on erityinen voimakas maku, joka aluksi voi tuntua oudolta näyttää. Totut siihen nopeasti.
4. Vähennä tupakankulutuksen kunnes lopetat kokonaan voi lopettaa.
5. Nicorette voi vain auttaa. Lopullinen tupakoinnin lopettaminen vaatii ainasinun henkilökohtaista panostasi. Neuvonta ja tuki parantavat mahdollisuutta onnistua. Pidä aina mukana purukumi
6. taskussa . on.  
säilytit savukkeesi. Vähennä vähitellen päivittäisten purukumien määrää.
7. Kun käytät päivittäin enää 1-2 purukumia, voit lopettaa hoidon.  
Kun käytät päivittäin enää 1-2 purukumia, voit lopettaa hoidon.
8. Pidä mukana varapurukumi taskussa koska halu tupakoida voi palata yllättäen.koska halu tupakoida voi yhtäkkiä palata.
9. apteekkari tai lääkäri säännöllisesti ajan tasalla. He voivat antaa sinulle neuvoja. Käytä lapsilla ja nuorilla alle 18-vuotiailla Nicorettea ei saa antaa alle 18-vuotiaille ilman

lääkäri määräystä.

Nicorettea ei saa antaa alle 18-vuotiaille henkilöille ilmankäyttäneet liikaa tätä lääkettä?

Jos aiot käyttää Nicorettea, sinun tulee lopettaa tupakointi kokonaan tai vähentää tupakointia. Yliannostuksen oireita voi esiintyä, kun pureskelet suuren määrän purukumeja kerralla tai hyvin nopeasti peräkkäin, tai kun jatkat tupakointia Nicorette-hoidon aikana. Myrkytysriski purukumin nielemisestä on Jos käytät Nicorette-valmistetta, sinun tulee lopettaa tupakointi kokonaan tai vähentää tupakointia. Yliannostuksen oireita voi ilmetä, kun otat , koska imeytyminen elimistöön ilman pureskelua on hidasta ja epätäydellistä. pieni, koska imeytyminen elimistöön ilman pureskele hitaasti ja ei täysin.

Yliannostuksen oireita ovat voimakas päänsärky, huimaus, vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, syljeneritys, ripuli, hikoilu, heikentynyt kuulo ja väsymys. Suurilla annoksilla näitä oireita voi seurata liian matala verenpaine, heikko ja onlääketieteellistä neuvontaa lääkäritäsi tai ensiapuosastolta tai myrkytystietokeskuksesta (puhelin: 112). Säilytä lasten ulottumattomissa. Nikotiiniannokset, jotka aikuiset tupakoitsijat sietävät hoidon aikana, voivat aiheuttaa vakavia myrkytysoireita lapsille ja voivat olla hengenvaarallisia. Oletko unohtanut käyttää tätä lääkettä?

Älä käytä kaksinkertaista annosta unohtuneen annoksen korvaamiseksi. käyttää? lääkäriisi tai apteekkiin. unohtuneen annoksen ottaminen kiinni.

Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäri tai apteekkari.

#### 4. Mahdolliset haittavaikutukset?

Kuten kaikki lääkkeet voi myös tämä lääke aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä. kohdata. tehdä.

Tupakoinnin lopettamisen yhteydessä voi esiintyä tiettyjä oireita, kuten masentunut mieliala, unettomuus, ärtyneisyys, turhautuminen tai viha, ahdistus, keskittymisvaikeudet, levottomuus tai kärsimättömyys, hidastunut syke, lisääntynyt ruokahalu tai painonnousu, huimaus, yskä, ummetus, verenvuoto ikenistä tai aftat, tai vilustuminen. Lisäksi nikotiininhimo voipainonnousu, huimaus, yskä, ummetus, verenvuoto ikenistä tai suun haavaumat, tai vilustuminen. Lisäksi nikotiininhimoja voi syvään haluun tupakoida. Useimmat haittavaikutukset ilmenevät hoidon ensimmäisten kolmen tai neljän

viikon aikana. Haittavaikutukset riippuvat käyttämästäsi määrästä ja ovat seurausta väärästä pureskelutekniikasta tai nikotiinin vaikutuksista. Kun pureskelet hoitojakson viikkoina. Haittavaikutukset riippuvat käyttämästäsi määrästä ja johtuvat väärästä pureskelutekniikasta tai nikotiinin vaikutuksista. Kun käytät nopeasti, Nicorette voi aluksi ärsyttää suuta tai kurkkua tai aiheuttaa hikan tai pahoinvointia. Allergiset reaktiot ovat harvinaisia nikotiinin käytön yhteydessä. Seuraavat haittavaikutukset voivat esiintyä hyvin usein (yli

yhdellä kymmenestä käyttäjästä): päänsärky  
päänsärkyyskä, hikka, pahoinvointi, kipeä suu of kurkku, kurkun ärsytys.

Seuraavat haittavaikutukset voivat esiintyä usein (alle 1 käyttäjällä 10:stä): vatsakipu, ripuli, kuiva suu, ruoansulatushäiriöt, ilmavaivat, liiallinen syljeneritys, suun limakalvon tulehdus,

oksentelu, een polttava tunne suussa, väsymys, yliherkkyys, makuaistin häiriöt, kihelmöinti. Purukumi voi tarttua hammasproteesiin ja harvinaisissa tapauksissa vahingoittaa sitä.

Seuraavat haittavaikutukset voivat joskus (alle 1 käyttäjällä 100:sta) esiintyä: sydämentykytys, nopeutunut sydämen toiminta, röyhtäily, kielen tulehdus, rakkuloita ja hilseilyä suun limakalvolla, suun tuntoherkkyden heikkeneminen, yleinen heikkous, epämiellyttävä tunne ja rintakipu, epämukavuustunne, leukakipu (jäykkä leuka), epänormaalit unet, hengitysteiden ahtautuminen, käheys, hengenahdistus, tukkoinen nenä, kurkkukipu, aivastelu, kurkun puristuminen, hikoilu, kutina, ihottuma, ihottuma mahdollisesti voimakkaan kutinan ja paukamien muodostumisen kanssa (nokkosihottuma tai urtikaria), punoitus, kohonnut verenpaine.

Nielemisvaikeudet, suun tunnottomuus ja oksennusrefleksi voivat harvoin (alle 1 käyttäjällä 1.000:sta) esiintyä Nicoretten käytön yhteydessä.

Seuraava haittavaikutus voi erittäin harvoin (alle 1 käyttäjällä 10.000:sta) esiintyä: vakava yliherkkyysreaktio.

Seuraavien haittavaikutusten esiintymistiheys ei ole tiedossa: näön hämärtyminen, lisääntynyt kyyneleritys, kuiva kurkku, ruoansulatuskanavan vaivat, huulikipu, jäykät lihakset, kutiseva turvotus iholla tai limakalvoilla, punoitus, kohtaukset.

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos koet haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi. Tämä koskee myös haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista Hollannin Haittavaikutuskeskuksen kautta (verkkosivusto: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Haittavaikutusten ilmoittaminen auttaaerkingen te ilmoittamalla autatte meitä saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

## 5. Miten säilytät tätä lääkettä?

Säilytä alle 25 °C.

Pidä lasten ulottumattomissa ja näkyvistä.

Älä käytä tätä lääkettä enää jälkeen päättymiskohdan 'EXP' jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivä. Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai

Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai :hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekiltasi, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Jos sinä apteekki mitä sinun tulee tehdä lääkkeillä, joita et enää käytä. Jos kun lääkkeet hävitetään oikein, ne tuhoetaan asianmukaisesti eivätkä ne päädy ympäristöön.

## 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitkä aineet ovat tässä valmisteessa?

Nicorette Sokeriton 2 mg purukumi

- Tämän valmisteen vaikuttava aine on nikotiini. Jokainen purukumi sisältää nikotiiniresinaattia, joka vastaa 2 mg nikotiinia.

- Muut aineet tässä valmisteessa ovat natriumbikarbonaatti (E500), vedetön natriumkarbonaatti (E500), kumipohja (sisältää BHT), sorbitolijauhe (E420i), sorbitoli 70% (E420ii), makuaineet, glyseroli 85% (E422) ja talkki (E553b). Aroma pro fumendi (makuaine) sisältääjäämiä etanolista, kinnaamalista, kinnaamialkoholista, sitraalista, sitronellolista, eugenolista, geraniolista, isoeugenolista, limoneenista, linaloolista.

#### Nicorette Sokeriton 4 mg purukumi

- Tämän valmisteeseen vaikuttava aine on nikotiini. Jokainen purukumi sisältää nikotiiniresinaattia, joka vastaa 4 mg nikotiinia.
- Muut aineet tässä valmisteessa ovat vedetön natriumkarbonaatti (E500), kumipohja (sisältää BHT), sorbitolijauhe (E420i), sorbitoli 70% (E420ii), makuaineet, glyseroli 85% (E422), väriaine kinoliininkeltainen (E104) ja talkki (E553b). Aroma pro fumendi (makuaine) sisältää jäämiä etanolista, kinnaamalista, kinnaamialkoholista, sitraalista, sitronellolista, eugenolista, geraniolista, isoeugenolista, limoneenista, linaloolista.

#### Nicorette Sokeriton Freshfruit 2 mg purukumi

- Tämän valmisteeseen vaikuttava aine on nikotiini. Jokainen purukumi sisältää nikotiiniresinaattia, joka vastaa 2 mg nikotiinia.
- Muut aineet tässä valmisteessa ovat natriumbikarbonaatti (E500), vedetön natriumkarbonaatti (E500), kumipohja (sisältää BHT), ksylitoli (E967), piparminttuöljy, levomentoli, kalium-asesulfaami, kevyt magnesiumoksidi (E530), talkki (E553b) ja typpi. Pinnoite: ksylitoli (E967), tuttifrutti QL84441, kuivattu akaasia, titaanidioksidi, karnaubavaha, hypromelloosi, sukraloosi, polysorbaatti 80 ja puhdistettu vesi.

#### Nicorette Sokeriton Freshfruit 4 mg purukumi

- Tämän valmisteeseen vaikuttava aine on nikotiini. Jokainen purukumi sisältää nikotiiniresinaattia, joka vastaa 4 mg nikotiinia.
- Tämän valmisteeseen muut aineet ovat vedetön natriumkarbonaatti (E500), kumipohja (sisältää BHT), ksylitoli (E967), piparminttuöljy, levomentoli, kalium-asesulfaami, kolloidinen magnesiumoksidi (E530), väriaine kinoliininkeltainen (E104), talkki (E553b) ja typpi. Päällyste: ksylitoli (E967), tuttifrutti QL84441, kuivattu akaasia, titaanidioksidi, karnaubavaha, väriaine kinoliininkeltainen (E104) hypromelloosi, sukraloosi, polysorbaatti 80 ja puhdistettu vesi.

(Lisätietoja joistakin ainesosista, katso kohta 2)

Miltä Nicorette näyttää ja mitä pakkaus sisältää?

Nicorette Sokeriton 2 mg on neliönmuotoinen purukumi, väriltään beige.

Nicorette Sokeriton 4 mg on neliönmuotoinen purukumi, väriltään keltainen.

Nicorette Sokeriton Freshfruit 2 mg on neliönmuotoinen purukumi, päällystetty, väriltään valkoinen.

Nicorette Sokeriton Freshfruit 4 mg on neliönmuotoinen purukumi, päällystetty, väriltään norsunluun värinen.

Nicorette Sokeriton 2 mg ja 4 mg ovat saatavilla 30 tai 105 purukumin pakkauksissa, läpipainopakkauksessa (Al/PVC/PVDC).

Nicorette Sokeriton Freshfruit 2 mg ja 4 mg ovat saatavilla 12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105, 204 tai 210 purukumia, läpipainopakkauksessa (Al/PVC/PVDC).

On mahdollista, että kaikkia mainittuja pakkauskokoja ei tuoda markkinoille. Myyntiluvan haltija

kaupalliseen käyttöön tuoda Kenvue Netherlands B.V.  
Stadsplateau 27  
3521 AZ Utrecht

Valmistaja  
McNeil AB  
Norrbroplatsen 2  
251 09 Helsingborg  
Ruotsi

Myyntiluvan numerot kauppa tuoda  
Nicorette Sokeriton 2 mg purukumi: RVG 09155  
Nicorette Sokeriton 4 mg purukumi: RVG 14228  
Nicorette Sokeriton Freshfruit 2 mg purukumi: RVG 32548  
Nicorette Sokeriton Freshfruit 4 mg purukumi: RVG 32549

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty 12. toukokuuta 2025.tst hyväksytty 12. toukokuuta 2025.