

## Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

Nicorette® Sukkerfri 2 mg tyggegummi  
Nicorette® Sukkerfri 4 mg tyggegummi  
Nicorette® Sukkerfri Freshfruit 2 mg tyggegummi  
Nicorette® Sukkerfri Freshfruit 4 mg tyggegummi

### Nikotin

Les nøye gjennom hele pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet, for det inneholder viktig informasjon for deg.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik det er beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen din eller apoteket har fortalt deg.

- Oppbevar denne pakningsvedlegget. Du kan trenge det igjen senere.
- Har du flere spørsmål? Ta kontakt med din apotek.
- Får du bivirkninger som er nevnt i avsnitt 4? Eller får du en bivirkning som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget? Ta da kontakt med din lege eller apotek.
- Opplever du etter 6 måneder fortsatt vanskeligheter med å slutte å røyke? Ta da kontakt med din lege.

Innholdet i dette pakningsvedlegget

1. Hva er Nicorette tyggegummi og hva brukes dette legemidlet til?
2. Når skal du ikke bruke dette legemidlet eller må du være ekstra forsiktig med det?
3. Hvordan bruker du dette legemidlet?
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan oppbevarer du dette legemidlet?
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva er Nicorette tyggegummi og hva brukes dette middelet til?brukt?

Nicorette er en smakstilsatt sukkerfri tyggegummi med nikotin som virkestoff.

Nikotin i Nicorette tilhører gruppen av avvenningsmidler. Nicorette Sukkerfri 2 mg og Nicorette Sukkerfri Freshfruit 2 mg brukes for å bekjempe det sterke behovet for nikotin som folk kan få når de slutter å røyke eller reduserer røyking. Når dette behovet er veldig sterkt, kan du bruke Nicorette Sukkerfri 4 mg og Nicorette Sukkerfri Freshfruit 4 mg. Når du tygger på tyggegummien, frigjøres nikotinen sakte og tas opp i kroppen via munnen. D

enne nikotinen er nokfor å redusere behovet for å røyke. I motsetning til tobakksrøyk inneholder Nicorette ikke skadelig tjære eller karbonmonoksid. behovet for å røyke. I motsetning til tobakksrøyk inneholder Nicorette ikke skadelig tjære eller karbonmonoksid.

2. Når skal du ikke bruke dette

middelet? ikke bruk legemidlet?

- Du er allergisk mot en av stoffene i dette legemidlet. Disse stoffene finner du i avsnitt 6 i dette pakningsvedlegget.

- Du har en alvorlig hjertesykdom:
  - et nylig hjerteinfarkt;
  - hjerterytmeforstyrrelser;
  - en trykkende, smertefull følelse i brystet (angina pectoris);
  - en såkalt Prinzmetal angina.
- Du har nylig hatt en hjerneblødning (slag).
- Du har en betennelse i munnen, halsen eller spiserøret.

Når bør du være ekstra forsiktig med dette legemidlet?

Ta kontakt med din lege eller apotek før du bruker dette legemidlet.

Slutt helt å røyke eller røyk mindre når du begynner å bruke Nicorette.

Din lege bør vurdere om du kan bruke Nicorette:

- hvis du har en hjerte- og karsykdom som et nylighjerteinfarkt, ustabil eller forverret angina pectoris, inkludert Prinzmetal-angina, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, ukontrollert hypertensjon eller nylig slag: helst bør du slutte å røyke under veiledning uten nikotinerstatningsterapi. Kontakt legen din eller apoteket før du bruker dette legemidlet hvis du har angina pectoris, hvis du nylig har hatt en bypass eller ballongdilatasjon av hjertets arterier, hvis du har noen annen hjertelidelse eller hvis du har en blodkarsykdom.
- hvis du har diabetes: da må blodsukkernivået ditt overvåkes nøye.
- hvis du har en nyre- og leversykdom: det er en risiko for økning i bivirkninger.
- hvis du har en svulsti binyrene (feokromocytom) eller en ukontrollert økt aktivitet av skjoldbruskkjertelen.
- hvis du har mage-tarmsykdommer (betennelse i spiserøret, mage- eller tarmssår): nikotin kan forverre symptomene dine.
- hvis du tidligere har hatt epilepsi eller anfall.

Langvarig bruk av Nicorette av tidligere røykere frarådes, fordi nikotin anses som vanedannende. Nikotin er et giftig stoff, som ser ut til å bli godt tolerert i under nikotinerstatningsterapi.

Hvis du har gebiss, kan tygging av tyggegummi være et problem. Tyggegummien kan feste seg til gebisset og i sjeldne tilfeller skade det.

Barn og ungdom under 18 år

Nicorette skal ikke gis til personer under 18 år uten resept fra lege.

Nicorette skal oppbevares utilgjengelig for barn for å unngå fare: nikotindoser som tolereres av røykere, kan forårsake alvorlige forgiftningssymptomer hos barnog være dødelige. Nikotinprodukter må ikke oppbevares på steder der de kan håndteres eller inntas av barn.

Bruker du andre legemidler?

Bruker du andre legemidler i tillegg til Nicorette, har du nylig gjort det eller planlegger du å gjøre det snart? Fortell det da til din lege eller apotek. Dette gjelder også for legemidler du kan få uten resept.

Røyking kan utskillelsen av enkelte legemidler fra kroppen akselerere. Å slutte å røyke, med eller uten nikotinerstatning, kan reaksjonen til tidligere røykere på samtidig brukte legemidler endre seg. Når du for eksempel bruker legemidler som teofyllin (middel brukt ved astma), takrin (middel brukt ved sykdommen Alzheimer), klozapin eller olanzapin (midler brukt ved schizofreni), ropinirol (middel brukt ved Parkinsons sykdom), imipramin, klomipramin eller

fluvoxamin (midler brukt ved depresjon), flekainid (middel brukt ved uregelmessig hjerterytme) eller pentazocin (kraftig smertestillende), kan det å slutte å røyke føre til en økning i mengden legemiddel i blodet ditt.

#### Graviditet, amming og fruktbarhet

Er du gravid, tror du at du er gravid eller ønsker å bli gravid, eller ammer du? Ta da kontakt med er du gravid eller ammer du? Ta da kontakt med eller apoteket ditt før du bruker dette legemidlet. Graviditet

#### Nikotin

kan ha en effekt på det ufødte fosteret. Du bør fullstendig slutte å røyke når du er gravid, for å unngåuten bruk av nikotinerstatningsprodukter. Du bør derfor ikke bruke Nicorette under graviditet, med unntak av kvinner som ikke kan slutte å røyke uten nikotinerstatningsterapi. Faren ved å fortsette å røyke under graviditet kan utgjøre en større risiko for det ufødte barnet enn bruk av nikotinerstatningsprodukter under faglig veiledning. Rådfør deg først med legen din hvis du ønsker å bruke Nicorette under graviditet. Amming

#### Ammingkan

utgjøre en større risiko for barnet enn bruk av nikotinerstatningsprodukter i et røykesluttprogram under veiledning. Hvis du er sterkt avhengig av nikotin og ønsker å amme, bør bruk av Nicorette kun skje etter råd fra legen din. Nicorette tyggegummi bør da brukes så snart som mulig bruk av nikotinerstatningsprodukter i et røykesluttprogram under veiledning. Hvis du er sterkt avhengig av nikotin og ønsker å amme, bør bruk av Nicorette kun skje etter råd fra amming. Tiden mellom bruk av Nicorette tyggegummi og amming bør være så lege å skje. Nicorette tyggetyggegummi må da så raskt som mulig na lang mogelijk te zijn. lang mulig å være og i alle fall ikke mindre enn 2 til 3 timer. Dessuten bør styrken av den brukte Nicorette tyggegummi være så lav som mulig å være.

#### Fertilitet

Både hos kvinner og hos menn øker røyking risikoen for infertilitet. Hos mennesker og dyr er det vist at nikotin har negative effekter på sædkvaliteten. Hos dyr er det også vist redusert fertilitet.

#### Kjøreevne og bruk av maskiner

Nicorette har ingen eller ubetydelig påvirkning på kjøreevne eller bruk av maskiner.

Nicorette Sukkerfri 2 mg og Nicorette Sukkerfri 4 mg inneholder sorbitol (E420). Nicorette Sukkerfri 2 mg inneholder 190 mg sorbitol per tyggegummi og Nicorette Sukkerfri 4 mg inneholder 179 mg sorbitol per tyggegummi. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har informert deg om atdu ikke tåler visse sukkerarter eller hvis du har fått påvist arvelig fruktoseintoleranse (en sjelden arvelig tilstand der en person ikke kan bryte ned fruktose), kontakt legen din før du får dette legemidlet.

Nicorette 2 mg og 4 mg inneholder smakstilsetninger med cinnamal, cinnamylalkohol, citral, citronellol, eugenol, geraniol, isoeugenol, limonen, linalool. Disse stoffene kan forårsake allergiske reaksjoner.

Nicorette Sukkerfri 2 mg og 4 mg tyggegummi inneholder 0,616 mg alkohol (etanol) per tyggegummi. Det er en liten mengde alkohol i dette middelet. Dette er så lite at du ikke merker noe til det.

Nicorette Sukkerfri og Nicorette Sukkerfri Freshfruit inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per tyggegummi, det vil si at det i hovedsak er 'natriumfritt'. Gummibasen inneholder butylhydroksytoluen (E321), en antioksidant. Dette hjelpestoffet kan lokalt forårsake hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner.

### 3. Hvordan bruker du dette middelet?

Bruk dette legemidlet alltid nøyaktig som angitt i dette pakningsvedlegget eller som din lege eller apotek har fortalt deg. Er du i tvil om riktig bruk? Ta da kontakt med din lege eller apotek.

## SLUTTE Å RØYKE

1. Slutt helt å røyke fra første dag.
2. Du tar en Nicorette tyggegummi når du føler behovet om å røyke. Sterkt avhengige røykere anbefales å bruke Nicorette Sukkerfri (/Freshfruit) 4 mg å bruke (maksimalt 14 tyggegummier per dag). Andre røykere anbefales å bruke 2 mg tyggegummi å bruke (maksimalt 14 tyggegummier per dag).
3. Tygge sakte, med regelmessige pauser.  
Etter omtrent 30 minutter med tygging-med-pauser er all tilgjengelig nikotin fra tyggegummien frigjort. Effektene av nikotin merker du først etter noen minutter; den raske tilfredsstillelsen som oppstår ved røyking kan du derfor ikke forvente. Bruk av sure drikker som kaffe eller brus bør unngås i 15 minutter før og under tygging. Disse drikkene påvirker opptaket av nikotin i munnhulen. Den langsomme tyggingen fremmer en optimal opptak av nikotin gjennom munnslimhinnen. Svelging av spytt bør derfor begrenses til et minimum.
4. Nicorette har en spesiell sterk smak, som i begynnelsen kan virke litt merkelig kan virke. Du vil raskt venne deg til det.
5. Risikoen for begynne å røyke igjenden, er de første 3 til 4 månedene er høyest. Stopp derfor ikke bruken av Nicorette raskt i denne kritiske perioden. Nicorette
6. kan bare hjelpe. Å slutte å røyke for godt vil alltid bare hjelpe. Å slutte å røyke for godt vil alltid din personlige innsats. Råd og støtte forbedrer sjansen for suksess. Sørg for at du alltid har noen tyggegummier i lommen
7. Sørg for at du alltid har noen tyggegummier på Legg dem på alle steder der du tidligere hadde dem. din sigaretter oppbevart.
8. Reduser gradvis antall tyggegummier per dag. Varigheten av behandlingen er individuell. Det anbefales etter en behandling på omtrent tre måneder, å gradvis redusere bruken av Nicorette. Når du daglig bare bruker 1-2 tyggegummier, kan du stoppe behandlingen. Uavbruttbruk av Nicorette i mer enn ett år anbefales ikke.
9. Ha noen reserve tyggegummier i lommen siden trangen til å røyke plutselig kan komme tilbake.
10. Hold din apoteker eller lege regelmessig informert. De kan gi deg råd.

## MINDRE RØYKING

1. Erstatt så mange som mulig din sigarett med en tyggegummi.

Tyggegummien skal brukes så snart det er en trang til å røyke og dette for å holde den røykfrie perioden så lang som mulig. Dette reduserer antall sigaretter.

Sterkt avhengige røykere anbefales å bruke Nicorette Sukkerfri (Freshfruit) 4 mg å bruke (maksimalt 14 tyggegummier per dag). Andre røykere anbefales å bruke 2 mg tyggegummi å bruke (maksimalt 14 tyggegummier per dag).

2. Tygge sakte, med regelmessige pauser.

Etter omtrent 30 minutter med tygging-med-pauser er all tilgjengelig nikotin frigjort fra tyggegummien. Effektene av nikotin merker du først etter noen minutter; den raske tilfredsstillelsen som oppstår ved røyking kan du derfor ikke forvente.

Bruk av sure drikker som kaffe eller brus bør unngås i 15 minutter før og under tygging. Disse drikkene påvirker opptaket av nikotin i munnhulen.

Den langsomme tyggingen fremmer en optimal opptak av nikotin gjennom munnslimhinnen. Svelging av spytt bør derfor begrenses til et minimum.

3. Nicorette har en spesiell sterk smak, som i begynnelsen kan virke litt fremmed kan virke. Du vil raskt venne deg til det.
4. Reduser sigarettforbruket til du er helt kan slutte.
5. Nicorette kan bare hjelpe. Å slutte å røyke for godt vil alltidin personlige innsats kreve. Råd og støtte forbedrer sjansen for suksess. på suksess.
6. lommen har. har. dine sigaretter oppbevarte. Reduser gradvis antall tyggegummier per dag.
7. Når du daglig bare bruker 1-2 tyggegummier, kan du avslutte behandlingen. Når du daglig bare bruker 1-2 tyggegummier, kan du avslutte behandlingen.
8. Hold noen reserve tyggegummier på lomme daettersom lysten til å røyke plutselig kan komme tilbake.
9. Hold din apotek eller lege regelmessig informert. De kan gi deg råd.

Bruk hos barn og ungdom under 18 år

Nicorette skal ikke gis til personer under 18 år uten medisinsk resept fra en lege.

Har du for mye av dette middelet brukt?

Hvis du skal bruke Nicorette, må du slutte helt å røyke eller redusere røyking. Symptomer på en overdose kan oppstå når du tygger et stort antall tyggegummier samtidig eller veldig raskt etter hverandre, eller når du fortsetter å røyke mens du bruker Nicorette. Risikoen for forgiftning som følge av å svelge tyggegummien er liten, fordi opptaket i kroppen uten tygging er langsomt og ikke fullstendig.

Symptomene på overdosering er alvorlig hodepine, svimmelhet, magesmerter, kvalme, oppkast, spyttsekresjon, diaré, svette, nedsatt hørsel og slapphet. Ved høye doser kan disse symptomene følges av for lavt blodtrykk, svak og uregelmessig puls, pustevansker, utmattelse, plutselig nedgang i blodsirkulasjonen og generelle kramper. Når du har inntatt for mye nikotin, eller når et barn har brukt en tyggegummi eller når dette mistenkes, søk umiddelbart medisinsk råd fra din lege eller ved en legevakt eller ved et giftinformasjonssenter (telefon: 112).

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Nikotin doser som tolereres av voksne røykere under behandlingen, kan forårsake alvorlige forgiftningssymptomer hos barn og kan være dødelige.

Har du glemt å bruke dette legemidlet for å bruke?

Ikke bruk dobbel dose for å ta igjen en glemt dose.

Har du flere spørsmål om bruken av dette legemidlet? Ta kontakt med din lege eller apotek.

#### 4. Mulige bivirkninger?

Som alle legemidler kan også dette legemidlet ha bivirkninger. Ikke alle får dem å gjøre med.

Ved røykeslutt kan visse symptomer oppstå som en depressiv stemning, søvnløshet, irritabilitet, frustrasjon eller sinne, angst, konsentrasjonsvansker, rastløshet eller utålmodighet, redusert hjerterefrekvens, økt appetitt og vektøkning, svimmelhet, hoste, forstoppelse, blødende tannkjøtt eller munnsår, eller en forkjølelse. I tillegg kan sug etter nikotin føre til en sterk trang til å røyke.

De fleste bivirkninger oppstår i løpet av de første tre til fire ukene av behandlingen. Bivirkningene avhenger av mengden du bruker og er et resultat av feil tyggeteknikk eller effektene av nikotin. Når du tygger for raskt kan Nicorette i begynnelsen irritere munnen eller halsen eller forårsake hikke eller kvalme. Allergiske reaksjoner er sjeldne ved bruk av nikotin.

Følgende bivirkninger kan forekomme svært ofte (hos mer enn 1 av 10 brukere): hodepine, hoste, hikke, kvalme, smertefull munn og hals, halsirritasjon.

Følgende bivirkninger kan ofte (hos færre enn 1 av 10 brukere) forekomme: magesmerter, diaré, tørr munn, fordøyelsesbesvær, flatulens, for mye spytt, betennelse i munnslimhinnen, oppkast, en brennende følelse i munnen, tretthet, overfølsomhet, forstyrret smakssans, prikking. Tyggegummien kan feste seg til en protese og, i sjeldne tilfeller, skade den.

Følgende bivirkninger kan noen ganger (hos færre enn 1 av 100 brukere) forekomme: hjertebank, rask hjerterefrekvens, raping, tungebetennelse, blommer og flassing av munnslimhinnen, redusert følsomhet i munnen, generell kroppssvakhet, ubehagelig følelse og smerte i brystet, ubehagelig følelse, kjevesmerter (stiv kjeve), unormale drømmer, innsnevring av luftveiene, heshet, kortpustethet, tett nese, sår hals, nysing, innsnevret hals, svette, kløe, utslett, utslett med eller uten intens kløe og dannelse av knuter (elveblest eller urtikaria), rødme, forhøyet blodtrykk.

Svelgevansker, en nummen følelse i munnen og brekninger kan sjelden (hos færre enn 1 av 1.000 brukere) forekomme ved bruk av Nicorette.

Følgende bivirkning kan svært sjelden (hos færre enn 1 av 10.000 brukere) forekomme: alvorlig overfølsomhetsreaksjon.

Frekvensen av følgende bivirkninger er ikke kjent: uklart syn, økt tåreflod, tørr hals, mage-tarmproblemer, smerter i leppene, stive muskler, kløende ødem i hud eller slimhinner, rødhet, anfall.

#### Rapportering av bivirkninger

Får du bivirkninger, kontakt din lege eller apotek. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i denne pakningsvedlegget. Du kan også rapportere bivirkninger via det norske Bivirkningssenteret (nettsted: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Ved å raperkingen til å melde fra, hjelper du oss med å få mer informasjon om sikkerheten til dette legemidlet.

## 5. Hvordan oppbevarer du dette legemidlet?

Oppbevares ved høyst 25°C.  
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet lenger etter endtførste utløpsdato. Du finner den på emballasjen 'EXP'. Der står det en måned og et år. Den siste dagen i den måneden er utløpsdatoen. Skyll ikke legemidler i vasken eller

toalettet og kast dem ikke i søppelbøtten. Spør og kast dem ikke i søppelbøtten. Spør apotek hva du skal gjøre med legemidler du ikke lenger bruker. Hvis apotek hva du skal gjøre med legemidler du ikke lenger bruker. Som Hvis du avhender legemidler på riktig måte, blir de destruert på en korrekt måte og havner ikke i miljøet.

## 6. Innhold i pakningen og ytterligere informasjon

Hvilke stoffer inneholder dette legemidlet?

Nicorette Sukkerfri 2 mg tyggegummi

- Det aktive stoffet i dette legemidlet er nikotin. Hver tyggegummi inneholder nikotinresinat, tilsvarende 2 mg nikotin.
- De andre stoffene i dette legemidlet er natriumbikarbonat (E500), vannfritt natriumkarbonat (E500), gummibase (inneholder BHT), sorbitolpulver (E420i), sorbitol 70% (E420ii), smakstilsetninger, glyserol 85% (E422) og talkum (E553b). Aroma pro fumendi (smakstilsetning) inneholder spor av etanol, cinnamal, cinnamylalkohol, citral, citronellol, eugenol, geraniol, isoeugenol, limonen, linalool. Nicorette Sukkerfri 4 mg tyggegummi

Det aktive stoffet i dette legemidlet er nikotin. Hver tyggegummi inneholder nikotinresinat, tilsvarende 4

- mg nikotin. mg nikotin.
- 85% (E422), fargestoffet kinolingult (E104) og talkum (E553b). Aroma pro fumendi (smakstilsetning) inneholder spor av etanol, cinnamal, cinnamylalkohol, citral, citronellol, eugenol, geraniol, isoeugenol, limonen, linalool. Nicorette Sukkerfri Freshfruit 2 mg tyggegummi Det aktive stoffet i dette legemidlet er nikotin. Hver tyggegummi inneholder nikotinresinat, tilsvarende 2 mg nikotin.

Nicorette Sukkerfri Freshfruit 2 mg tyggegummi

- 530), talkum (E553b) og nitrogen. Overflatebehandling: xylitol (E967), tuttifrutti QL84441, spraytørket akasie, titandioksid, karnaubavoks, hypromellose, sukralose, polysorbat 80 og rensset vann. Nicorette Sukkerfri Freshfruit 4 mg tyggegummi
- De andre stoffene i dette legemidlet er natriumbikarbonat (E500), vannfritt natriumkarbonat (E500), gummibase (inneholder BHT), xylitol (E967), peppermynnteolje, levomentol, kaliumacesulfam, lett magnesiumoksid (E530), talkum (E553b) og nitrogen. Drasjering: xylitol (E967), tuttifrutti QL84441, spraytørket akasie, titandioksid, karnaubavoks, hypromellose, sukralose, polysorbat 80 og rensset vann.

Nicorette Sukkerfri Freshfruit 4 mg tyggegummi

- Det aktive stoffet i dette legemidlet er nikotin. Hver tyggegummi inneholder nikotinresinat, tilsvarende 4 mg nikotin.

- De andre stoffene i dette legemidlet er vannfritt natriumkarbonat (E500), gummibase (inneholder BHT), xylitol (E967), peppermynteolje, levomentol, kalium acesulfam, kolloidalt magnesiumoksid (E530), fargestoffet kinolingult (E104), talkum (E553b) og nitrogen. Overflatebehandling: xylitol (E967), tuttifrutti QL84441, spraytørket akasie, titandioksid, karnaubavoks, fargestoffet kinolingult (E104) hypromellose, sukralose, polysorbat 80 og rensset vann.

(For tilleggsinformasjon om noen av ingrediensene, se avsnitt 2)

Hvordan ser Nicorette ut og hva inneholder en pakke?

Nicorette Sukkerfri 2 mg er en firkantet tyggegummi, beige i fargen.

Nicorette Sukkerfri 4 mg er en firkantet tyggegummi, gul i fargen.

Nicorette Sukkerfri Freshfruit 2 mg er en firkantet tyggegummi, med overflatebehandling, hvit i fargen.

Nicorette Sukkerfri Freshfruit 4 mg er en firkantet tyggegummi, med overflatebehandling, elfenben i fargen. Nicorette Sukkerfri 2 mg og 4 mg er tilgjengelig i esker med 30 eller 105 tyggegummier, i blisterpakning (Al/PVC/PVDC).

Nicorette Sukkerfri Freshfruit 2 mg og 4 mg er tilgjengelig i esker med 12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105,

Nicorette Sukkerfri Freshfruit 2 mg og 4 mg er tilgjengelig i esker med 12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105, 204 av 210 kaDet er mulig at ikke alle de nevnte pakningsstørrelsene blir

tilgjengelig på markedet. Innehaver av markedsføringstillatelsen

Innehaver av markedsføringstillatelsen bringe Kenvue Netherlands B.V.

Stadsplateau 27  
3521 AZ Utrecht

Produsent  
McNeil AB  
Norrbroplatsen 2  
251 09 Helsingborg  
Sverige

Numre på tillatelsen for å omsette bringe

Nicorette Sukkerfri 2 mg tyggegummi: RVG 09155

Nicorette Sukkerfri 4 mg tyggegummi: RVG 14228

Nicorette Sukkerfri Freshfruit 2 mg tyggegummi: RVG 32548

Nicorette Sukkerfri Freshfruit 4 mg tyggegummi: RVG 32549

Denne pakningsvedlegget er for det sist godkjent 12. mai 2025.