

Ulotka: informacja dla użytkownika

Nicorette® Bezczukrowa guma do żucia 2 mg
Nicorette® Bezczukrowa guma do żucia 4 mg
Nicorette® Bezczukrowa guma do żucia Freshfruit 2 mg
Nicorette® Bezczukrowa guma do żucia Freshfruit 4 mg

Nikotyna

Przeczytaj dokładnie całą ulotkę przed użyciem tego leku, ponieważ zawiera ważne informacje dla Ciebie.

Stosuj ten lek zawsze dokładnie tak, jak opisano w tej ulotce lub według zaleceń Twojego lekarza lub farmaceuty.

- Przechowuj dtę ulotkę. Może być potrzebna później.
- Masz jeszcze pytania? Skontaktuj się z twoim farmaceutą.
- Czy wystąpiły u Ciebie działania niepożądane wymienione w punkcie 4? A może wystąpiło działanie niepożądane, które nie jest wymienione w tej ulotce? Skontaktuj się ztwoim lekarzem lub farmaceutą. Czy nadal masz trudności z rzuceniem palenia po 6 miesiącach? Skontaktuj się z 6 miesięcy i nadal trudności z rzuceniem palenia? Skontaktuj się z lekarzem. Zawartość tej ulotki

Co to jest guma Nicorette i do czego jest stosowana?

1. Kiedy nie należy stosować tego
2. leku lub kiedy należy zachować szczególną ostrożność? Jak stosować ten lek?
3. Możliwe działania niepożądane
4. Jak przechowywać ten lek?
5. Jak przechowywać ten lek?
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest guma do żucia Nicorette i do czego jest stosowana?używana?

Nicorette to guma do żucia o smaku bez cukru z nikotyną jako substancją czynną.

Nikotyna w Nicorette należy do grupy środków odwykowych. Nicorette Bez Cukru 2 mg i Nicorette Bez Cukru Freshfruit 2 mg jest stosowana do zwalczania silnej potrzeby nikotyny, którą ludzie mogą odczuwać przy rzucaniu palenia lub przy zmniejszaniu, kiedy ta potrzeba jest bardzo silna, można użyć Nicorette Bez Cukru 4 mg i Nicorette Bez Cukru Freshfruit 4 mg.

Podczas żucia gumy nikotyna uwalnia się powoli i jest wchłaniana przez usta do organizmu. Ta nikotyna jest wystarczająca do zmniejszenia potrzeby palenia. W przeciwieństwie do dymu tytoniowego, Nicorette nie zawiera szkodliwej smoły ani tlenu węgla.

2. Kiedy nie należy stosować tego leku lub należy zachować szczególną ostrożność?

Kiedy nie należy stosować tego leku?

- Jesteś uczulony na którykolwiek ze składników tego leku. Składniki te można znaleźć w punkcie 6 tej ulotki.
- Masz poważną chorobę serca:
 - niedawny zawał serca;
 - zaburzenia rytmu serca;
 - uciskające, bolesne uczucie w klatce piersiowej (dławica piersiowa);
 - tak zwaną dławicę Prinzmetala.
- Niedawno miałeś udar mózgu (wylew).
- Masz stan zapalny w jamie ustnej, gardle lub przełyku.

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu tego leku?

Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą przed użyciem tego leku. Całkowicie przestań palić lub pal mniej, gdy zaczynasz stosować Nicorette.

Całkowicie przestań palić lub pal mniej, gdy zaczynasz używać Nicorette.

lekarz powinien ocenić, czy możesz stosować Nicorette: jeśli masz chorobę sercowo-naczyniową, taką jak niedawny

- jeśli masz chorobę sercowo-naczyniową, taką jak rezerwacja serca, niestabilna lub pogarszająca się dławica piersiowa, w tym dławica Prinzmetala, ciężkie zaburzenia rytmu serca, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze lub niedawny udar mózgu: zaleca się rzucenie palenia pod nadzorem bez terapii zastępczej nikotyną. Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą przed użyciem tego środka, jeśli masz dusznicę bolesną, jeśli niedawno przeszedłeś bypass lub angioplastykę tętnic wieńcowych, jeśli masz jakiegokolwiek inne zaburzenia serca lub jeśli masz chorobę naczyń krwionośnych.
- jeśli masz cukrzycę: wtedy poziom cukru we krwi musi być ściślej monitorowany.
- jeśli masz chorobę nerek i wątroby: istnieje ryzyko zwiększenia działań niepożądanych.
- jeśli masz guznadnerczy (pheochromocytoma) lub niekontrolowaną nadczynność tarczycy.
- jeśli masz choroby żołądkowo-jelitowe (zapalenie przełyku, wrzód żołądka lub dwunastnicy): nikotyna może nasilić twoje objawy.
- jeśli w przeszłości miałeś epilepsję lub napady.

Długotrwałe stosowanie Nicorette przez byłych palaczy jest odradzane, ponieważ nikotyna jest uważana za uzależniającą. Nikotyna jest substancją toksyczną, która okazuje się dobrze tolerowana być podczas terapii zastępczej nikotyną.

Jeśli masz protezę, żucie gumy może być problemem. Guma może przyklejać się do protezy i w rzadkich przypadkach ją uszkodzić.

Dzieci i młodzież do 18 lat

Nicorette nie powinno być podawane osobom poniżej 18 roku życia bez recepty lekarza.

Nicorette powinno być przechowywane poza zasięgiem dzieci być trzymane.

Niebezpieczeństwo dla dzieci: dawki nikotyny tolerowane przez palaczy mogą powodować u dzieci poważne objawy zatrucia i być śmiertelne. Produkty z nikotyną nie powinny być przechowywane w miejscach, gdzie mogą być używane lub spożywane przez dzieci.

Czy używasz innych leków?

Czy używasz innych leków oprócz Nicorette, czy robiłeś to niedawno lub zamierzasz to zrobić wkrótce? Powiedz o tym swojemu lekarzowi lub farmaceutce. Dotyczy to również leków, które można dostać bez recepty.

Palenie może przyspieszyć wydalanie niektórych leków przez organizm. Zaprzymanie palenia, z nikotynową terapią zastępczą lub bez niej, może zmienić reakcję byłych palaczy na jednocześnie stosowane leki. Na przykład, gdy stosujesz leki takie jak teofilina (lek stosowany w astmie), takryna (lek stosowany w chorobie Alzheimera), klozapina lub olanzapina (leki stosowane w schizofrenii), ropinirol (lek stosowany w chorobie Parkinsona), imipramina, klomipramina lub fluwoksamina (leki stosowane w depresji), flekainid (lek stosowany przy nieregularnym rytmie serca) lub pentazocyna (silny środek przeciwbólowy), zaprzestanie palenia może prowadzić do zwiększenia ilości leku we krwi. Ciąża, karmienie piersią i płodność

Czy jesteś w ciąży, podejrzewasz ciążę, chcesz zajść w ciążę lub karmisz piersią? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą przed użyciem tego leku. Cięża Nikotyna

może

Nikotyna zaprzestanie palenia, gdy jesteś w ciąży, w szczególności mieć wpływ na nienarodzone dziecko. Należy całkowicie pierwszym trymestrze. Zestanie palenia podczas ciąży, w przypadku kurkeur zonder gebruik van nikotynowych środków zastępczych. Dlatego nie należy stosować Nicorette w czasie ciąży, z wyjątkiem kobiet, które nie mogą rzucić palenia bez terapii zastępczej nikotyną. Niebezpieczeństwo kontynuowania palenia podczas ciąży może stanowić większe ryzyko dla nienarodzonego dziecka niż stosowanie produktów zastępczych nikotyny pod nadzorem specjalisty. Skonsultuj się najpierw z swoim lekarzem, jeśli chcesz używać Nicorette w czasie ciąży.

Karmienie piersią Nikoty

na przenika do mleka matki. Może to wpływać na niemowlę. Dlatego należy unikać stosowania nikotyny podczas karmienia piersią. Niebezpieczeństwo kontynuowania palenia może stanowić większe ryzyko dla dziecka niż stosowanie produktów zastępczych nikotyny w programie rzucania palenia pod nadzorem. Jeśli jesteś silnie uzależniona od nikotyny i chcesz karmić piersią, stosowanie Nicorette powinno odbywać się wyłącznie na zalecenie twojego lekarza. Nicorette guma do żucia powinna być używana tak szybko jak to możliwe po karmieniu. Czas między użyciem gumy Nicorette a karmieniem piersią powinien być jak najdłuższy. Najbardziej możliwe jest i w każdym razie nie mniej niż 2 do 3 godzin. Ponadto siła używanej Nicorette guma do żucia powinna być jak najniższa być. są.

Płodność

Zarówno u kobiet jak i u mężczyzn palenie zwiększa ryzyko niepłodności. U ludzi i zwierząt wykazano, że nikotyna ma negatywny wpływ na jakość nasienia. U zwierząt wykazano również zmniejszoną płodność.

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Nicorette nie ma lub ma znikomą wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Nicorette Gum do żucia Nicorette Bez Cukru 2 mg i Nicorette Bez Cukru 4 mg zawierają sorbitol (E420). Nicorette Bez Cukru 2 mg zawiera 190 mg sorbitolu na gumę do żucia, a Nicorette Bez Cukru 4 mg zawiera 179 mg sorbitolu na gumę do żucia. Sorbitol jest źródłem fruktozy. Lekarz poinformował Cię, że twój lekarz poinformował cię, że jeśli nie tolerujesz niektórych cukrów lub jeśli stwierdzono u ciebie dziedziczną nietolerancję fruktozy (rzadka dziedziczna choroba, w której osoba nie może rozkładać fruktozy), skontaktuj się z lekarzem przed podaniem tego leku.

corette 2 mg i 4 mg zawierają aromaty z cynamalem, alkoholem cynamyłowym, citralem, citronellolem, eugenolem, geraniolem, izoeugenolem, limonenem, corette 2 mg i 4 mg zawierają substancje smakowe z cynamalem, alkoholem cynamyłowym, citralem, citronellolem, eugenolem, geraniolem, izoeugenolem, limonenem, linalol. Te substancje mogą powodować reakcje alergiczne.

Nicorette Bez Cukru 2 mg i 4 mg guma do żucia zawiera 0,616 mg alkoholu (etanolu) na gumę do żucia. W tym leku znajduje się niewielka ilość alkoholu. Jest to tak mało, że niczego nie zauważysz.

Nicorette Bez Cukru i Nicorette Bez Cukru Freshfruit zawierają mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na gumę do żucia, co oznacza, że są w zasadzie 'bez sodu'.

Podstawa gumy zawiera butylohydroksytoluen (E321), przeciwutleniacz. Ta substancja pomocnicza może miejscowo powodować reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

3. Jak stosować ten lek?

Zawsze stosuj ten lek dokładnie tak, jak opisano w tej ulotce lub zgodnie z twoim lekarzem lub farmaceutą. Masz wątpliwości co do prawidłowego stosowania? Skontaktuj się z twoim lekarzem lub farmaceutą.

RZUCANIE PALENIA

1. Przestań całkowicie palić od pierwszego dnia.
2. Weź jedną gumę Nicorette, gdy poczujesz potrzebę do palenia. Silnie uzależnionym palaczom zaleca się początkowo stosowanie Nicorette Bez Cukru (Freshfruit) 4 mg używać (maksymalnie 14 gum do żucia dziennie). Inni palacze powinni stosować gumę do żucia 2 mg używać (maksymalnie 14 gum do żucia dziennie).
3. Żuj powoli, z regularnymi przerwami.
Po około 30 minutach żucia z przerwami cała dostępna nikotyna z gumy do żucia zostaje uwolniona. Efekty nikotyny odczuwalne są dopiero po kilku minutach; szybkiego zaspokojenia, jakie występuje podczas palenia, nie można się więc spodziewać.
Należy unikać spożywania kwaśnych napojów, takich jak kawa czy napoje gazowane, przez 15 minut przed i podczas żucia. Te napoje wpływają na wchłanianie nikotyny w jamie ustnej.
Powolne żucie sprzyja optymalnemu wchłanianiu nikotyny przez błonę śluzową jamy ustnej. Połykanie śliny powinno być więc ograniczone do minimum.
4. Nicorette ma specjalny intensywny smak, który na początku może wydawać się dziwny. może się wydawać. Szybko się do niego przyzwyczaisz.
5. Ryzyko ponownego rozpoczęcia palenia jest najwyższe w ciągu pierwszych 3 do 4 miesięcy. Nie przerywaj stosowania Nicorette zbyt szybko w tym krytycznym okresie.
6. Nicorette może tylko pomóc. Ostateczne rzucenie palenia zawsze będzie wymagało Twojego osobistego zaangażowania. Porady i wsparcie zwiększają szansę na sukces.
7. Upewnij się, że zawsze masz przy sobie kilka gum do żucia w kieszeni.
Umieść je we wszystkich miejscach, gdzie wcześniej Twoje papierosy przechowywane.
8. Stopniowo zmniejszaj liczbę gum do żucia na dzień.

Czas trwania leczenia jest indywidualny. Zaleca się po leczeniu trwającym około trzech miesięcy, stopniowo zmniejszać stosowanie Nicorette. Gdy używasz dziennie tylko 1-2 gumy, możesz przerwać leczenie. Nieprzerwanestosowanie Nicorette przez więcej niż jeden rok nie jest zalecane.

9. Trzymaj kilka zapasowych gum do żucia w kieszeni ponieważ pragnienie palenia może nagle powrócić.
10. Informuj swojego farmaceutę lub lekarza regularnie. Mogą oni udzielić ci porady.

MNIEJ PALENIA

1. Zastąp jak najwięcej swojego papierosa gumą do żucia.
Guma do żucia powinna być używana, gdy tylko pojawi się potrzeba na do palenia, aby okres bez dymu był jak najdłuższy. Dzięki temu liczba papierosów zostaje zredukowana.
Silnie uzależnionym palaczom zaleca się początkowo stosowanie Nicorette Bez Cukru (Freshfruit) 4 mg do użycia (maksymalnie 14 gum do żucia dziennie). Innym palaczom zaleca się gumę do żucia 2 mg do użycia (maksymalnie 14 gum do żucia dziennie).
2. Żuj powoli, z regularnymi przerwami.
Po około 30 minutach żucia z przerwami cała dostępna nikotyna z gumy do żucia zostaje uwolniona. Efekty nikotyny zauważysz dopiero po kilku minutach; szybkiego zaspokojenia, jak przy paleniu, nie można się spodziewać.
Należy unikać spożywania kwaśnych napojów, takich jak kawa czy napoje gazowane, przez 15 minut przed i podczas żucia. Te napoje wpływają na wchłanianie nikotyny w jamie ustnej.
Powolne żucie sprzyja optymalnemu wchłanianiu nikotyny przez błonę śluzową jamy ustnej. Połykanie śliny należy więc ograniczyć do minimum.
3. Nicorette ma specjalny intensywny smak, który na początku może wydawać się dziwny może się wydawać. Szybko się do niego przyzwyczaisz.
4. Zmniejsz zużycie papierosów aż do całkowitego możesz przestać.
5. Nicorette może tylko pomóc. Ostateczne rzucenie palenia zawsze będzie wymagać twojego osobistego zaangażowania. Porady i wsparcie zwiększają szansę na sukces.
6. Upewnij się, że zawsze masz kilka gum do żucia w kieszeni .
Umieść je we wszystkich miejscach, gdzie wcześniej twoje papierosy były przechowywane.
7. Stopniowo zmniejszaj liczbę gum do żucia dziennie.
Kiedy używasz już tylko 1-2 gumy dziennie, możesz zakończyć leczenie.
8. Trzymaj kilka zapasowych gum do żucia w torbie ponieważ pragnienie palenia może nagle powrócić.
9. Informuj swojego farmaceutę lub lekarza regularnie. Mogą oni udzielić ci porady.

Stosuj u dzieci i młodzieży do 18 roku życia

Nicorette nie może być podawane osobom poniżej 18 roku życia bez recepty lekarskiej.

Czy użyłeś zbyt dużo tego środka?

Jeśli zamierzasz używać Nicorette, powinieneś całkowicie przestać palić lub zmniejszyć palenie. Objawy przedawkowania mogą wystąpić, gdy żujesz dużą ilość gum jednocześnie lub bardzo szybko po sobie, lub gdy podczas stosowania Nicorette nadal palisz. Ryzyko zatrucia w wyniku połknięcia gumy jest małe, ponieważ wchłanianie w organizmie bez żucia jest powolne i niekompletne.

Objawy przedawkowania to silny ból głowy, zawroty głowy, ból brzucha, nudności, wymioty, ślinotok, biegunka, pocenie się, osłabienie słuchu i osłabienie. Przy wysokich dawkach objawy te mogą być następnie zbyt niskie ciśnienie krwi, słabe i onzasięgnąć porady medycznej swojego lekarza lub na oddziale ratunkowym bądź w centrum informacji toksykologicznej (telefon: 112). Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dawki nikotyny tolerowane przez dorosłych palaczy podczas leczenia mogą powodować poważne objawy zatrucia u dzieci i mogą być śmiertelne. Czy zapomniałeś użyć tego leku

zbyt używać? Nie stosuj podwójnej dawki aby nadrobić pominiętą dawkę. Masz inne pytania dotyczące stosowania tego leku? Skontaktuj się z

Masz jeszcze inne pytania dotyczące stosowania tego leku? Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. 4.

4. Możliwe działania niepożądane?

Jak każdy lek może również ten lek powodować działania niepożądane. Nie każdy ich doświadcza. mieć do czynienia.

Podczas rzucania palenia mogą wystąpić pewne objawy, takie jak depresyjny nastrój, bezsenność, drażliwość, frustracja lub złość, lęk, trudności z koncentracją, niepokój lub niecierpliwość, spowolniona akcja serca, zwiększony apetyt lub przyrost masy ciała, zawroty głowy, kaszel, zaparcia, krwawiące dziąsła lub afty, lub przeziębienie. Ponadto pragnienie nikotyny prowadzić do silnej potrzeby palenia.

Większość działań niepożądanych występuje w ciągu pierwszych trzech do czterech tygodni leczenia. Działania niepożądane zależą od ilości, którą stosujesz, i są wynikiem niewłaściwej techniki żucia lub efektów nikotyny. Gdy zbyt szybko żujesz, Nicorette może początkowo podrażniać usta lub gardło lub powodować czkawkę lub nudności. Reakcje alergiczne rzadko występują przy stosowaniu nikotyny.

Następujące działania niepożądane mogą występować bardzo często (u więcej niż 1 na 10 użytkowników):
ból głowy, kaszel, czkawka, nudności, bolesne usta i gardło, podrażnienie gardła.

Następujące działania niepożądane mogą występować często (u mniej niż 1 na 10 użytkowników): ból brzucha, biegunka, suchość w ustach, zaburzenia trawienia, wzdęcia, nadmiar śliny, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wymioty, pieczenie w ustach, zmęczenie, nadwrażliwość, zaburzenia smaku, mrowienie. Guma do żucia może przyklejać się do protezy i, w rzadkich przypadkach, ją uszkadzać.

Następujące działania niepożądane mogą czasami (u mniej niż 1 na 100 użytkowników) występować: kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, odbijanie, zapalenie języka, pęcherze i łuszczenie się błony śluzowej jamy ustnej, zmniejszona wrażliwość w ustach, ogólna słabość ciała, nieprzyjemne uczucie i ból w klatce piersiowej, dyskomfort, ból szczęki (sztywna szczęka), nietypowe sny, zwężenie dróg oddechowych, chrypka, duszność, zatkały nos, ból gardła, kichanie, zacisnięte gardło, pocenie się, swędzenie, wysypka, wysypka z intensywnym

swędzeniem i tworzeniem się grudek (pokrzywka lub urticaria), zaczerwienienie, podwyższone ciśnienie krwi. Zaburzenia połykania, uczucie drętwienia w ustach i odruchy wymiotne mogą rzadko (u mniej niż 1 na 1.000 użytkowników) występować przy stosowaniu Nicorette.

Następujące działanie niepożądane

może bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10.000 użytkowników) występować: ciężka reakcja nadwrażliwości. bardzo rzadki Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią działania niepożądane, skontaktuj się z

swoim lekarzem lub farmaceutą. Dotyczy to również działań niepożądanych, które nie są wymienione w tej ulotce. Możesz również zgłaszać działania niepożądane za pośrednictwem Holenderskiego Centrum Działań Niepożądanych (strona internetowa: www.lareb.nl). Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można pomóc w uzyskaniu więcej informacji na temat bezpieczeństwa tego leku. erkingen do zgłoszenie pomaga nam uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa tego leku.

5. Jak przechowywać ten lek?

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po zakończeniu daty ważności. Znajdziesz ją na opakowaniu 'EXP'. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie wyrzucaj leków do kanalizacji ani do

toalety i nie wrzucaj ich do kosza na śmieci. Zapytaj swojego farmaceutę, co zrobić z lekami, których już nie używasz. Jeśli farmaceuto co zrobić z lekami, których już nie używasz. Jeśli jeśli leki są prawidłowo usuwane, są one właściwie niszczone i nie trafiają do środowiska.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Jakie substancje zawiera ten lek?

Nicorette Bez Cukru 2 mg guma do żucia

- Substancją czynną w tym leku jest nikotyna. Każda guma do żucia zawiera nikotynian, odpowiadający 2 mg nikotyny.
- Inne substancje w tym leku to wodorowęglan sodu (E500), bezwodny węglan sodu (E500), baza gumowa (zawiera BHT), proszek sorbitolu (E420i), sorbitol 70% (E420ii), aromaty, glicerol 85% (E422) i talk (E553b). Aromat pro fumendi (aromat) zawiera śladowe ilości etanolu, cynamalu, alkohol cynamylowy, cytral, cytronellol, eugenol, geraniol, izoeugenol, limonen, linalol.

Nicorette Bez Cukru 4 mg guma do żucia

- Substancją czynną w tym leku jest nikotyna. Każda guma do żucia zawiera nikotynian, odpowiadający 4 mg nikotyny.

- Inne substancje w tym leku to bezwodny węglan sodu (E500), baza gumowa (zawiera BHT), proszek sorbitolu (E420i), sorbitol 70% (E420ii), aromaty, glicerol 85% (E422), barwnik żółcień chinolinowa (E104) i talk (E553b). Aromat pro fumendi (aromat) zawiera śladowe ilości etanolu, cynamalu, alkohol cynamylowy, cytral, cytronellol, eugenol, geraniol, izoeugenol, limonen, linalol.

Nicorette Bez Cukru Freshfruit 2 mg guma do żucia

- Substancją czynną w tym leku jest nikotyna. Każda guma do żucia zawiera nikotynian, odpowiadający 2 mg nikotyry.
- Inne substancje w tym leku to wodorowęglan sodu (E500), bezwodny węglan sodu (E500), baza gumowa (zawiera BHT), ksylitol (E967), olejek miętowy, lewomentol, acesulfam potasu, tlenek magnezu lekki (E530), talk (E553b) i azot. Powłoka: ksylitol (E967), tutti-frutti QL84441, akacja suszona, dwutlenek tytanu, wosk carnauba, hypromeloza, sukraloza, polisorbata 80 i woda oczyszczona.

Nicorette Bez Cukru Freshfruit 4 mg guma do żucia

- Substancją czynną w tym leku jest nikotyna. Każda guma do żucia zawiera nikotynoresynian, odpowiadający 4 mg nikotyry.
- Inne substancje w tym leku to bezwodny węglan sodu (E500), baza gumowa (zawiera BHT), ksylitol (E967), olejek miętowy, lewomentol, kalium acesulfam, tlenek magnezu koloidalny (E530), barwnik żółcień chinolinowa (E104), talk (E553b) i azot. Powłoka: ksylitol (E967), tutti-frutti QL84441, akacja suszona, dwutlenek tytanu, wosk carnauba, barwnik żółcień chinolinowa (E104) hypromelloza, sukraloza, polisorbata 80 i woda oczyszczona.

(Dla dodatkowych informacji o niektórych składnikach patrz punkt 2)

Jak wygląda Nicorette i co zawiera opakowanie?

Nicorette Bez Cukru 2 mg to kwadratowa guma do żucia, w kolorze beżowym.

Nicorette Bez Cukru 4 mg to kwadratowa guma do żucia, w kolorze żółtym.

Nicorette Bez Cukru Freshfruit 2 mg to kwadratowa guma do żucia, z powłoką, w kolorze białym.

Nicorette Bez Cukru Freshfruit 4 mg to kwadratowa guma do żucia, z powłoką, w kolorze

kości słoniowej. Nicorette Bez Cukru 2 mg i 4 mg są dostępne w pudełkach po 30 lub 105 gum do żucia, w opakowaniach blistrowych (Al/PVC/PVDC).

Nicorette Bez Cukru Freshfruit 2 mg i 4 mg są dostępne w pudełkach po 12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105,

Nicorette Bez Cukru Freshfruit 2 mg i 4 mg są dostępne w opakowaniach po 12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105, 204 of 210 kasprzedaży.

Hodowca pozwolenia na wprowadzenie do obrotu handel zostaną przyniesione.

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wprowadzenie Kenvue Netherlands B.V.

Stadsplateau 27
3521 AZ Utrecht

Producent
McNeil AB
Norrbroplatsen 2

251 09 Helsingborg
Szwecja

Numery zezwoleń na dopuszczenie do obrotu wprowadzenie

Nicorette Bez Cukru 2 mg guma do żucia: RVG 09155

Nicorette Bez Cukru 4 mg guma do żucia: RVG 14228

Nicorette Bez Cukru Freshfruit 2 mg guma do żucia: RVG 32548

Nicorette Bez Cukru Freshfruit 4 mg guma do żucia: RVG 32549

Ta ulotka została zatwierdzona ostatnio w dniu 12 maja 2025.

Transtoyou