

## Prospect: informații pentru utilizator

Nicorette® Gumă de mestecat fără zahăr 2 mg  
Nicorette® Gumă de mestecat fără zahăr 4 mg  
Nicorette® Gumă de mestecat fără zahăr Freshfruit 2 mg  
Nicorette® Gumă de mestecat fără zahăr Freshfruit 4 mg

### Nicotină

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a utiliza acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați acest medicament întotdeauna exact așa cum este descris în acest prospect sau conform indicațiilor medicului sau farmacistului dumneavoastră.

- Păstrați dacest prospect. Poate veți avea nevoie de el mai târziu.
- Aveți întrebări? Contactați dumneavoastră farmacistul.
- Aveți reacții adverse menționate la punctul 4? Sau aveți o reacție adversă care nu este menționată în acest prospect? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.
- Întâmpinați după 6 luni încă dificultăți în a renunța la fumat? Contactați medicul dumneavoastră.

### Conținutul acestui prospect

1. Ce este guma de mestecat Nicorette și pentru ce se utilizează acest medicament?
2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau când trebuie să fiți deosebit de atent?
3. Cum se utilizează acest medicament?
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează acest medicament?
6. Conținutul ambalajului și alte informații

### 1. Ce este guma de mestecat Nicorette și pentru ce se utilizează acest medicament?utilizat?

Nicorette este o gumă de mestecat fără zahăr, cu aromă, care conține nicotină ca substanță activă.

Nicotina din Nicorette aparține grupului de medicamente pentru sevraj. Nicorette Fără Zahăr 2 mg și Nicorette Fără Zahăr Freshfruit 2 mg sunt utilizate pentru a combate nevoia puternică de nicotină pe care o pot avea oamenii atunci când renunță la fumat sau reduc fumatul. Când această nevoie este foarte puternică, puteți folosi Nicorette Fără Zahăr 4 mg și Nicorette Fără Zahăr Freshfruit 4 mg. Când mestecați guma, nicotina este eliberată lent și este absorbită în organism prin gură. Această

nicotină este suficientă pentru a reduce nevoia de a fuma. Spre deosebire de fumul de tutun, Nicorette nu conține gudron sau monoxid de carbon dăunător. nevoia de a fuma să fie redusă. Spre deosebire de fumul de tutun, Nicorette nu conține gudron sau monoxid de carbon nociv.

### 2. Când nu trebuie să utilizați acest

medicament? nu utilizați medicamentul?

- Sunteți alergic la una dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe le puteți găsi în secțiunea 6 a acestui prospect.
- Aveți o afecțiune cardiacă gravă:
  - un infarct miocardic recent;
  - aritmii cardiace;
  - o senzație de apăsare, durere în piept (angina pectorală); pe piept (angina pectorală);
  - așa-numită angină Prinzmetal. Ați avut recent un accident vascular cerebral (AVC).
- Aveți o inflamație în gură, gât sau esofag.
- Când trebuie să fiți deosebit de precaut cu acest medicament?

Luați legătura cu

Luați cocontactați Medicul dumneavoastră trebuie să evalueze dacă puteți utiliza Nicorette: medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament.

Opriti complet fumatul sau fumați mai puțin când începeți să utilizați Nicorette.

Dvs. medicul trebuie să evalueze dacă puteți utiliza Nicorette:

- dacă aveți o boală cardiovasculară, cum ar fi un reinfarct miocardic, angină pectorală instabilă sau agravată, inclusiv angina Prinzmetal, aritmii cardiace severe, hipertensiune necontrolată sau un accident vascular cerebral recent sau în trecut: de preferință, ar trebui să renunțați la fumat sub supraveghere fără terapie de substituție cu nicotină. Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament dacă suferiți de angină pectorală, dacă ați avut recent un bypass sau dilatare cu balon a arterelor coronare, dacă aveți orice altă tulburare cardiacă sau dacă aveți o afecțiune a vaselor de sânge. dacă aveți o afecțiune a vaselor de sânge.
- aveți diabet zaharat: nivelul glicemiei trebuie monitorizat mai atent. dacă aveți diabet: atunci nivelul glicemiei dumneavoastră trebuie monitorizat mai atent.
- aveți o afecțiune renală și hepatică: există riscul de creștere a efectelor secundare. dacă aveți o afecțiune renală și hepatică: există un risc de creștere a efectelor secundare.
- aveți o tumoare a aveți o tumoare o afecțiune a glandelor suprarenale (feocromocitom) sau o activitate necontrolată crescută a glandei tiroide.
- aveți afecțiuni gastro-intestinale (inflamația esofagului, ulcer gastric sau duodenal): nicotina poate agrava simptomele. aveți afecțiuni gastrointestinale (inflamația esofagului, ulcer gastric sau duodenal): nicotina poate agrava simptomele dumneavoastră.
- ați avut în trecut epi lepsie sau convulsii. Utilizarea prelungită a Nicorette de către foștii fumători nu este recomandată, deoarece nicotina

este considerată a fi dependentă. Nicotina este o substanță toxică, care pare a fi bine tolerată de este considerată a fi dependentă. Nicotina este o substanță toxică, care se pare că este bine tolerată organism. în timpul terapiei de substituție cu nicotină.

Dacă aveți o proteză dentară, mestecarea gumei poate fi o problemă. Guma poate să se lipească de proteză și, în cazuri rare, să o deterioreze.

Copii și tineri până la 18 ani

Nicorette nu trebuie să fie administrat persoanelor sub 18 ani fără prescripție medicală.

Nicorette trebuie păstrat departe de accesul copiilor să fie păstrat. Pericol pentru copii: dozele de nicotină tolerate de fumători pot provoca simptome grave de intoxicație la copii și pot fi fatale. Produsele cu nicotină nu trebuie păstrate în locuri unde pot fi manipulate sau ingerate de copii.

Utilizați și alte medicamente?

Utilizați pe lângă Nicorette și alte medicamente, ați făcut-o recent sau intenționați să o faceți în curând? Spuneți astamedicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest lucru este valabil și pentru medicamentele pe care le puteți obține fără prescripție medicală. medic sau farmacist. Acest lucru este valabil și pentru medicamentele pe care le puteți obține fără prescripție medicală.

Fumat poate elimina unele medicamente din organism. Oprirea fumatului, cu sau fără înlocuire cu nicotină, poate schimba reacția foștilor fumători la medicamentele utilizate concomitent. De exemplu, atunci când utilizați medicamente precum teofilina (utilizată în astm), tacrina (utilizată în boala Alzheimer), clozapina sau olanzapina (utilizate în schizofrenie), ropinirolul (utilizat în boala Parkinson), imipramina, clomipramina sau fluvoxamina (utilizate în depresie), flecainida (utilizată în aritmie cardiacă) sau pentazocina (analgezic puternic), oprirea fumatului poate duce la o creștere a cantității de medicament în sângele dumneavoastră. Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Sunteți gravidă, credeți că sunteți gravidă

sau doriți să rămâneți gravidă sau alăptați? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră înainte de a utiliza acest medicament. Sarcina Nicotina medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament.

Sarcină

Nicotină poate avea un efect asupra fătului nenăscut. Trebuie să fiți complet te renunțați la fumat când sunteți gravidă, în caz defără utilizarea de mijloace de înlocuire a nicotinei. Prin urmare, nu trebuie să utilizați Nicorette în timpul sarcinii, cu excepția femeilor care nu pot renunța la fumat fără terapie de înlocuire a nicotinei. Pericolul de a continua să fumați în timpul sarcinii poate reprezenta un risc mai mare pentru fătul nenăscut decât utilizarea produselor de înlocuire a nicotinei sub supraveghere de specialitate. Consultați mai întâi medicul dacă doriți să utilizați Nicorette în timpul sarcinii.

Alăptare

Nicotinele trec în laptele matern. Este posibil ca sugarul să fie afectat de aceasta. De aceea, trebuie să evitați utilizarea nicotinei atunci când alăptați. Pericolul de a continua să fumați poate reprezenta un risc mai mare pentru copil decât utilizarea produselor de înlocuire a nicotinei într-un program de renunțare la fumat sub supraveghere. Dacă sunteți foarte dependent de nicotină și doriți să alăptați, utilizarea Nicorette trebuie să se facă doar la recomandarea medicului dumneavoastră. Guma de mestecat Nicorette trebuie utilizată cât mai curând posibil după alăptare. Timpul dintre utilizarea gumei de mestecat Nicorette și alăptare trebuie să fie cât mai scurtă posibil. Utilizarea gumei de mestecat Nicorette și alăptarea trebuie să fie cât mai lung posibil să fie și în orice caz nu mai puțin de 2 până la 3 ore. De asemenea, concentrația gumei de mestecat Nicorette utilizată trebuie să fie cât mai scăzută. Nicorette gumă de mestecat cât mai scăzută a fie.

Fertilitate

Atât la femei cât și la bărbați, fumatul crește riscul de infertilitate. La oameni și la animale s-a demonstrat că nicotina are efecte negative asupra calității spermei. La animale s-a

demonstrat, de asemenea, o fertilitate redusă. calitatea spermei. La animale s-a demonstrat, de asemenea, o fertilitate redusă.

Capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Nicorette nu are sau are o influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Nicorette Gumă de mestecat conține 2 mg și Nicorette Fără Zahăr 4 mg conțin sorbitol (E420). Nicorette Fără Zahăr 2 mg conține 190 mg sorbitol per gumă de mestecat și Nicorette Fără Zahăr 4 mg conține 179 mg sorbitol per gumă de mestecat. Sorbitolul este o sursă de fructoză. medicul dumneavoastră v-a informat că nu tolerați anumite zaharuri sau dacă vi s-a diagnosticat intoleranță ereditară la fructoză (o afecțiune ereditară rară în care o persoană nu poate descompune fructoza), contactați medicul dumneavoastră înainte de a vi se administra acest medicament. medicul dumneavoastră v-a informat că corette 2 mg și 4 mg conțin arome cu cinamal, alcool cinamilic, citral, citronelol, eugenol, geraniol, izoeugenol, limonen, linalool. corette 2 mg și 4 mg conțin arome cu cinamal, alcool cinamilic, citral, citronelol, eugenol, geraniol, izoeugenol, limonen, linalool. Aceste substanțe pot provoca reacții alergice. Nicorette Fără Zahăr 2 mg și 4 mg gumă de mestecat conțin 0,616 mg alcool (etanol) per gumă de mestecat. Există o cantitate mică de alcool în acest medicament. Este atât de puțin încât nu veți observa nimic.

Nicorette Fără Zahăr și Nicorette Fără Zahăr Freshfruit conțin mai puțin de 1 mmol sodiu (23 mg) per gumă de mestecat, ceea ce înseamnă că este practic 'fără sodiu'.

Baza de gumă conține butilhidroxitoluen (E321), un antioxidant. Această excipientă poate local provoca reacții cutanate (de exemplu, dermatită de contact) sau iritații la nivelul ochilor și mucoaselor.

### 3. Cum se utilizează acest medicament?

Utilizați acest medicament întotdeauna exact așa cum este indicat în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Aveți îndoieli cu privire la utilizarea corectă? Atunci contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

### ÎNCETAREA FUMATULUI

1. Opriți-vă complet din fumat din prima zi.
2. Luați o gumă de mestecat Nicorette când simțiți nevoia pentru a fuma. Fumătorilor puternic dependenți li se recomandă inițial Nicorette Fără Zahăr (/Freshfruit) 4 mg a utiliza (maxim 14 gume pe zi). Altor fumători li se recomandă guma de 2 mg a utiliza (maxim 14 gume pe zi).
3. Mestecați încet, cu pauze regulate.  
După aproximativ 30 de minute de mestecat cu pauze, toată nicotina disponibilă din gumă este eliberată. Efectele nicotinei le veți simți abia după câteva minute; satisfacția rapidă care apare la fumat nu o puteți aștepta.  
Consumul de băuturi acide precum cafeaua sau băuturile răcoritoare trebuie evitat cu 15 minute înainte și în timpul mestecării. Aceste băuturi influențează absorbția nicotinei în cavitatea bucală.

Mestecatul lent favorizează o absorbție optimă a nicotinei prin mucoasa bucală.

Înghițirea salivei trebuie deci redusă la minimum.

4. Nicorette are un gust special puternic, care la început poate părea ciudat poate părea. Vă veți obișnui rapid.
5. Riscul de a începe din nou să fumezi, este cel mai mare în primele 3 până la 4 luni. Nu opriți utilizarea Nicorette prea repede în această perioadă critică.
6. Nicorette poate doar să ajute. Renunțarea definitivă la fumat va necesita întotdeauna implicarea dumneavoastră personală. Consilierea și sprijinul îmbunătățesc șansa de succes.
7. Asigurați-vă că aveți întotdeauna câteva gume de mestecat la îndemână . Puneți-le în toate locurile unde obișnuiți să vă sigarete păstrate.
8. Reduceți treptat numărul de gume de mestecat pe zi. Durata tratamentului este individuală. Se recomandă după un tratament de aproximativ trei luni, utilizarea Nicorette să fie redusă treptat. Când folosiți zilnic doar 1-2 gume de mestecat, puteți opri tratamentul. Utilizarea neîntreruptă a Nicorette pe timpul utilizării Nicorette în timpul fumatului mult de un an nu este recomandată. Păstrați câteva gume de mestecat de rezervă la
9. dumneavoastră deoarece dorința de a fuma poate reveni brusc. Țineți
10. farmacistul sau medicul dumneavoastră la curent în mod regulat. Ei vă pot oferi sfaturi. FUMAT MAI PUȚIN Înlocuiți cât mai mult posibil

țigara dumneavoastră cu o gumă de mestecat.

1. Guma de mestecat trebuie utilizată imediat ce apare dorința de a fuma. Guma de mestecat trebuie utilizată imediat ce apare o dorință mg să fumeze și astfel să mențină perioada fără fumat cât mai lungă posibil. Acest lucru reduce numărul de țigări. Fumătorilor puternic dependenți li se recomandă inițial Nicorette Fără Zahăr (Freshfruit) 4 mg să utilizeze (maxim 14 gume pe zi). Altor li se recomandă guma de 2 mg să utilizeze (maxim 14 gume pe zi).
2. Mestecați încet, cu pauze regulate. După aproximativ 30 de minute de mestecat cu pauze, toată nicotina disponibilă din gumă este eliberată. Efectele nicotinei le veți simți abia după câteva minute; satisfacția rapidă ca în cazul fumatului nu o puteți aștepta. Consumul de băuturi acide precum cafeaua sau băuturile răcoritoare trebuie evitat cu 15 minute înainte și în timpul mestecării. Aceste băuturi influențează absorbția nicotinei în cavitatea bucală. Mestecarea lentă favorizează o absorbție optimă a nicotinei prin mucoasa bucală. Înghițirea salivei trebuie deci redusă la minimum.
3. Nicorette are un gust special puternic, care la început poate părea ciudat. Vă veți obișnui repede. Reduceți
4. Reduce consumul de țigări până când renunțați complet poate să renunțați.
5. Nicorette poate doar să ajute. Renunțarea definitivă la fumat va cere întotdeauna implicarea personală. Consilierea și sprijinul îmbunătățesc șansa de succes.
6. Asigurați-vă că aveți întotdeauna câteva gume de mestecat la îndemână . Puneți-le în toate locurile unde obișnuiți să păstrați țigările dumneavoastră.
7. Reduceți treptat numărul de gume de mestecat pe zi. Când folosiți zilnic doar 1-2 gume de mestecat, puteți opri tratamentul.
8. Păstrați câteva gume de rezervă la sac lavăzut că dorința de a fuma poate reveni brusc.
9. Păstrați vostru farmacistul sau medicul la curent în mod regulat. Ei vă pot oferi sfaturi.

Utilizați la copii și adolescenți până la 18 ani

Nicorette nu trebuie administrat persoanelor sub 18 ani fărăprescripție medicală de la un medic.

Ați utilizat prea mult din acest medicament?

Dacă utilizați Nicorette, trebuie să opriți complet fumatul sau să reduceți fumatul. Simptomele unei supradoze pot apărea atunci când mestecați un număr mare de gume deodată sau foarte rapid una după alta, sau când continuați să fumați complet în timp ce utilizați Nicorette. Riscul de intoxicație ca urmare a înghițirii gumei este mic, deoarece absorbția în organism fără mestecare este lentă și incompletă.

Simptomele supradozajului sunt dureri de cap severe, amețeli, dureri abdominale, greață, vărsături, salivare, diaree, transpirație, auz redus și slăbiciune. La doze mari, aceste simptome pot fi urmate de tensiune arterială scăzută, puls slab și neregulat, dificultăți de respirație, epuizare, scădere bruscă a circulației sanguine și convulsii generale. Dacă ați luat prea multă nicotină sau dacă un copil a folosit o gumă de mestecat sau dacă se suspectează acest lucru, solicitați imediat sfat medical de la medicul dumneavoastră sau de la un departament de urgență sau de la un centru de informare toxicologică (telefon: 112).

A se păstra la îndemâna copiilor.

Dozele de nicotină tolerate de fumătorii adulți în timpul tratamentului pot provoca simptome grave de intoxicație la copii și pot fi fatale.

Ați uitat să utilizați acest medicament să folosiți?

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa o doză uitată.

Aveți alte întrebări despre utilizarea acestui medicament? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

#### 4. Posibile efecte secundare?

Ca orice medicament poate și acest medicament să aibă efecte secundare. Nu toată lumea le va experimenta se confrunța.

La oprirea fumatului pot apărea anumite simptome precum o stare depresivă, insomnie, iritabilitate, frustrare sau furie, anxietate, dificultăți de concentrare, neliniște sau nerăbdare, frecvență cardiacă redusă, apetit crescut sau creștere în greutate, amețeli, tuse, constipație, sângerări gingivale sau afte, sau o răceală. În plus, dorința de nicotină poate duce la o dorință profundă de a fuma.

Cele mai multe efecte secundare apar în primele trei până la patru săptămâni de tratament. Efectele secundare depind de cantitatea pe care o utilizați și sunt rezultatul unei tehnici greșite de mestecare sau al efectelor nicotinei. Când mestecați prea repede, Nicorette poate irita la început gura sau gâtul sau poate provoca sughiț sau greață. Reacțiile alergice sunt rare la utilizarea nicotinei.

Următoarele efecte secundare pot apărea foarte frecvent (la mai mult de 1 din 10 utilizatori): dureri de cap, tuse, sughiț, greață, gură dureroasă gât, iritație a gâtului.

Următoarele reacții adverse pot apărea frecvent (la mai puțin de 1 din 10 utilizatori): dureri abdominale, diaree, gură uscată, indigestie, flatulență, exces de salivă, inflamația mucoasei bucale, vărsături, senzație de arsură în gură, oboseală, hipersensibilitate, tulburări de gust, furnicături. Guma de mestecat poate să se lipească de o proteză dentară și, în cazuri rare, să o deterioreze.

Următoarele reacții adverse pot apărea uneori (la mai puțin de 1 din 100 utilizatori): palpitații, tahicardie, eructații, inflamația limbii, formarea de vezicule și descuamarea mucoasei bucale, sensibilitate redusă în gură, slăbiciune generală, senzație neplăcută și durere în piept, senzație de disconfort, durere de maxilar (maxilar rigid), vise anormale, îngustarea căilor respiratorii, răgușeală, dificultăți de respirație, nas înfundat, durere în gât, strănut, senzație de gât strâns, transpirație, mâncărime, erupție cutanată, erupție cutanată cu sau fără mâncărime intensă și formarea de umflături (urticarie), înroșire, tensiune arterială crescută. Tulburări de înghițire, senzație de amorțeală în gură și greață pot apărea rar (la mai puțin de 1 din 1.000 de utilizatori) la utilizarea Nicorette.

Următoarea reacție adversă

poate să apară foarte rar (la mai puțin de 1 din 10.000 de utilizatori): reacție de hipersensibilitate severă. foarte rar

Dacă aveți reacții adverse, contactați

medicul dumneavoastră sau farmacistul. Acest lucru este valabil și pentru reacțiile adverse care nu sunt menționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul Centrului Olandez de Raportare a Reacțiilor Adverse (website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Prin raportarea

reacțiilor adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații despre siguranța acestui medicament. medic sau farmacist. Acest lucru este valabil și pentru reacțiile adverse care nu sunt menționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul Centrului Olandez de Raportare a Reacțiilor Adverse (website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Raportând reacțiile adverseerkingen a raportați, ne ajutați să obținem mai multe informații despre siguranța acestui medicament.

## 5. Cum se păstrează acest medicament?

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după după finalizarea datei de expirare. O găsiți pe ambalaj 'EXP'. Aceasta indică o lună și un an. Ultima zi a acelei luni este data de expirare. Nu aruncați medicamentele pe canalizare sau în

toaletă și nu le aruncați la gunoi. Întrebați farmacistul dumneavoastră ce să faceți cu medicamentele pe care nu le mai folosiți. farmacist ce trebuie să faceți cu medicamentele pe care nu le mai utilizați. Dacă dacă eliminați medicamentele în mod corect, acestea sunt distruse în mod corespunzător și nu ajung în mediu.

## 6. Conținutul ambalajului și alte informații

## Ce substanțe conține acest medicament?

### Nicorette Fără Zahăr 2 mg gumă de mestecat

- Substanța activă din acest medicament este nicotina. Fiecare gumă de mestecat conține nicotineresinat, echivalent cu 2 mg nicotină.
- Celelalte substanțe din acest medicament sunt bicarbonat de sodiu (E500), carbonat de sodiu anhidru (E500), bază de gumă (conține BHT), pulbere de sorbitol (E420i), sorbitol 70% (E420ii), arome, glicerină 85% (E422) și talc (E553b). Aroma pro fumendi (aromă) conține urme de etanol, cinamal, alcool cinamilic, citral, citronelol, eugenol, geraniol, izoeugenol, limonen, linalool. urme de etanol, cinamal, alcool cinamilic, citral, citronelol, eugenol, geraniol, izoeugenol, limonen, linalool.

### Nicorette Fără Zahăr 4 mg gumă de mestecat

- Substanța activă din acest medicament este nicotina. Fiecare gumă de mestecat conține nicotineresinat, echivalent cu 4 mg nicotină.
- Celelalte substanțe din acest medicament sunt carbonat de sodiu anhidru (E500), bază de gumă (conține BHT), pulbere de sorbitol (E420i), sorbitol 70% (E420ii), arome, glicerină 85% (E422), colorant galben chinolină (E104) și talc (E553b). Aroma pro fumendi (aromă) conține urme de etanol, cinamal, alcool cinamilic, citral, citronelol, eugenol, geraniol, izoeugenol, limonen, linalool.

### Nicorette Fără Zahăr Freshfruit 2 mg gumă de mestecat

- Substanța activă din acest medicament este nicotina. Fiecare gumă de mestecat conține nicotineresinat, echivalent cu 2 mg nicotină.
- Celelalte substanțe din acest medicament sunt bicarbonat de sodiu (E500), carbonat de sodiu anhidru (E500), bază de gumă (conține BHT), xilitol (E967), ulei de mentă, levomentol, acesulfam de potasiu, oxid de magneziu ușor (E530), talc (E553b) și azot. Înveliș: xilitol (E967), tuttifrutti QL84441, acacia uscată prin pulverizare, dioxid de titan, ceară de carnauba, hipromeloză, sucraloză, polisorbitat 80 și apă purificată.

### Nicorette Fără Zahăr Freshfruit 4 mg gumă de mestecat

- Substanța activă din acest medicament este nicotina. Fiecare gumă de mestecat conține nicotineresinat, echivalent cu 4 mg nicotină.
- Celelalte substanțe din acest medicament sunt carbonat de sodiu anhidru (E500), bază de gumă (conține BHT), xilitol (E967), ulei de mentă, levomentol, acesulfam de potasiu, oxid de magneziu coloidal (E530), colorant galben chinolină (E104), talc (E553b) și azot. Înveliș: xilitol (E967), tuttifrutti QL84441, acacia uscată prin pulverizare, dioxid de titan, ceară de carnauba, colorant galben chinolină (E104), hipromeloză, sucraloză, polisorbitat 80 și apă purificată. (Pentru informații suplimentare despre unele componente, vezi secțiunea 2)

## Cum arată Nicorette și ce conține un ambalaj?

Nicorette Fără Zahăr 2 mg este o gumă de mestecat pătrată, de culoare bej.

Nicorette Fără Zahăr 4 mg este o gumă de mestecat pătrată, de culoare galbenă.

Nicorette Fără Zahăr Freshfruit 2 mg este o gumă de mestecat pătrată, cu înveliș, de culoare albă.

Nicorette Fără Zahăr Freshfruit 4 mg este o gumă de mestecat pătrată, cu înveliș, de culoare fildeș.

Nicorette Fără Zahăr 2 mg și 4 mg sunt disponibile în cutii de 30 sau 105 gume de mestecat, în ambalaj blister (Al/PVC/PVDC). Nicorette Fără Zahăr Freshfruit 2 mg și 4 mg sunt disponibile în cutii de 12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105,

Nicorette Fără Zahăr 2 mg și 4 mg sunt disponibile în cutii de 30 sau 105 gume de mestecat, în ambalaj blister (Al/PVC/PVDC).  
sau 210 gume de mestecat, în ambalaj blister (Al/PVC/PVDC). 204 disponibile pe piață.

Deținătorul autorizației de punere pe piață comerț a fi aduse.

Deținătorul autorizației de punere pe piață aducere Kenvue Netherlands B.V.  
Stadsplateau 27  
3521 AZ Utrecht

Producător  
McNeil AB  
Norrbroplatsen 2  
251 09 Helsingborg  
Suedia

Numerele autorizației de punere pe piață aducere

Nicorette Fără Zahăr 2 mg gumă de mestecat:	RVG 09155
Nicorette Fără Zahăr 4 mg gumă de mestecat:	RVG 14228
Nicorette Fără Zahăr Freshfruit 2 mg gumă de mestecat:	RVG 32548
Nicorette Fără Zahăr Freshfruit 4 mg gumă de mestecat:	RVG 32549

Acest prospect a fost aprobat ultima dată la 12 mai 2025. A fost aprobat în 12 mai 2025.