

Prospecto: información para el usuario  
Nitrofurantoína Activase 50 mg cápsulas duras  
Nitrofurantoína Activase 100 mg cápsulas duras  
nitrofurantoína

Lea cuidadosamente todo el prospecto antes de usted este medicamento va a usar, porque hay contiene importante información en para usted.

- Guarde este prospecto. Quizás tenga lo necesite más tarde de nuevo necesario.
- Tiene usted más preguntas? Entonces póngase en contacto con su médico o farmacéutico.
- No dé este medicamento a otros sin permiso, porque es solo para usted prescrito. Puede ser perjudicial para otros ,incluso si tienen los mismos síntomas que usted . u.
- ¿Tiene usted molestias de uno de los efectos secundarios que en la sección 4 se mencionan? O ¿tiene usted un efecto secundario que no en este prospecto estado? Entonces póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

### Contenido de este prospecto

1. Qué es Nitrofurantoína Activase y para qué se este medicamento utiliza?
2. ¿Cuándo no debe este medicamento usar o debe tener especial cuidado con ello ?  
¿Cómo
3. toma usted este medicamento ? en?
4. Posibles efectos secundarios
5. Cómo almacena usted este medicamento?
6. Contenido del empaque y otra información

### 1. Qué es Nitrofurantoína Activase y para qué se este medicamento utiliza?

Nitrofurantoína es el principio activo en este medicamento. Nitrofurantoína es un medicamento contra infecciones por uno bacteria (antibiótico). El se utiliza para el tratamiento de infecciones de sus vías urinarias y vejiga . Else utiliza también también utilizado para asegurar que usted estas infecciones no obtenga ..

siente durante o después del tratamiento no se siente mejor? O siente usted se peor? Entonces contacte a su médico.

### 2. Cuándo no debe este medicamento no usar o debe tener cuidado con son?

#### Cuándo puede este medicamento no usar?

Es alérgico a nitrofurantoína o a uno de los componentes en este medicamento.

Este sustancias puede usted encontrar en sección 6 de este prospecto.

Es alérgico a otros nitrofuranos.

Su médico le ha informado que sus riñones no funcionan (eGFR menos de 45 ml por minuto ).Usted está en la

última etapa de su embarazo embarazo (de parto).

Usted puede este medicamento no usar en bebés menores de tres meses.

Le falta una enzima que glucosa-6-fosfato deshidrogenasa caliente. Por lo tanto pueden sus rojas células sanguíneas más fácilmente dañarse. Esto ocurre más a menudo en las personas negras y personas de origen mediterráneo, Medio-Oriental o asiático origen. Su médico sabrá esto ..

tiene una enfermedad que se llama porfiria , caliente, un grupo enfermedades de la sangre que su sistema nervioso, piel o ambos dañado.  
Usted tiene síntomas en sus pulmones, hígado o nervios tenido (periférica neuropatía) después de tomar nitrofurantoína o otros nitrofuranos . ¿Duda.

alguno de los puntos mencionados arriba? Diga al su médico. Cuándo

debe tener especial cuidado con este medicamento ? Consulte consu médico o farmacéutico antes de farmacéutico antes de usted este medicamento tome si:

usted diabetes tiene (diabetes).

usted problemas con sus riñones tiene. Usted debe entonces posiblemente extra serán controlados por su médico durante el tratamiento.

usted sufre de una falta de sensación o una sensación débil en su brazos y piernas (neuropatía periférica).

usted anemia tiene. Esto causa menos glóbulos rojos células sanguíneaspiel pálida ,, uno débil sensación y falta de aliento estar. O si usted demasiado poco vitamina B o una cantidad anormal de sal en su sangre tiene. Su médico puede le consejo dar.

usted anteriormente alérgicas reacciones ha tenido.

Los puntos anteriores pueden de probabilidad aumentar de un efecto secundario que causa daño a sus nervios . Estopuede hacer que las cosas se sientan diferentes de preocupaciones para hormigueo.

usted una enfermedad en su pulmones, hígado o sistema nervioso tiene.

debe usted este medicamento para un par meses usar? Entonces quiere su médico quizás regularmente controlar cómo bien sus pulmones y hígado funcionan.

Especialmente si usted mayor es.

este medicamento puede también causar una enfermedad pulmonar en pacientes que no tienen daño de los pulmones previo tener tenido. Enfermedad pulmonar puede ocurrir en pacientes que un corto o largo tratamiento reciben.

usted diarrea tiene que es causado por un bacteria llamada clostridium difficile llamada.

usted otros medicamentos contra bacterias usa.

usted tiene tiene de cansancio estar, amarillo color de su piel o ojos, picazón, erupción cutánea, dolor articular, molestias en su abdomen, náuseas son, vómitos, sin apetito, orina oscura y heces pálidas o grises .Esto pueden ser síntomas de una enfermedad en su hígado.

este medicamento puede afectar tener en el resultado de pruebas de glucosa en su orina. El resultado puede por esto falso positivo ser.

Algunas personas negras y personas de origenmediterráneo , oriental o asiático pueden desarrollar anemia durante el tratamiento. Pertenece usted a este grupo? Y siente usted durante el tratamiento molestias de cansancio, mareos y falta de aire ? Entonces deje detomar ingerir de este medicamento. Tome también contacto con su médico.

Usa usted otros medicamentos ?Usa

usted además de Nitrofurantoína Activase otros todavía otros medicamentos, ha usted eso recientemente hecho o va usted esto quizás pronto hacer ?Informe eso entonces entonces su médico o farmacéutico. Usa usted uno de los siguientes medicamentos junto con

Nitrofurantoína Activase? Entonces pueden estos medicamentos de manera diferente funcionar. O puede Nitrofurantoína Activase de otra manera ir funcionar:

Magnesio trisilicato. Esto es un antiácido. Este medicamento se utiliza como el digerir digerir de comer en su cuerpo no bien ..

contra una inflamación en una articulación con dolor (gota). Por ejemplo Por ejemplo probenecida de sulfonpirazona.

Medicamentos que aseguran que los alimentos permanezcan en su estómago más tiempo. Por ejemplo atropina o hioscina.

Medicamentos contra un tipo cataratas (glaucoma). Como inhibidores de la anhidrasa carbónica. Por ejemplo acetazolamida.

Medicamentos que su orina menos ácida hacen (orina-alcalinizantes agentes). Por ejemplo un mezcla de citrato de potasio.

Medicamentos contra infecciones (quinolonas).

Vacuna contra la fiebre tifoidea si se administra por vía oral se toma.

¿En qué debe usted prestar atención con comida y bebida?

Este medicamento debe con comida o leche ser tomado. Esto ayuda a asegurar que usted no tenga molestias estomacales recibe. El ayudará también a con la absorción de este medicamento.

Embarazo y lactancia

¿Está embarazada, piensa u embarazada a estar, desea embarazada quedar o da usted lactancia? Consulte con su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento utilizar.

Embarazo

Para tanto conocido puede este medicamento durante el embarazo ser utilizado. No debe ser utilizado durante el parto parto. Uso de este medicamento durante el parto puede afectar a su bebé (verla sección 'Cuándono debe usar este medicamento no usar?' arriba).

Lactancia

¿Quiere dar el pecho dar? Entonces primero contacte con su médico. Este medicamento pasa a la leche materna. Dit puede ser peligroso para bebés menores de 3 meses. Puede también ser peligroso para bebés que no tienen un tipo de enzima tener.

Aptitud para conducir y el uso de máquinas

Este medicamento puede hacer que usted se sienta mareado y somnoliento . Conduzca. Conduzca ningún auto y maneje ningún máquinas si usted aquí molestias tiene. Espere hasta estos síntomas desaparezcan de nuevo estén.

Este medicamento contiene lactosa y sodio

Le ha dicho su médico que usted algunos azúcares no tolera? Entonces contacte a su médico antes de que este medicamento toma.

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por cápsula, lo quiere decir que en esencia 'libre de sodio'.

3. Cómo toma usted este medicamento en?

Use este medicamento siempre exactamente como su médico o farmacéutico le ha indicado .. dudas sobre el correcto uso? Entonces póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

Siga muy bien las instrucciones de uso de su médico. Complete el tratamiento . Incluso si se siente sí mismo mejor se siente.

Recomendada dosis

Adultos y niños mayores de 10 años:

La dosis normal depende de del tipo infección que usted tiene. El instrucciones de uso deben ser escritas en la etiqueta que su farmacéutico le da. Póngase en contacto con su médico o farmacéutico si estas instrucciones de uso no claras son.

El normal dosis son:

Para el tratamiento de infecciones: 1 cápsula de 50 mg 4 veces al día antes 7 días

Para el tratamiento de infecciones graves que no desaparecen y siguen reapareciendo: 1 cápsula de 100 mg 4 veces al día durante 7 días

Para asegurar que no tenga otras infecciones reciba recibe antes de dormir Para asegurar

que no tenga otras infecciones reciba infecciones recibe durante una operación: 1 cápsula de 50 mg 4 veces por día en el día de la operación y durante 3 días después.

Uso en niños y bebés mayores de 3 meses:

La dosis depende de del peso del niño. Su médico determina la dosis. Siga muy bien las instrucciones de uso de su médico.

El uso de este medicamento (una cápsula) puede posiblemente no bien en más jóvenes niños. Otros formas de este medicamento pueden ser mejores. Como un líquido. ¿Tiene dudas? Póngase en contacto con su médico de farmacéutico.

Uso en niños menores de 3 meses:

Niños menores de 3 meses no deben usar este medicamento.

Forma de administración

Este medicamento debe siempre con comida o leche ser tomado. El medicamento funciona entonces mejor.

Las cápsulas deben estar enteras ser tragado. Olvide su medicamento no en tomar ..

médicos Su

médico va a muy bien observar en en posibles influencias en su hígado, pulmones, sangre o sistema nervioso. Este medicamento puede afectar a los resultados de algunas pruebas investigaciones de glucosa en su orina.

¿Ha usted demasiado de este medicamento tomado ?Contacte

inmediatamente con su médico o farmacéutico . O vaya hacia de departamento de urgencias del hospital en la cercanía.

Lleve siempre las cápsulas que le queden por tener. Lleve también el empaque y la etiqueta contigo. Así sabe el personal médico lo que ha tomado ..

tomar este medicamento en algún momento ?Si

lo recuerda más tarde en el día día a? Tome entonces la dosis de ese día como normal. ¿Ha usted una dosis para todo el día perdido? Tome entonces la dosis normal de siguiente día en. Tome no doble dosis para una dosis olvidada en recuperar .. dudas? Entonces contacte con ¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con médico o farmacéutico farmacéutico.

Si usted deja de tomar este medicamento medicamento  
Su médico le dirá cuánto tiempo este medicamento debe tomar . Deje. Detener no antes de lo que le indique su médico. Tampoco no si se siente mejor ..

alguna otra pregunta sobre el uso del medicamento de este medicamento? Póngase en contacto con su médico, farmacéutico o enfermero.

#### 4. Posibles efectos secundarios

Como cualquier medicamento puede también este medicamento efectos secundarios tener. No todos reciben con ello ..

mayoría de los efectos secundarios son leves. desaparecen de nuevo cuando usted u deje de usar este este medicamento.

Todos los medicamentos pueden reacciones alérgicas causar. Pero graves reacciones alérgicas ocurren casi nunca para. Tiene usted repentina un silbante respiración, problemas para respirar, hinchazón de sus párpados, cara o labios, erupción cutánea o picazón (especialmente en su todo cuerpo)? Entonces deje de tomar este medicamento . Vayatambién inmediatamente a hacia uno médico.

Tiene molestias de uno de los siguientes efectos secundarios? Entonces deje de usar este medicamento . Tambiénpóngase en contacto con su médico. Un

grupo grupo enfermedades de la sangre que su sistema nervioso, piel, o ambos dañado (porfiria aguda ).Sus pulmones pueden reaccionar a nitrofurantoína . Estopuede puede rápido, dentro de una semana después del inicio del tratamiento suceder. El puede también muy lentamente aparecer. Especialmente en pacientes mayores. Esto puede causar fiebre ,escalofríos , tos, dificultadpara respirar ,desmayos desmayo una coloración azul de de su piel. Puede haber cicatrices debido a daño del tejido en sus pulmones. Ictericia (inflamación del hígado que una amarilla color de su piel o esclerótica causado). Su hígado puede también menos bien empezar a funcionar (insuficiencia hepática). Esto puede letal son.  
El nervios fuera su médula espinal pueden dañar. Esto puede causar cambios en la sensación y el uso de su músculos. La tratamiento debe ser detenido al primer síntoma de un hormigueo sensación o ninguna sensación en en sus manos o pies. Usted puede también tener problemas de dolor de cabeza, cambios extremos de humor de ánimo de salud mental, estar confundido, un débil sensación y visión borrosa .. síntomas pueden muy ser . Enalgunos casos nunca desaparecen más . Dosis. Mayor presión en su cráneo. Esto causa un fuerte dolor de cabeza.  
Azul o púrpura color de su piel por muy poco oxígeno en su sangre. Esta enfermedad se llama cianosis.  
Síntomas de fiebre, gripe, dolor abdominal, diarrea, sangre en su heces y una sensación débil. Esto pueden ser síntomas de una enfermedad que cutánea vasculitis se llama.

Quejas de ictericia, cansancio estar, dolor abdominal, dolor articular y hinchazón. Esto pueden ser síntomas de una enfermedad que auto- el auto-hepatitis autoinmune caliente.

Tenga en cuenta que su orina amarillo oscuro o marrón puede volverse durante el uso de este medicamento . Esto es muy normal normal. Esto es no una razón para dejar de usar el uso de este medicamento.

Otros efectos secundarios pueden ser:

Rara vez (ocurren para en menos de 1 de cada 1000 usuarios)

Daño de su médula ósea. Esto le causa u muy pocos glóbulos rojos (anemia).

No conocido (puede con los datos disponibles no ser determinados)

En algunos pacientes las células sanguíneas están dañadas. Esto puede preocupaciones por moretones ,coagulación más lenta de la sangre ,dolor de garganta ,fiebre ,anemia anemia más rápidamente un resfriado contraer o de uno resfriado tener que no desaparece ..

estar Diarrea

( heces sueltas) Sin ganas de comer,dolor de estómago

Falta de apetito, vómitos Algunos vomitar

Algunos pacientes recibieron molestias de diferentes tipos erupción cutánea o problemas de piel. Se han también reportado casos de una grave inflamación de la piel y otro partes del cuerpo por una alergia a un medicamento (síndrome de DRESS).

Usted puede tener problemas de escamas en su piel, roja erupción cutánea o fiebre junto con un rápido latido del corazón y grave erupción cutánea con ampollas. Otros síntomas pueden ser: inflamación de glándulas salivales (que dolor facial causan), inflamación de su páncreas (que dolor abdominal severo causa causay dolor articular dolor articular.

El nervios fuera su médula espinal pueden dañar. Esto puede causar cambios en la sensación y el uso de sus músculos .. Además puede tener molestias experimentar de dolor de cabeza, cambios extremos de humor de ánimo o salud mental (psicosis), estar confundido, una sensación débil, movimientos con sus ojos hacer sin que usted lo desee ( causandoque su ojo rápidamente de un lado a otro , arribay abajo abajo o en un círculo puede moverse y usted borroso puede ver). Estos síntomas pueden muy ser. En algunos casos ir nunca más lejos.

Cansado estar, escalofríos y fiebre por medicamentos Rápida

pérdida de cabello Infección

de de su vías urinarias por patógenos que no son sensibles a nitrofurantoína nitrofurantoína.

de las paredes de pequeños vasos sanguíneos .. causa surge daño a su piel.

Inflamación de su hígado debido a que su sistema inmunológico ataca las células hepáticas ..

de tejido alrededor alrededor de de tubos en sus riñones. Esto hace que sus riñones funcionen menos bien.

Este medicamento puede tener efecto sobre el resultados de algunas investigaciones de glucosa en su orina.

El informe de efectos secundarios

¿Tiene efectos secundarios, póngase en contacto con, póngase en contacto con médico, farmacéutico o enfermero/enfermera. Esto se aplica también a los efectos secundarios que no en este prospecto aparecen. Usted puede reportar efectos secundarios también informar a través del Centro de Efectos Secundarios Lareb de los Países Bajos, sitio web: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Al efectos secundarios a informar, ayuda usted nos a más información obtener sobre la seguridad de este medicamento ..

#### 5. Cómo almacena usted este medicamento?

Fuera de la vista y alcance de niños mantener.

Use este medicamento no más después de última fecha de caducidad. Que encuentra usted en la caja y el blíster después de EXP. Ahí aparece un mes y un año. El último día de mes es el última fecha de caducidad.

Conservar por debajo de 25 °C.

No enjuague medicamentos no por el fregadero o el inodoro y tire ellos no en el basurero. Pregunte a su farmacéutico qué debe hacer con medicamentos que hacer que no más usa. Si usted medicamentos de la manera correcta desecha sean eliminados de manera adecuada y no lleguen al medio ambiente ..

#### 6. del empaque y otra información/información

¿Qué sustancias contiene en este medicamento?

La sustancia activa en este medicamento es nitrofurantoína/nitrofurantoína.

Activase 50 mg cápsulas duras/cápsulas: Cada dura cápsula contiene 50 mg nitrofurantoína.  
Nitrofurantoína Activase 100 mg duras cápsulas: Cada dura cápsula contiene 100 mg nitrofurantoína.

El otro sustancias en este medicamento son talco, almidón de maíz y lactosa monohidrato. La cubierta de la cápsula contiene gelatina, dióxido de titanio (E 171) y óxido de hierro amarillo (E 172).

Cómo se ve Nitrofurantoína y qué contiene un empaque? Nitrofurantoína

50 mg cápsulas duras tienen una tapa amarilla dop y marfil-amarillo romp. Las cápsulas contienen amarillo a amarillo claro polvo.

Nitrofurantoína 100 mg duras cápsulas tienen un tapa marfil-amarilla y romp. Las cápsulas contienen amarillo a hasta amarillo-blanco polvo.

Nitrofurantoína es disponible en blísteres con 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 84 o 90 cápsulas duras.

Es posible que no todos los tamaños de envase estén en comercio sean traído.

Titular de la autorización para la comercialización/introducción y fabricante

Titular de la autorización:

Activase Pharmaceuticals Limited

11 Boumpoulinas,  
P.C. 1060, Nicosia  
Chipre

Fabricante:  
Elara Pharmaservices Europe Limited  
Regus Block 1, Blanchardstown Corporate Park,  
Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15,  
D15 AKK1  
Irlanda

En el registro inscrito bajo  
Nitrofurantoína Activase 50 mg duras cápsulas: RVG 131639  
Nitrofurantoína Activase 100 mg duras cápsulas: RVG 131640

Este medicamento es registrado en estados miembros del Espacio Económico Europeo bajo los siguientes nombres:

Irlanda	Nitrofurantoína 50 mg cápsulas duras en Nitrofurantoína 100 mg harde cápsulas
Países Bajos	Nitrofurantoína Activase 50 mg harde cápsulas & Nitrofurantoína Activase 100 mg harde cápsulas
Bélgica	Nitrofurantoína Activase 50 mg gélule & Nitrofurantoína Activase 100 mg cápsula
Portugal	Nitrofurantoína 50 mg Cápsula & Nitrofurantoína 100 mg Cápsula
Eslovenia	Nitrofurantoína Activase 50 mg cápsula & Nitrofurantoína Activase 100 mg cápsula

Este prospecto es para el última aprobado en noviembre 2025