

Pakendi infoleht: teave kasutajale de kasutaja
Nitrofurantoiin Activase 50 mg kõvad kapslid
Nitrofurantoiin Activase 100 mg kõvad kapslid
nitrofurantoiin

Lugege hästi kogu pakendi infoleht enne te seda ravimit hakkate kasutama, sest seal on oluline teave sees teie jaoks.

- Hoidke see pakendi infoleht. Võib-olla on teid hiljem uuesti vaja.
- Kas teil veel küsimusi? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.
- Ärge seda ravimit andke edasi teistele teised, sest see on ainult teile määratud retseptiga. See võib kahjulik olla teistele, isegi kui neil on samad kaebused nagu teil. u.
- Kas teil on probleeme mõne nende kõrvaltoimetega mis on jaotises 4 loetletud? Või kas teil on kõrvaltoime mis ei ole selles infolehes mainitud seisund? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.

Sisu sellest infoleht Mis on

1. Nitrofurantoiin Activase ja milleks kasutatakse seda ravimit kasutatakse kasutab?
2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik sellega olema ?
Kuidas
3. võtate te seda ravimit sisse? sisse?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas säilitate te seda ravimit?
6. Pakendi sisu ja muu teave 1.

1. Nitrofurantoiin Activase ja milleks kasutatakse kasutatakse seda ravimit kasutatakse?

Nitrofurantoiin on toimeaine aine selles selles ravimis. Nitrofurantoiin on üks ravim põletike vastu põhjustatud üks bakter (antibiootikum). See kasutatakse raviks jaoks raviks ravi infektsioonide infektsioonid teie kuseteede ja põie . Seekasutatakse ka ka kasutatakse et tagada et te neid infektsioone ei saaks ..

te tunnete end ravi ajal või pärast mitte hästi parem? Või tunnete te ennast halvemini? Võtke siis ühendust oma arstiga.

2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik ettevaatlik kaasa on?

Millal tohib te seda ravimit mitte kasutada?

Te olete allergiline nitrofurantoiini või mõne aine suhtes mis on koostisosade sees see ravim.

See ained saate te leida jaotises rubriik 6 sellest sellest pakendi infoleht.

Te olete allergiline teiste nitrofuraanide vastu.

Teie arst on teile öelnud et teie neerud ei tööta hästi (eGFR vähem kui 45 ml minutis).Te olete

raseduse lõppjärgus faas teie raseduse lõppjärgus (de sünnitus).

Te ei tohi seda ravimit mitte kasutada imikutel nooremad kui kolm kuud ..

ensüüm mis glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas see glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas kuum. Seetõttu võivad teie punased vererakud kergemini kahjustuda. See esineb sagedamini juhtudel mustanahaliste inimeste jaoks ja inimeste päritolu Vahemere, Kesk-Ida või Aasia päritolu. Teie arst teab seda ..

põete ühte haigust nimega porfüüria , kuum, üks rühm verehäired mis teie närvisüsteemi, nahk või mõlemad kahjustatud.

Teil on kaebused teie kopsud , maks võinärvid närvid kogenud (perifeerne neuropaatia) pärast võtmist võtmist alates nitrofurantoiin või muud nitrofuraanid.

Kahtlete te ühe alates ülaltoodud punktide? Räägi sellest oma arstile. Millal

peate olema eriti ettevaatlik selle ravimiga ? Võtke ühendust omaarsti või apteekriga enne kui arstide apteeker enne te seda ravimit võtate kui:

teil diabeet on (diabeet).

teil probleemid neerudega teie neerudega on. Te peate siis võimalik extra saavad kontrollitud poolt teie arst ravi ajal de ravi.

teil on on alates mitte tunne või nõrk tunne tunne sisse teie käed ja jalad (perifeerne neuropaatia).

teil aneemia on. See põhjustab vähem punaseid vererakke, kahvatu nahk, üks nõrk tunne ja hingeldus olema. Või kui te liiga vähe vitamiini B või üks ebanormaalne kogus soola veres teie veres on. Teie arst võib teile nõu anda.

te varem allergilisi reaktsioone on kogenud.

Ülaltoodud punktid võivad olla de võimalus suurendada op üks kõrvaltoime mis põhjustab jaoks kahju teie närvidele . Seevõib põhjustada et asjad tunduvad teistsugused tunduvad of mured jaoks surinad.

te üks haigus sees teie kopsud, maks või närvisüsteem on.

peate te seda ravimit enne üks paar kuud kasutada? Siis soovib teie arst võib-olla regulaarselt kontrollida kui hästi teie kopsud ja maks töötavad. Eriti kui u vanem olete. see ravim võib ka põhjustada kopsuhaigust patsientidel kes ei varasem kahjustus kopsude ole on kellel ei ole kogenud. Kopsuhaigus võib esineda patsientidel kes saavad lühikest või pikka ravi ravi teil.

on mis on põhjustatud saab põhjustatud poolt üks bakter mida nimetatakse clostridium difficile'ks kutsutakse.

te teised ravimid vastu bakterite kasutate.

teil on on väsimusest väsinud olema, kollane värvus teie naha või silmade ,sügelus ,nahalööve nahalööveliigesvalu liigesvalukaebused teie kõhus , iiveldus, iiveldus on, oksendamine, pole isu söömiseks, tume uriin ja kahvatu või hall väljaheide. Need võivad olla sümptomid on haigusest ühest haigusest sisse teie maks. see ravim võib mõjutada olema tulemusele tulemus alates uuringud glükoosi teie uriinis. Tulemus võib seetõttu valepositiivne olla.

Mõned mustanahalised inimesed ja inimesed pärit Vahemere, ida või Aasia päritolu võivad ravi ajal aneemia saada .. Kas te kuulute sellesse rühma? Ja kas ravi ajal tunnete väsimust, peapööritust jahingeldust ? Lõpetage siis võtmine hingeldus on? Lõpeta siis sellega võtma alates see ravim. Võtke ka ühendust oma

arstiga. Kasutate te veel teisiravimeid

? Kasutate te lisaks Nitrofurantoiin Activase teised ravimid, kas te et hiljuti tegite või kavatsete te seda võib-olla varsti teha ?Rääkige sellest siis siis teie arst või apteeker.

Kasutate te ühte järgmistest ravimitest koos Nitrofurantoiiniga Activase ? Siis võivadneed

ravimid teistmoodi mõjuda hakata minema töötama. Või võib Nitrofurantoiin Activase teisiti minema töötama:

Magneesiumtrisilikaat. See on üks maohappe vähendaja. See ravim kasutatakse kui see seedimine seedima söömine teie keha mitte hästi ..

vastu põletik liigeses koos valuga (podagra). Näiteks (podagra). Näiteks probenetsiid of sulfinpüraasoon.

Ravimid mis põhjustavad et toit kauem teie maos püsib .. atropiin või hüostsiin.

Ravimid

vastu ühe üks tüüp katarakt (glaukoom). Nagu karboanhüdraasi inhibiitorid. Näiteks atsetasoolamiid.

Ravimid mis teie uriini vähem happeliseks teevad (uriini-alkaliseerivad ained). Näiteks üks kaaliumtsitraadi segu.

Ravimid vastu infektsioonid (kinoloonid).

Kõhutüüfuse vaktsiin kui see suu kaudu võetakse sisse ..

peate te te tähelepanu pöörama toiduga ja joomine?

See ravim tuleb koos toiduga või piimaga võtta . See aitab et tagada et teil ei oleks mingeid kõhuvaevused saab. See aitab ka kaasa juures selle imendumisele selle selle ravimi.

Rasedus ja imetamine

Kas olete rase, arvate u rase olema olete, soovite rase jääda või toidate te rinnaga? Võtke ühendust oma arstiga või apteekriga enne kui seda ravimit kasutate.

Rasedus

Nii palju kui teada on võib seda ravimit raseduse ajal kasutada . Seda ei tohi kasutadasünnituse ajal saama kasutab ajal de sünnitus. Kasutamine alates seda ravimit sünnituse ajal võib mõjutada teie lapse (vt jaotist' Millal ei tohi kasutada' kas tohib seda ravimit mitte kasutada?' ülalpool).

Imetamine

Kas soovite imetada ?Võtke siis kõigepealt ühendust oma arstiga. See ravim satub rinnapiima .. See võib olla ohtlik imikutel alla 3 kuu vanustele beebidele kui 3 kuud. See võib ka olla ohtlik neile imikutele kes ei oma teatud ensüümi ei oma.

Sõiduvõimekus ja see kasutamine masinatega

See ravim võib põhjustada et tunnete ennast peapööritusena ja unisena . Juhtige. Sõida ei auto ja kasuta ei masinad kui te siin häirib on. Oodake kuni need kaebused jälle kadunud on.

See ravim sisaldab laktoosi ja naatriumi

Kas teie arst teile öelnud et te mõningaid suhkruid ei talu ? Võtke siis ühendust oma arstiga enne kui seda see ravim võtate.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) kapsli kohta, see tähendab et see on tegelikult ' naatriumivaba'.3.

3. võtate te te see ravim sisse?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nagu teie arst või apteeker teile seda on öelnud. Kahtlete te õige annuse kasutamine? Võtke siis ühendust teie arstiga või apteekriga.

Järgige väga hästi de kasutusjuhiseid oma arstilt . Lõpetage ravikuur . Isegikui te tunnete ennast parem tunneb.

Soovitatav annus

Täiskasvanud ja lapsed vanemad kui 10 aastat:

Tavaline annus sõltub sellest milline tüüp infektsioon infektsioon et te on. kasutusjuhendid peavad olema kirjutatud etiketile sildile et teie apteeker teile annab. Võtke ühendust oma arstiga või apteekriga kui need kasutusjuhised mitte selged on.

Tavalised annused on ::

raviks : 1 kapsel 50 mg 4 korda päevasenne kord per päev jaoks 7 päeva

Ravi raviks tõsiste raske infektsioonide mis ei kao ja pidevalt tulevad tagasi: 1 kapsel 100 mg 4 korda päevas 7 päeva 7 päeva

Et tagada et te ei saaks teisi infektsioone saab: 1 kapsel 50 mg või 1 kapsel 100 mg magamaminekut see Et

tagada et te ei saaks infektsioone infektsioonid saab ajal üks operatsioon: 1 kapsel 50 mg 4 korda päevas päeval operatsiooni päeval pärast operatsiooni ja 3 päeva 3 seda ..

Kasutamine juures lastel ja beebidel vanem kui 3 kuud:

Annus sõltub kaalust lapsel. Teie arst määrab annuse arst määrab de annus. Järgige väga hästi juhiseid kasutusjuhendit oma arsti poolt.

Ravimi kasutamine selle ravimi (kapsel)võib olla võimalik mitte sobiv juures noorematel lastel. Teised vormid sellest ravimist võivad paremad olla .. vedelik . Kahtlete. Võtke siis ühendust oma arstiga teie arst apteeker.

Kasutamine lastel alla 3 kuu ::

alla 3 kuu ei tohi seda ravimit kasutada . kasutama.

Manustamisviis alates manustamine

See ravim tuleb alati koos toidu või piimaga võtta . Ravimtoimib siis paremini . Kapslid. tervelt alla neelata kogu muutuma alla neelatud. Unusta teie ravim mitte sisse võtma ..

kontrollid Teie

arst jälgib väga hästi tähelepanu pöörama peal võimalikud mõjud teie maksale , kopsudele, verelevõi närvisüsteemile . See ravimvõib mõjutada võib tulemusi on olema mõnede uuringute alates tulemusi uuringud glükoosi teie uriinis.

Kas te liiga palju seda ravimit võtnud ?Võtke

kohe ühendust oma arstiga või apteekriga . Või mingekuni juurde de erakorralise meditsiini osakond van het haigla in de lähedal.

Võtke alati kapslid kaasa, mis teil veel alles on. Võtke ka pakend ja etikett see etikett kaasa. Nii teab meditsiiniline personal mida te olete võtnud ..

unustasite seda ravimit sisse võtta ? Kaste hiljem

päeva jooksul mõtlete päev juures? Võtke siis annus alates sellel päeval nagu tavaliselt. Kas teil on annus kogu päeva vahele jäänud ? Võtke siistavaline annus annus järgmisel päeval sisse. Võtke mitte kahekordset annust et unustatud annust tasa teha . Kas kahtlete ? Võtke siis ühendust. arstiga või apteekriga teie arstide apteeker.

Kui te lõpetate selle võtmise selle ravimi ravimi

Teie arst ütleb teile kui kaua te seda ravimit peate võtma . Lõpetage. Lõpeta mitte varem kui teid öeldakse juhendatakse. Samuti mitte kui te tunnete paremini ennast.

Kas teil on veel muid küsimusi kasutamise kohta kohta see ravim? Võtke ühendust oma arstiga, apteekriga või õega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu iga ravim võib ka see ravim kõrvaltoimed on. Mitte kõik ei saa sellega kokku puutuda.

Enamik kõrvaltoimeid on kerged. Need kaovad ise ära kui te te lõpetab kasutamise kasutamine selle selle ravimi.

Kõik ravimid võivad allergilisi reaktsioone põhjustada. Kuid tõsised allergilised reaktsioonid esinevad peaaegu kunagi jaoks. Kas teil äkiline on vilistav hingamine, probleemid hingamisega ,turse teie silmalaugude , näovõi nägu kohta huuled, nahalööve või sügelus (eriti üle teie kogu keha)? Lõpetage siis selle ravimi võtmine . Mingeka kohe arsti juurde üks arst.

Kas teil tekivad üks järgmistest allpool toodud kõrvaltoimetest? Lõpetage siis kasutamine selle ravimi . Võtke ühendust oma arstiga . Üks

rühm rühm verihaigused mis teie närvisüsteem, nahk, või mõlemad kahjustatud (äge porfüüria).

Teie kopsud võivad reageerida nitrofurantoiinile . See võib kiiresti, nädala jooksul pärast ravi algust toimuda . See võib ka väga aeglaselt areneda .. vanematel patsientidel vanem patsiendid. See võib põhjustada palavikku ,külmavärinaid , köha, hingeldust, minestamist võisid värvust nahal või huultel või küüntel teie nahk. Võib tekkida armid kuna kahjustus koele kudede kopsudes . Teie kopsud.

Kollatõbi (maksapõletik mis muudab kollaseks värv alates teie nahk või silmakõvakest põhjustatud). Teie maks võib ka vähem hästi töötama (maksapuudulikkus). See võib surmav on.

De närvid väljaspool teie seljaaju võivad kahjustada. See võib põhjustada muutusi tundlikkuses ja tunnetuses ja kasutamises kasutamine vahel teie lihased. Ravi ravi peab olema peatatud juures esimene esimesed kaebused kohta üks kihelev tunne või ei tunne sees teie käed või jalad. Te võite ka kannatada saada peavalu , äärmuslikudmeeleolu muutused või vaimne tervis , segadusesolema ,üks üks nõrk tunne ja hägune nägemine. Need kaebused võivad väga olla. Mõnel juhul ei kao nad kunagi enam ära ..

Kõrgem rõhk sisse teie kolju. See põhjustab tugevat peavalu .. või lilla värv teie nahk tõttu teie nahk liiga vähe hapnik sisse teie veri. See haigus nimetatakse tsüanoos.

Kaebused alates palavik, gripp, kõhuvalu, kõhulahtisus, veri sisse teie väljaheide ja üks nõrk tunne. See võivad kaebused olla haiguse üks haigus mis naha vaskuliit nimetatakse.

Kaebused alates kollatõbi, väsimus olema, kõhuvalu, liigesvalu ja turse. See võivad kaebused olla alates haigus mis auto- see auto-autoimmuunhepatiit kuum.

Pange tähele , et teie uriin tumedakollane või pruun võib olla ravimi kasutamise ajal see ravim . See on täiesti normaalne normaalne. See on ei ole põhjus lõpetada kasutamine selle ravimi kasutamist selle ravimi ravim.

Muud kõrvaltoimed võivad olla:

Harva (esinevad jaoks juures vähem kui 1 1000-st kasutajad)

Kahjustus teie luuüdile .. saate te liiga vähe punaseid vererakke vererakud aneemia)).).

Ei teada (võib koos olemasolevate andmetega ei ole määratud)

Mõnel patsiendil on vere vererakud kahjustatud . Seevõib võib vere eest sinikad ,aeglasem hüübimine veri ,kurguvalu ,palavik ,aneemia ja kiiremini külmetus saada või külmetus saada üks külmetus olema mis ei ära läheb.

liveldus olema

Kõhulahtisus (lahtine kaka)

Isutus, kõhuvalu ja oksendamine

Mõned patsiendid said kannatasid erinevat tüüpi nahalööve või nahaprobleemid. On olemas ka juhte teatatud alates raske põletik naha põletik ja ja teised osad kehast keha läbi ühe allergia ühele ühe ravimi (DRESS-sündroom). Te võite kannatada saada ketenduse helbed oma teie nahk, punane nahalööve või palavik koos koos üks kiire südame löögisagedus ja raske nahalööve koos villidega. Muud kaebused võivad olla: põletik alates süljenäärmed (mis näovalu põhjustavad), põletik alates kõhunääre (mis tugev kõhuvalu põhjustab põhjustabja liigesvalu liigesvalu.

De närvid väljaspool teie seljaaju võivad kahjustada. See võib põhjustada muutusi tundes ja kasutamises teie lihaste . alates teie lihased. Lisaks võite teil esineda peavalu , äärmuslikud meeleolumuutused või vaimne tervis vaimne psühhoos), segadusesolema), segaduses nõrktunne , nõrk tunne, liigutused koos teie silmadega teha ilma et te seda ise tahate (mille tõttu teie silm kiiresti edasi ja tagasi, üles ja neer või sisse üks ring võib liikuda ja te udune võite näha). Need kaebused võivad väga olla. Mõnel juhul juhtudel minema nad kunagi enam ära.

Väsinud olema, külm värinad ja palavik ravimite tõttu Ravimid

Kiire kaotus juuste kaotus

Infektsioon alates teie kuseteed poolt haigustekitajad mis ei tundlikud on nitrofurantoiini nitrofurantoiin.

veresoonte seinte väikesed veresooned . Selle tõttu. Seetõttu tekib kahjustus teie nahk ..

teie maks sest teie immuunsüsteem teie maksarakke rünnak maksarakud Põletik.

ümber alates kude ümber de torud sisse teie neerud. Selle tõttu hakkavad teie neerud vähem hästi töötama.

See ravim võib mõjutada olla neerudele tulemused alates mõned uuringud glükoosi kohta teie uriinis.

Teatamine kõrvaltoimetest alates kõrvaltoimed

Kas teil tekivad kõrvaltoimed , võtke ühendust oma arstiga, apteekriga või õega õde. See kehtib ka järgmiste kõrvaltoimete puhul, mis ei ole selles infolehes loetletud. Te võite kõrvaltoimetest ka teatada läbi Hollandi Kõrvaltoimete Keskus Lareb, veebisait: www.lareb.nl. Tehes kõrvaltoimed te teatada, aitate te meid et rohkem teavet saada selle ohutuse kohta selle ravimi ..

5. Kuidas säilitab te seda ravimit?

Hoida nähtavusest ja kättesaamatus laste kaugusel ..

seda ravimit enam pärast aegumiskuupäeva de de aegumiskuupäev kõlblikkusaeg. See leiate karbilt karp ja blisterpakendil blisterpakend pärast EXP. Seal on kuu kuu ja aasta aasta. Viimane viimane päev kuu kuu on viimane kõlblikkusaeg.

Hoida alla 25 °C.

Ärge loputage ravimeid mitte kraanikausist või tualetist ja visake neid mitte ei in de prügikast. Küsige oma apteekrilt mida teha ravimitega peate tegema mida te enam ei kasuta. Kui te ravimid õigel viisil kõrvaldama väljutab hävitatakse nad õigel viisil ja ei sattu keskkonda . 6. Pakendi sisu.

6. teave . pakend ja muud teave

Millised ained sisaldavad selles ravimis ?Toimeaine selles ravimis on nitrofurantoiin . Nitrofurantoiin Activase 50 mg.

Nitrofurantoiin Activase 50 mg kõvad kapslid: Iga kõva kapsel sisaldab 50 mg nitrofurantoiin. Nitrofurantoiin Activase 100 mg kõva kapslid: Iga kõva kapsel sisaldab 100 mg nitrofurantoiin.

Teised muud ained sisse selles ravimis on talk, maisitärklis ja laktoosmonohüdraat. Kapsli kest kapsli kohta sisaldab želatiini, titaandioksiidi (E 171) ja kollast raudoksiidi (E 172).

Kuidas näeb Nitrofurantoiin välja ja mis sisaldub pakendis ? Nitrofurantoiin50 mg kõvad kapslid on kollase korgiga ja elevandiluu-kollased dop ja elevandiluu-kollane korpus. Kapslid sisaldavad kollane kuni kollakasvalge pulber. Nitrofurantoiin 100 mg kõvad kapslid on ühe elevandiluu-kollane kork ja korpus. Kapslid sisaldavad kollane kuni kollakasvalge pulber.

Nitrofurantoiin on saadaval sisse blisterpakendites 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 84 või 90 kõva kapslit.

On võimalik et mitte kõik pakendisuurused on turul olemas toodud.

Omanik alates luba jaoks turule viimine toomine ja tootja

Lubaomanik:
Activase Pharmaceuticals Limited
11 Boumpoulinas,
P.C. 1060, Nicosia
Küpros

Tootja:
Elara Pharmservices Europe Limited
Regus Block 1, Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15,
D15 AKK1
Iirimaa

Registris registreeritud all
Nitrofurantoiin Activase 50 mg kõvad kapslid: RVG 131639

Nitrofurantoiin Activase 100 mg kõvad kapslid: RVG 131640

See ravim on registreeritud järgmistes liikmesriikides Euroopa Majanduspiirkonna riikides all järgmiste nimede all järgmiselt:

Iirimaa	Nitrofurantoin 50 mg kõvad kapslid en Nitrofurantoin 100 mg kõvad kapslid
Holland	Nitrofurantoiin Activase 50 mg kõvad kapslid & Nitrofurantoiin Activase 100 mg kõvad kapslid
Belgia	Nitrofurantoin Activase 50 mg kapsel & Nitrofurantoin Activase 100 mg kapsel
Portugal	Nitrofurantoiin 50 mg Kapsel & Nitrofurantoiin 100 mg Kapsel
Sloveenia	Nitrofurantoin Activase 50 mg kapsel & Nitrofurantoin Activase 100 mg kapslid

See pakendi infoleht on viimati heaks kiidetud novembris 2025 Lehekülg 1 /