

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle de käyttäjälle  
Nitrofurantoiini Activase 50 mg kova kapselit  
Nitrofurantoiini Activase 100 mg kova kapselit  
nitrofurantoiini

Lue huolellisesti koko pakkausseloste ennen sinä tätä lääkettä käytät , koska siinä on tärkeää tietoa sinulle. Säilytä tämä pakkausseloste

- . Ehkä tarvitset. myöhemmin . sinua myöhemmin uudelleen tarvitsee.
- Onko sinulla vielä kysymyksiä? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkiin.
- Älä anna tätä lääkettä ei muille päällä henkilöille, koska se on vain sinulle määrätty . Se voi olla haitallista muille , vaikka heillä olisi samat oireet kuin sinulla. sama oireet kuten u.
- Saatko sinä haittaa jostakin yhdestä seuraavista sivuvaikutuksista jotka on kohdassa 4 mainittu? Tai saatko sinä sivuvaikutuksen joka ei ole tässä pakkausselosteessa pakkausseloste tila? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkihenkilökunta.

Sisältö tästä esitteestä Mitä on

1. Nitrofurantoiini Activase ja mihin tätä lääkettä käytetään lääke käytetty?
2. Milloin et saa tätä lääkettä käyttää tai täytyy sinun olla erityisen varovainen sen kanssa olla ?Kuinka
3. otat tämän lääkkeen sisään? lääke sisään?
4. Mahdolliset sivuvaikutukset
5. Kuinka säilytät tämän lääkkeen ?Sisältö
6. pakkauksen ja muut tiedot 1. Mikä on

1. Activase ja mihin sitä käytetään käytetään tätä lääkettä käytetään?

Nitrofurantoiini on vaikuttava aine tässä lääkkeessä .. on lääke tulehduksia vastaan tulehduksia aiheuttamia kautta yksi bakteeri (antibiotti). Se käytetään hoitoon varten hoito hoito infektioita infektioita sinun virtsatiet ja virtsarakko . Sekä käytetään myös myöskin käytetään jotta et varmista että et näitä infektioita saa ..

sinusta olevan hoidon aikana tai jälkeen hoidon et ei parempi? Tai tuntuuko teistä huonompi ? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi. 2. Milloin 2. tätä lääkettä käyttää tai pitää olla erityisen varovainen täytyy sinä olet ylimääräinen varovainen mukaan ovat?

Milloin saatte tätä lääkettä ei käyttää?

Olette allerginen nitrofurantoiinille tai jollekin aineelle tässä valmisteessa olevista aineista tämä lääke.

Nämä aineet voit löydät kohdasta sisään 6 tästä selosteesta ..

allerginen muut nitrofuraanit . nitrofuraanit.

Sinun lääkäri on sinulle kertonut että munuaisesi eivät toimi hyvin (eGFR alle 45 ml per minuutti ).Olet

viimeisessä vaiheessa raskaudessasi alkaen sinun raskaus (de synnytys).

Te ette saa tätä lääkettä käyttää vauvoille alle kolmen kuukauden ikäisille . Teiltä puuttuu.

joka on glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasi että glukoosi-6-

fosfaattidehydrogenaasi kuuma. Tämän vuoksi voivat sinun punaiset verisolut

helpommin vahingoittua. Tämä esiintyy useammin kanssa mustilla ihmisillä ja ihmisillä Välimeren alueelta peräisin olevilla, Keski-itämainen tai aasialainen tausta. Lääkärisi tietää tämän tietää ..

on sairaus nimeltä porfyria , porfyria kuuma, yksi ryhmä verisairauksia jotka sinun hermosto, iho tai molemmat vahingoittavat.

Sinulla on oireita keuhkoissasi , maksassa tai hermoissa, maksa tai hermot ollut (perifeerinen neuropatia) kun otti nitrofurantoiinia tai muita nitrofuraaneja . Epäiletkö.

yllä mainituista kohdista alkaen yllämainittu pisteet? Kerro se lääkärillesi. Milloin sinun

tulee olla erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa ? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkihenkilökuntaan ennen kuin farmaseutti ennen u tämä lääke ottaa jos:

sinulla diabetes on (diabetes).

sinulla ongelmia munuaistesi kanssa on . Sinuntäytyy sitten mahdollisesti mahdollinen extra tarkistetaan lääkärisi toimesta sinun lääkäri aikana hoidon hoito.

sinulla on on ei ei tunnetta tai yksi heikko tunne sisällä sinun käsivarret ja jalat (perifeerinen neuropatia).

sinulla anemia on. Tämä aiheuttaa vähemmän punasoluja verisolutkalpea iho ,, yksi heikko tunne ja hengästynyt olla. Tai jos te liian vähän vitamiini B tai yksi poikkeava määrä suolaa veressäsi teidän veressä on. Teidän lääkäri voi antaa neuvoja antaa. te aikaisemmin allergisia reaktioita on ollut.

Yllä mainitut kohdat voivat de mahdollisuus lisätä op yksi sivuvaikutus joka aiheuttaa vahinkoa hermoillesi . Tämä voi aiheuttaaettä asiat tuntuvat erilaisilta asioita toisin tuntea of huolehtia aiheuttaa kihelmöintiä.

sinä yksi sairaus sisällä sinun keuhkot, maksa tai hermosto on.

täytyy sinun tämä lääke ennen yksi pari kuukautta käyttää? Sitten haluaa teidän lääkäri ehkä säännöllisesti tarkistaa kuinka hyvin teidän keuhkot ja maksa toimivat. Varsinkin jos u vanhempi olette.

tämä lääke voi myös aiheuttaa keuhkosairauden potilailla jotka eivät aiempaa vauriota keuhkoissa ole on keuhkojen ole on ollut. Keuhkosairaus voi esiintyä potilailla jotka saavat lyhyen tai pitkän hoidon hoito sinulla.

on joka johtuu kuolema tulee aiheuttaa kautta yksi bakteeri nimeltään clostridium difficile kutsutaan.

sinä muut lääkkeet vastaan bakteereja käyttää.

sinulla on on väsynyt oleminen ,, keltainen väri alkaen sinun iho tai silmät, kutina, ihottuma, nivelkipu, oireet sisään sinun vatsa, pahoinvointi ovat, oksentelu, ei ruokahalua, tumma virtsa ja vaalea tai harmaa uloste. Nämä voivat olla oireita sairaudesta tauti sairaus sisään sinun maksa.

tämä lääke voi vaikuttaa olla tulokseen tutkimus glukoosin tutkimukset glukoosi sinun virtsa. Tuloksen tulos voi tämän vuoksi väärä-positiivinen olla.

Jotkut mustat ihmiset ja ihmiset alkaen Välimeren, itämaiset tai aasialaiset taustaiset voivat hoidon aikana saada anemiaa .. Kuulutko sinä tähän ryhmään ? Jakoetko sinä hoidon aikana oireita kuten väsymys ,huimaus ja hengenahdistus olevat ? Lopeta sittenlääkkeen otto -sta tätä lääkettä. Ota myös yhteyttä lääkäriisi. lääkäri

Käytätkö sinä vielä muita lääkkeitä?

Käytätkö sinä lisäksi Nitrofurantoiinia Activasea vielä muita lääkkeitä, on te että äskettäin tehnyt tai aiotteko te tätä ehkä pian tehdä? Kerro että sitten sitten sinun lääkäri tai apteekkari. Käytätkö sinä yhtä seuraavista lääkkeistä yhdessä Nitrofurantoiinin kanssa Activase? Sitten voivat nämä lääkkeet toimia eri tavalla alkaa toimia. Tai voi Nitrofurantoiini Activase muuten alkaa toimia:

Magnesiumtrisilikaatti. Tämä on yksi mahahappoa neutraloiva aine. Tämä lääke käytetään kun se sulaa sulattaa syömisestä sinun keho ei hyvin menee.  
Lääkkeet vastaan yksi tulehdus nivelessä yksi nivel kanssa kipu (kihti). Esimerkiksi probenesidi of sulfipyrazoni.  
Lääkkeet jotka aiheuttavat että ruoka pysyy pidempään mahassasi. Esimerkiksi. Lääkkeet vastaan  
Lääkkeet yksi yksi laji kaihi (glaukooma). Kuten hiilihappoanhydraasin estäjät. Esimerkiksi asetatsolamidi.  
Lääkkeet jotka tekevät virtsasi vähemmän happamaksi (virtsan- alkalisoivataineet). Esimerkiksi yksi kaliumsitraattiseos.  
Lääkkeet infektiota vastaan (kinolonit).  
Lavantaudirokote kun se suun kautta otetaan ..

sinun täytyy kiinnittää huomioida ruoan kanssa ja juominen?  
Tämä lääke tulee ruoan tai maidon ottaa. Tämä auttaa varmistamaan että ettei huolehdi että te ei mahavaivat saa. Se tulee myös auttamaan kun tämä imeytyy alkaen tämä lääke.

#### Raskaus ja imetys

Oletteko raskaana, luulette u raskaana olla olemassa, haluatko raskaaksi tulla tai imetätkö u imetät? Ota yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin ennen kuin u tätä lääkettä käytät.

#### Raskaus

Niin pitkälle kuin tiedetään voi tätä lääkettä käyttää raskauden aikana käyttää. Sitä ei saakäyttää käytettäväksi käytettäväksi käytettäväksi synnytyksen aikana. Käyttö alkaen tätä lääkettä synnytyksen aikana voi vaikuttaa vaikutus vauvaasi päällä (katsokas kohta 'Milloin saa voitko tätä lääkettä ei käyttää?' yllä).

#### Imetys

Haluatko imettää antaa? Ota sitten ensin yhteyttä sinun lääkäriin. Tämä lääke erittyy rintamaitoon äidinmaito. Tämä voi olla vaarallista vauvoille alle 3 kuukautta vanhoille vauvoille. Se voi myös olla vaarallista vauvoille jotka eivät omista tiettyä entsyymiä ole olemassa.

#### Ajamiskyky ja koneiden käyttö koneista

Tämä lääke voi aiheuttaa että tunnet itsesi huimaavaksi ja uneliaaksi. Älä aja. Aja ei auto ja käytä ei koneita jos te tästä kärsitte on. Odota kunnes nämä oireet ovat poissa taas.

#### Tämä lääke sisältää laktoosia ja natriumia

Onko teidän lääkäriinne kertonut että te joitakin sokereita ette siedä? Ota sitten yhteyttä teidän lääkäriinne ennen kuin tätä lääke ottaa.

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli, mikä tarkoittaa että se on käytännössä 'natriumvapaa'.

#### 3. Kuinka ottaa te tämä lääke sisään?

Käytä tätä lääkettä aina tarkalleen kuten sinun lääkäri tai apteekkari sinulle sen on kertonut. Epäiletkö sinä siitä oikeasta käytöstä? Ota yhteyttä teidän lääkäriin tai apteekkariin.

Noudata erittäin hyvin ohjeita käyttöohjeet lääkäritäsi. Suorita teidän hoitajakso loppuun . Myös jos te tunnette itseään parempi tuntee.

Suosittelun annos

Aikuiset ja lapset yli 10 vuotta:

Tavallinen annostus riippuu siitä minkä tyyppinen infektio infektio että sinä on. Ohjeet käyttöohjeet täytyy olla kirjoitettu etiketissä etiketti että sinun apteekkari sinulle antaa. Ota yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin jos nämä käyttöohjeet ei selkeä ovat.

Normaali annokset ovat ::

hoitoon : 1 kapseli 50 mg 4 kertaa päivässä ennen kerta per päivä varten 7 päivää

Hoitoon hoito vakavia vakavia infektioita jotka eivät poistu ja jatkuvasti palaavat: 1 kapseli 100 mg 4 kertaa päivässä 7 päivää 7 päivää

Jotta varmistetaan ettei saa muita infektioita muu ennen nukkumaanmenoa Jotta varmistetaan ettei saa

muita infektioita huolehtia tämä sinä ei infektiot saa aikana yksi leikkaus: 1 kapseli 50 mg 4 kertaa per päivä leikkauspäivänä päivä leikkauksen jälkeen leikkaus ja kolme 3 sen jälkeen ..

Käyttö mehiläisen lapset ja vauvat yli kuin 3 kuukautta:

Annos riippuu lapsen painosta. Lääkäri määrittää annoksen. Sinun lääkäri määrittää annoksen annos. Noudata erittäin hyvin ohjeita käyttöohjeet lääkärisi sinun lääkäritäsi. Käyttö käyttö tätä tätä lääkettä (yksi kapseli) ei mahdollisesti ei hyvin kanssa nuorempi lapset. Muita muotoja tästä tästä lääkkeestä voivat olla parempia. Kuten nestemäinen .. sinä? Ota sitten yhteyttä sinun sinun lääkäri apteekkari.

Käyttö alle lapsilla nuoremmat kuin 3 kuukautta:

Lapset nuoremmat kuin 3 kuukautta eivät saa tätä lääkettä käyttä.

Antotapa alkaen anto

Tämä lääke tulee aina ruoan tai maidon kanssa ottaa. Lääke toimii silloin paremmin .. tulee kokonaisina koko tulla niellä. Unohda sinun lääke ei sisään ottaa ..

tarkastukset Sinun

lääkäri tulee erittäin hyvin kiinnittää huomiota kirjeet päällä mahdolliset vaikutukset päällä maksaanne , keuhkoihin, vereen tai hermostoon. Tämä lääke voi vaikuttaa olla tuloksiin tulokset joissakin tutkimuksissa tutkimukset glukoosin teidän virtsassa.

Onko te liian paljon tätä lääkettä ottanut ? Ota

heti yhteyttä teidän lääkäriin tai apteekkariin . Tai menesinne kohti de päivystysosasto van het sairaala in de läheisyydessä.

Ota aina kapselit mukaan, jotka sinulla vielä jäljellä on. Ota myös pakkaus ja etiketti se etiketti mukaan. Näin tietää se lääketieteellinen henkilökunta mitä olette ottanut ..

unohtanut tämän lääkkeen ottaa ? Muistatko sen myöhemmin päivän

aikana sinua myöhemmin päivään? Ota sitten annos alkaen sinä päivä kuten normaalisti. Onko sinulla yksi annos koko päivän unohtunut? Ota sitten normaali annos seuraavana päivänä sisään. Ota ei kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen annoksen sisään kiinni. Epäiletkö sinä? Ota sitten yhteyttä. lääkäriin tai apteekkariin sinä lääkäri farmaseutti.

Jos lopetat käytön tämän lääkkeen kanssa tämän lääkkeen  
Lääkärisi kertoo sinulle kuinka kauan sinun tulee käyttää tätä lääkettä ottaa käyttää. Lopeta ei aikaisemmin kuin sinulle kerrotaan. Myöskään ei jos tunnet paremmalta. Onko sinulla.

muuta kysymyksiä käytöstä muu kysymykset yli käyttö -sta tämä lääke? Ota yhteyttä sinun lääkäriin, apteekkariin tai sairaanhoitajaan.

#### 4. Mahdolliset sivuvaikutukset

Kuten jokainen lääke voi myös tämä lääke sivuvaikutukset olla. Ei kaikki saa niiden kanssa tekemistä.

Useimmat suurin osa sivuvaikutuksista ovat lieviä. Ne menevät pois kun te sinä lopettaa käytön käyttö tästä tästä lääkkeestä.  
Kaikki lääkkeet voivat allergisia reaktioita aiheuttaa. Mutta vakavat allergiset reaktiot ovat melkein koskaan varten. Onko sinulla äkillinen yksi vinkuva hengitys, ongelmia hengittää, turvotus silmäluomiesi, kasvot tai, kasvot of huulet, ihottuma tai kutina (erityisesti koko kehosi)? Lopeta sitten tämänlääkkeen ottaminen. Mene myös hetilääkäriin luo tai sairaalaan yksi lääkäri.

Saatteko haittavaikutuksia yksi seuraavista alla olevista haittavaikutuksista? Lopeta sitten käyttö tätä lääkettä. Otamyös yhteyttä teidän lääkäriin. Yksi

ryhmä ryhmä verisairaudet jotka teidän hermosto, iho, tai molemmat vahingoittuneet (akuutti porfyria).

Teidän keuhkot voivat reagoida nitrofurantoiinille. Tämä voi nopeasti, sisällä yksi viikko hoidon alkamisen jälkeen tapahtua. Se voi myös hyvin hitaasti kehittyä.. vanhemmilla potilailla vanhempi potilaat. Tämä voi aiheuttaa kuumetta, vilunväristyksiä, yskimistä, hengenahdistusta, pyörtymistä taisinertävä väri iholla yksi sininen väri alkaen sinun iho. Voi olla arpia syntyy johtuen vaurio kudoksen kudoksessa keuhkoissasi. Keltatauti.

maksatulehdus joka aiheuttaa keltaisen värin iholle väri alkaen sinun iho tai silmänvalkuainen aiheuttaa). Sinun maksa voi myös vähemmän hyvin alkaa toimia (maksavaurio). Tämä voi kuolettava ovat.

Selkäytimen hermot selkärangan ulkopuolella teidän selkäydin voivat vahingoittaa. Tämä voi aiheuttaa muutoksia tunteessa ja käytössä tunne ja käyttö - sinun lihakset. hoito täytyy lopettaa ensimmäisten merkkien - ensimmäinen oireet - yksi kihelmöivä tunne tai ei tunne - sinun kädet tai jalat. Voit saada myös ongelmia kärsiä päänsärystä, äärimmäisistämielialan muutoksista tai henkinen terveys, olla sekaisinolla, yksi yksi heikko tunne ja sumea näkö. Nämä oireet voivat olla vakavia. Joissakin tapauksissa ne eivät koskaan poistu. Korkeammat.

Korkeampi paine sisään sinun kallo. Tämä aiheuttaa vakavaa päänsärkyä.. tai violetti väri sinun iho johtuen liian vähän hapetta veressä puutetta happi sisään sinun veresi. Tämä sairaus kutsutaan syanoosi.

Oireet alkaen kuume, flunssa, vatsakipu, ripuli, veri sisään sinun uloste ja heikko tunne . Tämä voi olla oireita ovat sairaudesta yksi joka kuolema kutanen vaskuliitti kutsutaan. Oireet alkaen keltaisuus, väsymys olla, vatsakipu, nivelkipu ja turvotus. Tämä voi olla ovat sairauden yksi joka auto-immuunihepatiitti kuuma.

Huomaa huomioon että että sinun virtsa tummankeltainen tai ruskea voi tulla käytön aikana tämän tämän lääkkeen. Tämä on täysin normaalia. Tämä on ei syy lopettaa käyttämästä tätä lääkettä . Muut sivuvaikutukset voivat.

: Harvoin ( esiintyvät:

Harvoin (tulevat ennen sivuvaikutukset alle 1 tuhannesta käyttäjästä)

Vaurio luuytimessä teidän luuydin. Tämän seurauksena saatte te liian vähän punasoluja punaisia verisoluja(anemia)).

Ei tunnettu (voida käytettävissä olevien tietojen perusteella ei voida määrittää)

Joillakin potilailla ovat verisolut vaurioituneet . Tämä voi. Tämä voi mustelmia aiheuttaa sinisiä kohtia, hitaampi veren hyytyminen, kurkkukipu, kuume, anemia ja nopeammin vilustuminen saada tai of yksi flunssa olla joka ei mene pois.

Pahoinvointi olla

Ripuli (löysä uloste)

Ei ruokahalua, vatsakipu ja oksentelu

Jotkut potilaat saivat haittaa erilaisia tyyppisiä ihottumaa tai iho-ongelmia. On olemassa myös tapauksia raportoitu alkaen vakavasta tulehduksesta tulehdus ihon ja ja muut osat kehosta allergia lääkkeelle ( DRESS-oireyhtymä ). Voit kokea hilseilyä ihollasimuillakehon alueilla allergian vuoksi lääkkeelle ( DRESS-oireyhtymä ). iho, punainen ihottuma tai kuume yhdessä kanssa yksi nopea sydämenlyönti ja vakava ihottuma rakkuloilla . Muitaoireita voi olla :: tulehdus alkaen sylkirauhaset (jotka kasvokipu aiheuttavat), tulehdus alkaen haima (joka voimakas vatsakipu aiheuttaa aiheuttaa nivelkipu nivel tulehdus.

De hermot ulkopuolella sinun selkäydin voi vahingoittaa. Tämä voi aiheuttaa muutoksia tunteessa ja käytössä lihaksiesi ja käytössä lihaksiesi . lihakset. Lisäksi voit saada kärsiä alkaen päänsärky, äärimmäiset mielialan muutokset tai henkinen terveys (psykoosi), olla sekaisin oleminen, heikko tunne ,, liikkeitä kanssa sinun silmät tehdä ilman että sinä että itse haluat (mikä aiheuttaa sinun silmä nopeasti edestakaisin ja takaisin, ylös ja alas tai sisään yksi ympyrä voi liikkua ja te sumea voida nähdä). Nämä oireet voivat erittäin olla. Joissakin tapauksissa tapaukset mennä he eivät koskaan enää pois.

Väsyyntä olla, kylmä väritykset ja kuume lääkkeiden vuoksi lääkkeet

Nopea menetys hiusten hiukset

Infektio alkaen teidän virtsatiet kautta taudinaiheuttajat jotka eivät herkkiä ovat nitrofurantoiinille nitrofurantoiini.

seinämien pienet verisuonet . Tämä aiheuttaa. Tästä syystä syntyy vahinko kohteeseen sinun iho.

Tulehdus sinun maksa koska sinun immuunijärjestelmä sinun maksasolut hyökkää .. kudokset ympärillä kudokset ympärillä de putket in teidän munuaiset. Tämän vuoksi alkavat teidän munuaiset vähemmän hyvin toimia.

Tämä lääke voi vaikuttaa olla de tulokset alkaen joissakin tutkimuksissa glukoosista sinun virtsassa.

Ilmoittaminen haittavaikutuksista Jos sinulla on

haittavaikutuksia , ota yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai hoitajaasi farmaseutti tai sairaanhoitaja. Tämä koskee myös niitä haittavaikutuksia jotka eivät ole tässä pakkausselosteessa mainittu. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös verkkosivuston kautta osoitteessa Suomen Haittavaikutus Keskus Lareb, verkkosivusto: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Ilmoittamalla haittavaikutukset ilmoittaa auttaa, auttaa teitä meitä saamaan lisää tietoa saada lääkkeen turvallisuudesta tästä lääkkeestä . 5..

#### 5. Kuinka säilytät sinä tätä lääkettä?

Poissa näkyvistä ja ulottuvilta lasten pidettävä ..

tätä lääkettä enää viimeisen käyttöpäivän jälkeen de viimeinen viimeinen käyttöpäivä. Tämä löytyy pakkauksesta laatikko ja läpipainopakkaus jälkeen EXP. Siellä on kuukausi ja vuosi . Viimeinen päivä vuosi. De viimeinen päivä kuukauden kuukausi on viimeinen viimeinen käyttöpäivä.

Säilytä alle 25 °C.

Älä huuhtelee lääkkeitä ei viemäriin tai pesualtaaseen tai wc:hen ja heitä niitä in de roskakori. Kysy apteekkariltasi mitä sinun tulee tehdä lääkkeiden kanssa jotka et enää käytä . Jos lääkkeethävitetään oikealla tavalla poistaminen oikein hävität tulla ne ylös yksi oikea tapa hävitetään ja pääsevät ne ei ympäristöön joutua.

#### 6. Sisältö pakkauksen pakkaus ja muut tiedot

Mitkä aineet sisältyvät tässä tässä lääkkeessä?

Vaikuttava aine tässä tässä lääkkeessä on nitrofurantoiini nitrofurantoiini.

Activase 50 mg kova kova kapselit: Jokainen kova kapseli sisältää 50 mg nitrofurantoiinia. Nitrofurantoiini Activase 100 mg kova kapselit: Jokainen kova kapseli sisältää 100 mg nitrofurantoiinia.

Muut muut aineet sisään tässä lääkkeessä ovat talkki, maissitärkkelys ja laktoosimonohydraatti. Kapselin kuori sisältää gelatiinia, titaanidioksidia (E 171) ja keltainen rautaoksidi (E 172). (E 172).

Miltä näyttää Nitrofurantoiini tai näyttää ja mitä sisältää yksi pakkaus?

Nitrofurantoiini 50 mg kova kapseli on yksi keltainen korkki ja norsunluun-keltainen runko. Kapselit sisältävät keltainen - kellertävänvalkoinen jauhe.

Nitrofurantoiini 100 mg kova kapselit ovat yksi norsunluun-keltainen korkki ja runko. Kapselit sisältävät keltainen - kellanvalkoinen jauhe.

Nitrofurantoiini on saatavilla sisään läpipainopakkauksissa joissa on 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 84 tai 90 kovaa kapselia.

On mahdollista että ei kaikki pakkauskooot ole kaupallisesti saatavilla tuotu.

Haltija myöntämis- lupa sille markkinoille saattaminen tuonti ja valmistaja

Luvan haltija:

Activase Pharmaceuticals Limited  
11 Boumpoulinas,  
P.C. 1060, Nicosia  
Kypros

Valmistaja:  
Elara Pharmservices Europe Limited  
Regus Block 1, Blanchardstown Corporate Park,  
Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15,  
D15 AKK1  
Irlanti

Rekisterissä rekisteröity alla  
Nitrofurantoiini Activase 50 mg kova kapselit: RVG 131639  
Nitrofurantoiini Activase 100 mg kova kapselit: RVG 131640

Tämä lääke on rekisteröity jäsenvaltioissa Euroopan talousalueen alla seuraavilla nimillä :

Irlanti Nitrofurantoin 50 mg kova:

Irlanti Nitrofurantoiini 50 mg kova kapselit en Nitrofurantoiini 100 mg kova kapselit

Alankomaat Nitrofurantoiini Activase 50 mg kova kapselit & Nitrofurantoiini Activase  
100 mg kova kapselit

Belgia Nitrofurantoiini Activase 50 mg kapseli & Nitrofurantoiini Activase 100 mg  
kapseli

Portugali Nitrofurantoiini 50 mg Kapseli & Nitrofurantoiini 100 mg Kapseli

Slovenia Nitrofurantoiini Activase 50 mg kapseli & Nitrofurantoiini Activase 100 mg  
kapselit

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty marraskuussa 2025 Sivu 1 /