

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui de vartotojui  
Nitrofurantoinas Activase 50 mg kietos kapsulės  
Nitrofurantoinas Activase 100 mg kietos kapsulės  
nitrofurantoinas

Perskaitykite gerai visą pakuotės lapelis prieš jūs šį vaistą pradėsite vartoti, nes jame yra svarbi informacija apie jūs. Išsaugokite

- šį pakuotės lapelį .. prireiks jo vėliau jums vėl reikės.
- Ar turite klausimų dar klausimų? Tada susisiekit su savo gydytoju arba vaistininku.
- Neduokite šio vaisto ne kitiems žmonėms kiti, nes tai yra tik jums paskirtas vaistas. Jis gali būti žalingas kitiems žmonėms ,net jei jie turi tuos pačius simptomus kaip jūs. u.
- Ar jums kyla vienas iš šalutinių poveikių nurodytų skyriuje 4 ?Arba jums kyla šalutinis poveikis kuris nėra šiame lapelyje paminėtas ? būklė? Tada susisiekit su savo gydytoju arba vaistininku.

Turinys šio lapelio Kas yra

1. Nitrofurantoinas Activase ir kam šis vaistas naudojamas šis vaistas?
2. Kada negalite šio vaisto vartoti arba turite būti ypač atsargūs su juo ? Kaipvartoti
3. šį vaistą ? šis vaistas į?
4. Galimos šalutinės reakcijos
5. Kaip laikyti jūs šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija 1.

1. Nitrofurantoinas Activase ir kam naudojamas yra šis vaistas naudojamas?

Nitrofurantoinas yra veiklioji medžiaga šiame vaistą .. yra vaistas nuo uždegimų sukeltų infekcijų dėl vienas bakterija (antibiotikas). Jis naudojamas gydyti už gydymui gydymas infekcijų infekcijos jūsų šlapimo takų ir šlapimo pūslės . Jisnaudojamas taip pat taip naudojamas kad užtikrinti kad jūs šias infekcijas ne gautumėte ..

jūs blogai gydymo metu arba po gydymo ne ? geriau? Ar jaučiatės jūs blogiau ? Tada susisiekit susavo gydytoju. 2.

2. negalite šio vaisto vartoti ar turite būti ypač atsargūs su juo atsargiai su yra?

Kada galite šio vaisto ne vartoti?

Jūs esate alergiškas nitrofurantoinui arba vienai iš medžiagų esančių preparate į šis vaistas.

Šias medžiagas galite jūs rasti skiltyje skyriuje 6 šioje šio pakuotės lapelyje.

Jūs esate alergiškas kitiems nitrofuranam nitrofuranei.

Jūsų gydytojas pasakė jums kad jūsų inkstai neveikia gerai (eGFR mažiau nei 45 ml per minutę (eGFR mažiau nei 45 ml per Jūs esatepaskutiniame etape savo nėštumo nuo jūsų nėštumas (de gimdymas).

Jūs galite šio vaisto ne naudoti kūdikiams jaunesniems nei trijų mėnesių ..

fermento kuris gliukozės-6-fosfato dehidrogenazė tas gliukozės-6-fosfato dehidrogenazė vadinamas. Dėl to gali jūsų raudonieji kraujo kūneliai lengviau pažeisti. Tai pasitaiko dažniau tarp juodaodžių žmonių ir žmonių iš Viduržemio jūros regiono, Vidurio-Rytų arba Azijos kilmės. Jūsų gydytojas tai žinos ..

turite ligą vadinamą porfirija , porfirija karštas, viena grupė kraujo ligų kurios jūsų nervų sistemą, oda arba abu pažeidžia.

Jūs turite skundų dėl jūsų plaučių, kepenų ar nervų patyrė (periferinė neuropatija) po vartojimo nitrofurantoino ar kitų nitrofuranų . Abejotina.

vieno iš aukščiau minėtų punktų ?? Pasakykite tai savo gydytojui. Kada

turite būti ypač atsargūs su šiuo vaistu ? Susisieki su savo gydytoju arba vaistininku prieš vaistininkas prieš u šį vaistą vartojate jei:

jūs sergate cukriniu diabetu turite (diabetas).

jūs problemų su savo inkstais turite. Jūs turite tada galbūt papildomai tikrinami kontroliuojami per jūsų gydytoją gydymo metu gydymą.

jums pasireiškia jaučiate dėl nėra jautrumo arba silpnas jautrumas jausmas rankose jūsų rankos ir kojos (periferinė neuropatija).

jūs anemija turite. Tai sukelia mažiau raudonųjų kraujo kūnelių, blyški oda, vienas silpnas jausmas ir dusulys būti. Arba jei jūs per mažai vitamino B arba vienas nenormalus kiekis druskos kraujyje jūsų kraujyje turi. Jūsų gydytojas gali jums patarimą duoti.

jūs anksčiau alergines reakcijas turėjote ..

paminėti punktai gali būti de tikimybė padidinti į vieną šalutinį poveikį kuris sukelia žalą jūsų nervams . Tai galisukelti kad dalykai jaučiasi kitaip kitaip jausti iš rūpintis dėl dilgčiojimas.

jūs vienas liga į jūsų plaučiai, kepenys ar nervų sistema turite.

reikia jūs šis vaistas prieš vieną porą mėnesių naudoti? Tada norės jūsų gydytojas galbūt reguliariai tikrinti kaip gerai jūsų plaučiai ir kepenys veikia. Ypač jei u vyresnis esate.

šis vaistas gali taip pat sukelti plaučių ligą pas pacientus kurie neturi ankstesnio pažeidimo plaučių neturi plaučių turėti patyrė. Plaučių liga gali pasireikšti pas pacientus kurie trumpą arba ilgą gydymą gauna ..

viduriavimą turite kuris yra sukeltas sukelia dėl bakterija bakterija vadinama clostridium difficile vadinama.

jūs kitus vaistus nuo bakterijų vartojate.

jūs jaučiate jaučiate dėl nuovargio būti, geltona spalva jūsų odos arba akių ,niežulys ,odos bėrimas odos bėrimassąnarių skausmas sąnarių skausmasskundai pilve , pykinimas pilvas, pykinimas būti, vėmimas, nėra apetito, tamsus šlapimas ir blyškios arba pilkos išmatos. Tai gali būti simptomai būti ligos vienas liga į jūsų kepenis. šis vaistas gali paveikti turėti rezultatą rezultatas tyrimų gliukozės jūsų šlapime. Rezultatas gali dėl to būti klaidingai teigiamas yra.

Kai kurie juodaodžiai žmonės ir žmonės iš Viduržemio jūros, rytų ar Azijos kilmės gali gydymo metu anemiją patirti .. Priklauso jūs šiai grupei ? Ir jaučiate jūs gydymo metu diskomfortą dėl nuovargio ,galvos svaigimo ir dusulio būti ? Tada nutraukite vartojimą vartoti iš šio vaisto. Taip pat susisieki su savo gydytoju.

Vartojate jūs dar kitus vaistus?

Vartojate jūs be Nitrofurantoino Activase dar kiti vaistai, turite jūs tai trumpai neseniai padarėte ar ketinate jūs tai galbūt netrukus daryti? Pasakykite tai tada jūsų gydytojas arba vaistininkas. Vartojate jūs vieną iš šių vaistų kartu su Nitrofurantoinu Activase? Tada gali šie vaistai kitaip veikti veikti. Arba gali Nitrofurantoinas Activase kitaip pradėti veikti:

Magnio trisilicatas. Tai yra skrandžio rūgšties neutralizatorius . Šis vaistas yra naudojamas kaip jis virškinti virškinti valgymo metu jūsų kūnas ne gerai vyksta. Vaistai nuo uždegimo sąnaryje su skausmu ( podagra ). Pavyzdžiui podagra). Pavyzdžiui probenecidas iš sulfinpirazonas. Vaistai kurie užtikrina kad maistas ilgiau skrandyje jūsų liktų .. atropinas arba hioscinas. Vaistai nuo vieno vienas rūšis katarakta (glaukoma). Kaip karboanhidrazės inhibitoriai. Pavyzdžiui acetazolamidas. Vaistai kurie jūsų šlapimą mažiau rūgštų padaro (šlapimo-šarminantys preparatai). Pavyzdžiui vienas kalio citrato mišinys. Vaistai nuo infekcijų (chinolonai). Vidurių šiltinės vakcina kai ji per burną yra vartojama.

Į ką reikia jūsų atkreipti dėmesį su maistu ir gėrimais?

Šis vaistas turi būti su maistu arba pienu vartojamas . Taip padeda užtikrinti, kad nepamirštumėte pasirūpinti kad jūs nepatirtumėte skrandžio skausmai gauna. Tai padės taip pat padėti prie šio įsisavinimo šio šio vaisto.

Nėštumas ir žindymas

Ar esate nėščia, galvojate u nėščia būti esate, norite nėščia tapti ar žindote jūsų krūtimi? Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką prieš jūsų šį vaistą vartojate.

Nėštumas

Kol žinoma gali šis vaistas nėštumo metu būti naudojamas . Jis negali būtinaudojamas gimdymo metu naudojamas per de gimdymas. Naudojimas nuo šio vaisto gimdymo metu gali turėti poveikį turėti jūsų kūdikiui ( žr.žiūrėti skyrių ' Kadanegalite }} šio vaisto nevertoti ?'aukščiau ). Žindymas

Ar norite

žindyti ? Kreipkitės pirmiausia į savo gydytoją. Šis vaistas patenka į motinos pieną į motinos pienas. Tai gali būti pavojinga kūdikiams jaunesniems nei 3 mėnesių. Tai gali taip pat būti pavojinga kūdikiams kurie neturi tam tikro fermento tipo ne turi.

Vairavimo gebėjimai ir het naudojimas mašinų

Šis vaistas gali sukelti jums jausmą kad jūs jaučiatės apsvaigęs ir mieguistas. Vairuokite nėra auto ir valdyti nėra mašinas jei jūs čia kenčiate nuo turite. Palaukite, kol šie simptomai vėl išnyks yra.

Šis vaistas sudėtyje yra laktozės ir natrio

Ar jūsų gydytojas jums pasakė kad jūs kai kurių cukrų netoleruojate ? Tada susisiekitė su savo gydytoju prieš jūsų šį šis vaistas vartojate.

Šis vaistas turi mažiau nei 1 mmol natrio (23 mg) vienoje kapsulėje, tai reiškia kad jis iš esmės ' be natrio' yra.3.

3. vartoti jūs u šį vaistą į?

Vartokite šį vaistą visada tiksliai kaip jūsų gydytojas ar vaistininkas jums tai pasakė .. ar dėl teisingo teisinga naudojimas? Tada susisiekitė su jūsų gydytoju arba vaistininku.

Laikykitės labai gerai de naudojimo instrukcijų iš jūsų gydytojo. Užbaikite gydymo kursą . Net jei jūs jaučiatės savęs geriau jaučiasi.

Rekomenduojama dozė

Suaugusieji ir vaikai vyresni nei 10 metų:

Įprasta dozė priklauso nuo infekcijos tipo tipas infekcija kad jūs turite. Naudojimo instrukcijos turi būti parašytos ant etiketės kad jūsų vaistininkas jums duoda. Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką jei šių naudojimo instrukcijos ne aiškios yra.

Įprastos dozės yra ::

gydymui : 1 kapsulė po 50 mg 4 kartus per dieną prieš per diena už 7 dienų  
Skirta gydymui sunkių infekcijų kurios nepranyksta ir nuolat atsinaujina : 1 kapsulė po 100 mg 4 kartus per dieną 7 dienas už 7 dienas  
Kad užtikrinti kad jūs ne gautumėte kitų infekcijų gaunaprieš miegą Kad užtikrinti kad jūs ne gautumėte infekcijų nėra infekcijos gauna operacijos metu vieną operaciją: 1 kapsulė po 50 mg 4 kartus per dieną operacijos dieną ir po operacijos ir 3 3 po to.

Naudojimas prie vaikams ir kūdikiams vyresniems nei 3 mėnesiai:

Dozė priklauso nuo vaiko svorio . Jūsų gydytojas nustato dozę de dozė. Sekite labai gerai instrukcijas naudojimo savo gydytojo. menas.

Vartojimas šio vaisto ( kapsulė) galine visiškai tiktai gerai gerai prie jaunesnių vaikų. Kitos formos šio vaisto gali būti geresnės .. skystis . Abejotina. Susisieki su savo gydytoju jūsų menas vaistininkas.

Naudojimas vaikams jaunesniems nei 3 mėnesiai ::

jaunesni nei 3 mėnesiai neturėtų šio vaisto vartoti . naudoti.

Vartojimo būdas skyrimas

Šis vaistas turi visada su maistu arba pienu būti vartojamas. Vaistas veikia tada geriau .. reikia visą visa būti nuryti. Pamiškite jūsų vaistą ne į paimti ..

patikrinimai Jūsų

gydytojas bus labai gerai stebėti leidimas ant galimos įtakos jūsų kepenims , plaučiams, kraujuiar nervų sistemai . Šis vaistas gali turėti įtakos rezultatams kai kurių tyrimų rezultatai nuo kai kurie tyrimai gliukozės jūsų šlapime.

Ar jūs per daug šio vaisto pavartojote ? Kreipkitės

nedelsiant į savo gydytoją arba vaistininką . Arba eikite į de skubios pagalbos skyrius iš ligoninės į netoliese.

Pasiimkite visada kapsules, kurias dar turite likusias. Pasiimkite taip pat de pakuotę ir etiketę etiketė su savimi. Taip žino medicinos personalas ką jūs vartojote . Pamiškote.

vaistą išgerti laiku ? Jei prisimenate vėliaudieną

Mano jūs vėliau ant diena prie? Tada išgerkite dozę iš tą dieną kaip įprasta. Ar jūs praleidote dozę visai dienai praleidote ? Tada išgerkite įprastą dozę dozė kitą dieną į. Vartokite ne dvigubą dozę tam, kad praleistą dozę atstatytumėte . Abejotina jums? Tada susisieki su. gydytoju arba vaistininku jūsų menas vaistininkas.

Jei jūs nustojate vartoti vaistus šiuos šį vaistą

Jūsų gydytojas pasakys jums kaip ilgai šį šį vaistą turite vartoti. Nustokite ne anksčiau nei jums pasakyta. Taip pat ne jei jūs jaučiatės geriau ..

Ar jūs dar kitų klausimų apie vartojimą iš šio vaisto? Kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

#### 4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip kiekvienas vaistas gali taip pat šis vaistas šalutinis poveikis turėti. Ne visi gauna su tuo susidurti ..

dauguma šalutinių poveikių yra lengvi. Jie praeina vėl dingsta kai jūs u nutraukite su vartojimu šio šio vaisto.

Visi vaistai gali alergines reakcijas sukelti. Tačiau stiprios alerginės reakcijos pasitaiko beveik niekada prieš. Ar jūs staiga vieną švilpiantį kvėpavimą, problemų su kvėpavimu, patinimas jūsų vokų ,veido ar iš lūpos, odos bėrimas arba niežulys (ypač per jūsų visą kūną)? Tada nustokite vartoti šį vaistą . Kreipkitės taip pat nedelsiant pas į vienas gydytojas.

Atsiranda jums šalutinis poveikis vienas iš žemiau išvardytų šalutinių poveikių? Tada nutraukite vartojimą šio vaisto . Taip patsusisieki su savo gydytoju. Grupė

Vienas grupė kraujo ligos kurios jūsų nervų sistemą, oda, arba abu pažeisti (ūminė porfirija).

Jūsų plaučiai gali reaguoti į nitrofurantoiną. Tai gali greitai, per vieną savaitę nuo gydymo pradžios įvykti. Tai gali taip pat labai lėtai atsirasti. Ypač vyresnio amžiaus pacientams. Šis gali sukelti karščiavimą ,šaltkrėtį , kosulį, dusulį, nualpimą arba mėlyną spalvą iš arba mėlyną spalvą iš jūsų oda. Gali atsirasti randai dėl pažeidimo audinio plaučiuose . Geltonumas ( kepenų uždegimas, kuris.

geltoną odos ir akių spalvą ) spalva iš jūsų odos ar akies baltymo sukelia). Jūsų kepenys gali taip pat mažiau gerai pradėti veikti (kepenų nepakankamumas). Tai gali mirtinas yra.

Nervai už jūsų nugaros smegenų gali pažeisti . Tai gali sukelti pokyčius jautime ir naudojime jausmas ir tas naudojimas iš jūsų raumenų. Gydymas gydymas turi būti nutrauktas esant pirmai pirmiesiems skundams apie dilgčiojimo pojūtį ar jokie pojūčio arba į jūsų rankos arba kojos. Jūs galite taip pat patirti galvos skausmą , ekstremalius nuotaikos pokyčius arba psichikos sveikatą , būti sutrikęs būties mišęs vienas, vienas silpnas jausmas ir neryškus matymas. Šie skundai gali labai būti. Kai kuriais atvejais niekada jie ne daugiau nepranyksta.

Didesnės spaudimas į jūsų kaukolę. Tai sukelia stiprų galvos skausmą.

Mėlyna arba violetinė spalva jūsų odos dėl per mažai mažai deguonis į jūsų kraujyje. Ši liga vadinama cianoze.

Simptomai iš karščiavimo, gripo, pilvo skausmo, viduriavimo, kraujas į jūsų išmatose ir silpnas jausmas . Tai gali būti simptomai ligos kuri vadinama odine vaskulitu . vaskulitas karšta.

Skundai nuo gelta, nuovargis būti, pilvo skausmas, sąnarių skausmas ir patinimas. Tai gali būti yra ligos vienas simptomai kuri auto-autoimuninis hepatitas karšta.

Atminkite kad su manimi jūsų šlapimas tamsiai geltonas arba rudas gali tapti vartojant šį vaistą . Tai yra visiškai normalu vaistas. Tai yra labai normalus. Tai yra ne priežastis apie nutraukti sustabdyti vartojimą naudojimas šio vaisto ..

šalutiniai poveikiai gali būti ::

( pasitaiko prieš priėmimą mažiau nei 1 iš 1000 vartotojų)

Pažeidimas jūsus kaulų čiulpu .. gaunate jūs per mažai raudonųjų kraujo kūnelių kraujo ląstelės anemija).

Ne žinoma (gali su turimais duomenimis ne būti nustatyta)

Kai kai kuriems pacientams yra kraujo ląstelės pažeistos. Tai gali mėlynės dėl mėlynių ,lėtesnis kraujo krešėjimas ,gerklės skausmas ,karščiavimas ,anemija ir greičiau peršalimas gauti arba peršalimas gauti vienas peršalimas turėti kuri ne praeina .. būti Viduriavimas

( laisvosios )Nėra apetito,

pilvo skausmas ir vėmimas Kai kurie

Kai kurie pacientai gavo diskomfortą įvairių tipų odos bėrimas ar odos problemos. Yra taip pat atvejų pranešta apie sunkų uždegimą odos ir iš oda ir kitos kūno dalys dėl alergijos vaistui ( DRESS sindromas ). Jūs galite patirti pleiskanasant savo kūno dėl alergijos vaistui ( DRESS sindromas oda, raudona odos bėrimas arba karščiavimas kartu su vienas greitas širdies plakimas ir stiprus odos bėrimas su pūslelėmis. Kiti simptomai gali būti: uždegimas nuo seilių liaukų (kuris veido skausmą sukelia), uždegimas nuo kasos (kuris stiprų pilvo skausmą sukelia sukeliar sąnarių skausmas sąnarių skausmas.

De nervai už jūsus nugaros smegenys gali pažeisti. Tai gali sukelti pokyčius jausme ir naudojime raumenų tai jūsus raumenų . raumenys. Be to galite patirti galvos skausmą arekstremalius nuotaikos pokyčius ar psichinę sveikatą(psichozę )būti sutrikęs ar jaustis silpnas judesiai su jūsus akimis daryti be kad jūs to patys norite (dėl ko jūsus akis greitai pirmyn ir atgal, aukštyn ir inkstų arba į vienas apskritimas gali judėti ir jūs neryškus galite matyti). Šie skundai gali labai būti. Kai kai kuriais atvejais eiti jie niekada daugiau išvykti.

Pavargęs būti, šaltkrėtis ir karščiavimas dėl vaistų Greitas

plaukų praradimas nuo Infekcija

Infekcija nuo jūsus šlapimo takai dėl ligų sukėlėjai kurie ne jautrūs yra nitrofurantoinui nitrofurantoinas.

iš sienelių iš mažų kraujagyslių .. atsiranda atsiranda žala jūsus odai ..

jūsus kepenų dėl jūsus imuninės sistemos puola jūsus kepenų ląsteles.

Uždegimas audinio aplink apvalus de vamzdeliai į jūsus inkstus. Dėl to jūsus inkstai mažiau gerai veikia ..

vaistas gali paveikti turėti įtakos ant rezultatai iš kai kurių tyrimų gliukozės jūsus šlapime.

Pranešimas apie šalutinius poveikius Jei

jums pasireiškia šalutinis poveikis , kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją slaugytoja. Tai taikoma taip pat ir šalutiniams poveikiams kurie nėra šiame lapelyje paminėti . Jūs galite šalutinius poveikius taip pat pranešti per Nyderlandų Šalutinių poveikių Centrą Lareb, svetainė: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Pranešdami Centrum Lareb, svetainė: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Per šalutinis poveikis pranešti apie, padeda jums mums gauti daugiau informacijos apie šio saugumą vaisto . 5. Kaip.

5. Kaip laikote jūs šį vaistą?

Laikyti nepasiekiamoje ir neprieinamoje vaikams vietoje ..

Šio vaisto po pasibaigimo datos ant pakuotės galiojimo data. Ją rasite ant dėžutės ir ant lizdinės plokštelės po EXP. Ten nurodytas mėnuo ir metai . Paskutinė dienamėnesio ir metų iš mėnuo yra galiojimo data.

Laikyti žemiau 25 °C.

Neskalauti vaistų ne per kriauklę ar tualetą ir išmesti jų ne į šiukšliadėžę. Klauskite savo vaistininko ką daryti su vaistais turite daryti kurių nebe naudojate . Jeivaistus tinkamai teisingai būdu šalinatė nutekėjimas yra jie vienas teisingas būdas sunaikinti ir patenka jie ne į aplinką patenka.

## 6. Turinys pakuotės ir kita informacija informacija

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate ?Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra nitrofurantoinas . Nitrofurantoinas Activase.

kietos kapsulės 50 mg kietos kapsulės: Kiekviena kieta kapsulė turi 50 mg nitrofurantoino. Nitrofurantoinas Activase 100 mg kietos kapsulės: Kiekviena kieta kapsulė turi 100 mg nitrofurantoino.

Kita kita medžiagos į šiame vaistiniame preparate yra talkas, kukurūzų krakmolai ir laktozės monohidratas. Kapsulės apvalkalas kapsulės turi želatinos, titano dioksido (E 171) ir geltonojo geležies oksido (E 172).

Kaip atrodo Nitrofurantoinas yra atrodo ir kas yra pakuotėje ?Nitrofurantoinas 50 mg kietos kapsulės turi geltoną dangtelį ir dramblio kaulo-geltoną ir dramblio kaulo geltonumo korpusas. Kapsulės turi geltonos iki geltonai baltos milteliai. Nitrofurantoinas 100 mg kietos kapsulės turi vieną dramblio kaulo geltoną dangtelį ir korpusas. Kapsulės turi geltonos iki geltonai baltas milteliai.

Nitrofurantoinas yra prieinamas į lizdinių plokštelių pakuotėse su 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 84 arba 90 kietų kapsulių.

Gali būti, kad ne visos pakuotės dydžiai yra rinkoje pateikiami būti atvežtas.

Turėtojas iš leidimo dėl į prekybą įvedimo ir gamybos

Leidimo turėtojas:

Activase Pharmaceuticals Limited  
11 Boumpoulinas,  
P.C. 1060, Nicosia  
Kipras

Gamintojas:

Elara Pharmaservices Europe Limited  
Regus Block 1, Blanchardstown Corporate Park,  
Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15,  
D15 AKK1

## Airija

Registruota įrašyta po

Nitrofurantoinas Activase 50 mg kietos kapsulės: RVG 131639

Nitrofurantoinas Activase 100 mg kietos kapsulės: RVG 131640

Šis vaistas yra registruotas šalyse narėse Europos Ekonominės Erdvės pagal šiuos pavadinimus : Airija:

kietos kapsulės kietas kapsulės en Nitrofurantoin 100 mg kietos kapsulės

Nyderlandai Nitrofurantoinas Activase 50 mg kietos kapsulės & Nitrofurantoinas Activase 100 mg kietos kapsulės

Belgija Nitrofurantoinas Activase 50 mg kapsulė & Nitrofurantoin Activase 100 mg kapsulė

Portugalija Nitrofurantoína 50 mg Kapsulė & Nitrofurantoína 100 mg Kapsulė

Slovėnija Nitrofurantoin Activase 50 mg kapsulė & Nitrofurantoin Activase 100 mg kapsulė

Šis pakuotės lapelis yra skirtas paskutinį kartą patvirtintas patvirtintas lapkričio 2025 Puslapis