

Pakningsvedlegg: informasjon for brukeren brukeren  
Nitrofurantoin Activase 50 mg harde kapsler  
Nitrofurantoin Activase 100 mg harde kapsler  
nitrofurantoin

Les nøye hele pakningsvedlegg før du dette legemidlet skal bruke, fordi det står viktig informasjon i for deg.

- Oppbevar dette pakningsvedlegget. Kanskje trenger du ham senere igjen trenger.
- Har du flere spørsmål? Ta da kontakt med din lege eller apotek.
- Gi denne medisinen ikke videre til andre, fordi det er bare til deg foreskrevet. Det kan skadelig være for andre, selv om de har samme symptomer som deg.
- Får du plager av en av de bivirkningene som i avsnitt 4 står? Eller får du en bivirkning som ikke i denne pakningsvedlegget tilstand? Ta kontakt med din lege eller apotek.

Innhold av denne pakningsvedlegget

1. Hva er Nitrofurantoin Activase og hva brukes denne medisinen til?
2. Når kan du dette legemidlet ikke bruke eller må du være ekstra forsiktig med være?
3. Hvordan tar du dette legemidlet inn?
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan oppbevarer du denne medisinen?
6. Innhold av pakken og annen informasjon 1.

1. Nitrofurantoin Activase og hva den brukes til blir dette medisin brukt?

Nitrofurantoin er den virkestoffet stoffet i dette medisin. Nitrofurantoin er en medisin mot betennelser forårsaket av en bakterie (antibiotikum). Det blir brukt for behandling av infeksjoner i dine urinveier og blære . Det blir også og brukes for å sikre at du ikke får disse infeksjonene ..

du deg under eller etter behandlingen ikke behandling ikke bedre? Eller føler du deg verre? Ta da kontakt med din lege.

2. Når kan du dette legemidlet ikke bruke eller må du være ekstra forsiktig med er?

Når kan du dette legemidlet ikke bruke?

Du er allergisk mot nitrofurantoin eller mot en av de stoffene i dette legemiddel. Dette stoffer kan du finne i avsnitt 6 i denne pakningsvedlegget.

Du er allergisk mot andre nitrofuraner.

Din lege har deg fortalt at dine nyre ikke fungerer arbeide minutt ).Du er i siste fase av din graviditet graviditet (de fødselen).

Du må dette legemidlet ikke bruke hos babyer yngre enn tre måneder.

Du mangler et enzym som glukose-6-fosfatdehydrogenase heter. Dette kan dine røde blodceller lettere skades. Dette forekommer oftere hos svarte mennesker og mennesker fra middelhavsområdet middelhavs, Midt-Østlige eller asiatisk opprinnelse. Din lege vil vite dette.

Du har en sykdom som porfyri kalles, en gruppe blodsykdommer som ditt nervesystem, hud eller begge skadet.

Du har symptomer i dine lunger, lever eller nerver hatt (perifer nevropati) etter å ha inntatt av nitrofurantoin eller andre nitrofuraner.

Er du i tvil om en av ovennevnte punkter? Fortell det til din lege.

Når må du være ekstra forsiktig med dette legemidlet ?Kontakt din lege eller apotek før før du dette medisin tar hvis:

du diabetes har (diabetes).

du problemer med dine nyrer har. Du må da muligens ekstra blir kontrollert av din lege under behandlingen.

du har plager med ingen følelse eller en svak følelse i dine armer og ben (perifer nevropati).

du anemi har. Dette fører til færre røde blodceller, blek hud, en svak følelse og kortpustet være. Eller hvis du for lite vitamin B eller en unormal mengde salt i ditt blod har. Din lege kan deg råd gi.

du tidligere allergiske reaksjoner har hatt.

De ovennevnte punktene kan de sjanse øke på en bivirkning som forårsaker for skade på dine nerver. Dette kan forårsake at ting føles annerledes av bekymringer for prikking.

du en sykdom i dine lunger, lever eller nervesystem har.

må du denne medisinen for en par måneder bruke? Da vil din lege kanskje regelmessig kontrollere hvor godt dine lunger og lever fungerer. Spesielt hvis du eldre er.

dette legemiddel kan også forårsake en lungesykdom hos pasienter som ikke tidligere skade av lungene har ha hatt. Lungesykdom kan oppstå hos pasienter som en kort eller lang behandling får.

du diaré har som blir forårsaket av en bakterie som heter clostridium difficile heter.

du andre medisiner mot bakterier bruker.

du plager har av trøtt er, gul farge av din hud eller øyne, kløe, hudutslett, leddsmerter, plager i din mage, kvalm er, oppkast, ingen appetitt, mørk urin og blek eller grå avføring. Dette kan symptomer være på en sykdom i din lever.

dette legemidlet kan påvirke resultatet av undersøkelser av glukose av glukose i din urin. Resultatet kan derfor være falsk-positivt er.

Noen svarte mennesker og mennesker fra middelhavsområdet, orientalsk eller asiatiske opprinnelse kan under behandlingen anemi få .. Hører du til denne gruppen? Og får du under behandlingen problemer med å være trøtt ,svimmel og kortpustet ? Stopp da med å ta? Stopp da med det ta av dette legemidlet. Ta også kontakt med din lege.

Bruker du andre medisiner ?Bruker

du i tillegg til Nitrofurantoin Activase andre enda andre medisiner, har du det kort siden gjort eller skal du dette kanskje snart gjøre? Fortell det da din lege eller apotek. Bruker du en av de følgende medisiner sammen med Nitrofurantoin Activase? Da kan disse medisinene endre seg virke. Eller kan Nitrofurantoin Activase ellers gå virke:

Magnesiumtrisilicat. Dette er en syrenøytraliserende. Dette legemidlet blir brukt som det fordøye av mat i din kropp ikke bra ..

mot en betennelse i et ledd med smerte ( gikt).For eksempel For eksempel probenecid av sulfipyrazon.

Medisiner som gjør at mat lenger i din mage blir. For eksempel atropin eller hyoscin.

Medisiner mot en type grå stær (glaukom). Som karbonsyreanhydrasehemmere. For eksempel acetazolamid.

Medisiner som din urin mindre sur gjør (urin-alkaliserende midler). For eksempel en kaliumcitrat-blanding.

Medisiner mot infeksjoner (kinoloner).

Tyfoiddvaksine hvis det via munnen tas oralt.

Hva må du være oppmerksom med mat og drikke?

Dette legemidlet må tas med mat eller melk tas . Dettehjelper å sikre at du ikke får ingen mageproblemer får. Det vil også hjelpe med å oppta av dette legemidlet.

Graviditet og amming

Er du gravid, tror du gravid å være, ønsker du gravid å bli eller gir du amming? Ta kontakt med din lege eller apotek før du dette legemidlet bruker.

Svangerskap

For så vidt kjent kan denne medisinen under svangerskapet brukes . Det må ikkebrukes under fødselen brukt under de fødsel. Bruk av dette legemidlet under fødselen kan påvirke ha på din baby ( seseksjonen ' Når kan duikke kan du dette middelet ikke bruke?' ovenfor).

Amming

Ønsker du amme gi? Ta da først kontakt med din lege. Dette legemidlet kommer i morsmelken. Dette kan være farlig for babyer yngre enn 3 måneder. Det kan også være farlig for babyer som ikke har en type enzym ha.

Kjøreevne og den bruk av maskiner

Dette legemidlet kan føre til at du føler deg svimmel og søvning . Kjør. Kjør ingen bil og betjen ingen maskiner hvis du her plager av har. Vent til disse plagene igjen borte er.

Dette legemidlet inneholder laktose og natrium

Har din lege deg fortalt at du noen sukkerarter ikke tåler? Ta da kontakt med din lege før du dette medisin inntar.

Dette medisinen inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per kapsel, det vil si at det i virkeligheten 'natriumfritt' er.

3. Hvordan tar du dette legemiddel i?

Bruk dette legemiddel alltid nøyaktig slik din lege eller apotek deg det har fortalt. Er du i tvil om den riktige bruk? Ta kontakt med din lege eller apotek.

Følg veldig godt instruksjonene fra legen din. Fullfør behandlingkuren . Selv om duføler deg bedre . bedre føler.

Anbefalt dose

Voksne og barn eldre enn 10 år:

Den vanlige doseringen avhenger av typen type infeksjon at du har. De bruksanvisningene må bli skrevet på etiketten at din apotek du gir. Ta kontakt med din lege eller apotek hvis disse bruksanvisninger ikke tydelig er.

Den vanlige doseringene er:

For behandling av infeksjoner: 1 kapsel på 50 mg 4 ganger per dag før 7 dager  
For behandling av alvorlige infeksjoner som ikke går bort og stadig kommer tilbake: 1 kapsel på 100 mg 4 ganger per dag i 7 dager  
Om å sikre at du ikke andre infeksjoner får: 1 kapsel på 50 mg eller 1 kapsel på 100 mg du legger deg For  
å sikre at du ikke infeksjoner får får under en operasjon: 1 kapsel på 50 mg 4 ganger per dag på dagen for operasjonen og i 3 3 etterpå ..

Bruk ved barn og babyer eldre enn 3 måneder:

Dosen avhenger av barnets vekt . Din lege bestemmer dosen de dose. Følg veldig godt instruksjonene fra legen din. Bruken av dette legemidlet ( en kapsel) passermuligens ikke godt ikke bra ved yngre barn. Andre former av denne medisinen kan være bedre. Som en væske. Tviler du? Ta da kontakt med din lege apotekar.

Bruk hos barn yngre enn 3 måneder:

Barn yngre enn 3 måneder må dette legemidlet ikke brukes.

Måte av administrasjon

Dette legemidlet må alltid med mat eller melk tas .Legemidlet virker da bedre .. må svelges hele bli svelget. Glem din medisin ikke i å ta.

Medisinske kontroller

Din lege vil veldig godt passe på mulige påvirkninger på din lever, lunger, blod eller nervesystem. Dette legemidlet kan påvirke resultatene av noen undersøkelser noen undersøkelser av glukose i din urin.

Har du for mye av denne medisinen tatt?

Kontakt umiddelbart legen din eller apoteket . Eller gå til. Eller gå til de akuttmottaket ved sykehuset i nærheten.

Ta alltid med kapslene du fortsatt har igjen. Ta også med emballasjen og etiketten etikett med. Så vet det medisinske personalet hva du har inntatt.

Har du glemt dette legemidlet å ta ?Tenker

du på det senere på dagen dag til? Ta da dose av den dag som vanlig. Har du en dose for hele dagen gått glipp av? Ta da vanlig dose den neste dag inn. Ta ikke dobbel dose for å ta igjen en glemt dose for å komme tilbake. Er du usikker? Ta kontakt med din lege eller apotek.

Hvis du stopper med å ta denne medisinen medisin

Din lege vil fortelle deg hvor lenge du denne medisinen må ta. Stopp ikke tidligere enn du blir fortalt. Også ikke hvis du føler bedre ..

du andre spørsmål om bruk av medisinen av dette legemidlet? Ta kontakt med din lege, apotek eller sykepleier.

#### 4. Mulige bivirkninger

Som ethvert legemiddel kan også dette legemidlet bivirkninger har. Ikke alle får med å gjøre.

De fleste bivirkninger er milde. De går bort når du du stopper med bruk av dette legemidlet.

Alle legemidler kan allergiske reaksjoner forårsake. Men alvorlige allergiske reaksjoner forekommer nesten aldri for. Har du plutselig en hvesende pust, problemer med å puste, hevelse av dine øyelokk, ansikt eller lepper, hudutslett eller kløe (særlig over din hele kropp)? Stopp da med å ta denne medisinen. Gåogså umiddelbart til en lege.

Får du problemer med en av de følgende bivirkninger? Stopp da med bruken av denne medisinen. Ta også kontakt med din lege.

En gruppe blodsykdommer som ditt nervesystem, hud, eller begge skadet (akutt porfyri).

Dine lunger kan reagere på nitrofurantoin. Dette kan raskt, innen en uke etter starten av behandlingen skje. Det kan også veldig sakte utvikle seg. Spesielt hos eldre pasienter. Dette kan forårsake feber, frysninger, hoste, kortpustethet, besvime eller en blå farge på blå farge fra din hud. Det kan oppstå ved skade av vevet i dine lunger. Gulsott (betennelse i leveren som en gul farge av din hud eller øynehvite forårsaket). Din lever kan også mindre godt begynne å fungere (leversvikt). Dette kan dødelig er. De nerver utenfor din ryggmarg kan skade. Dette kan forårsake forandringer i følelsen og bruken av dine muskler. Behandlingen må bli stoppet ved de første symptomer av en prikkende følelse eller ingen følelse i dine hender eller føtter. Du kan også oppleve å få av hodepine, ekstreme endringer i humør eller mental helse, være forvirret eller, en svak følelse og uklart syn. Disse plagene kan være alvorlige. I noen tilfeller går de aldri bort ..

Høyere trykk i din skalle. Dette forårsaker sterk hodepine .. eller lilla farge på din hud på grunn av for lite litt oksygen i ditt blod. Denne sykdommen heter cyanose.

Symptomer på feber, influensa, magesmerter, diaré, blod i din avføring og en svak følelse. Dette kan være symptomer på en sykdom som kutan vaskulitt heter.

Klager av gulsott, trøtt være, magesmerter, leddsmerter og hevelse. Dette kan være symptomer av en sykdom som auto- den auto-autoimmun hepatitt varm.

Vær oppmerksom på at din urin mørkegul eller brun kan bli under bruk av denne medisinen. Dette er helt normalt. Dette er ingen grunn til å stoppe med bruken av denne medisinen.

Andre bivirkninger kan være:

Sjeldne (forekommer for ved mindre enn 1 av 1000 brukere)

Skade av ditt benmarg. Dette fører til at du har for lite røde blodceller (anemi).

Ikke kjent (kan med de tilgjengelige data ikke bli bestemt)

Hos noen pasienter er de blodcellene skadet. Dette kan forårsake til blå merker, langsommere koagulering av blodet, sår hals, feber, anemi og raskere en forkjølelse få eller en forkjølelse ha som ikke går bort.

Kvalm være

Diaré (løs avføring)

Ingen appetitt, magesmerter og oppkast

Noen pasienter fikk ubehag fra forskjellige typer hudutslett eller hudproblemer. Det er også tilfeller rapportert av en alvorlig betennelse i huden og andre deler av kroppen på grunn av en allergi mot en medisin (DRESS-syndrom). Du kan oppleve å få fra flass på din hud, rød hudutslett eller feber sammen med en rask hjerterytme og alvorlig hudutslett med blemmer. Andre symptomer kan være: betennelse av spyttkjertler

(som ansiktssmerter forårsaker), betennelse av din bukspyttkjertel (som alvorlig magesmerter forårsaker) og leddsmerter.

De nerver utenfor ditt ryggmarg kan skade. Dette kan forårsake endringer i følelsen og bruken av dine muskler. I tillegg kan du oppleve å få av hodepine, ekstreme endringer i humør eller mental helse (psykose), være forvirret, en svak følelse, bevegelser med dine øyne gjøre uten at du det selv ønsker (som fører til dine øye raskt frem og tilbake, opp og ned eller i en sirkel kan bevege og du uklart kan se).

Disse symptomene kan veldig være. I noen tilfeller gå de aldri mer bort.

Trøtt være, kalde frysninger og feber på grunn av medisiner

Rask tap av hår

Infeksjon av dine urinveier av patogener som ikke følsomme er for nitrofurantoin.

Betennelse i veggene av små blodkar. Dette fører til skade på din hud.

Betennelse i din lever fordi ditt immunforsvar dine leverceller angriper.

Betennelse i vev rundt de rør i dine nyrer. Dette gjør dine nyrer mindre godt fungere.

Denne medisinen kan påvirke ha på resultater av noen undersøkelser av glukose i din urin.

Det rapportere av bivirkninger

Får du problemer med bivirkninger, ta kontakt med din lege, apotek eller sykepleier. Dette gjelder også for bivirkninger som ikke i denne pakningsvedlegget står. Du kan bivirkninger også melde via Nederlands Bivirkninger Senter Lareb, nettside: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Ved bivirkninger å rapportere, hjelper du oss med mer informasjon å få om sikkerheten til denne medisinen.

5. Hvordan oppbevarer du dette legemidlet?

Utenfor synet og rekkevidde av barn holde.

Bruk dette legemidlet ikke mer etter utløpsdatoen siste holdbarhetsdato. Den finner du på esken og blisterpakningen etter EXP. Der står en måned og et år. Densiste dagen dag av den måned er siste holdbarhetsdato.

Oppbevares under 25 °C.

Skyll medisiner ikke ned i vasken eller toalettet og kast dem ikke i søppelbøtta. Spør din apotek hva du skal gjøre med medisiner må gjøre som du ikke lenger bruker. Hvis du medisiner på riktig måte kaster utskiller bli de på en riktig måte destruert og kommer de ikke i miljøet til.

6. Innhold av emballasjen og annen informasjon

Hvilke stoffer finnes det i denne medisinen?

Den virkestoffet i denne medisinen er nitrofurantoin nitrofurantoin.

Activase 50 mg harde kapsler: Hver harde kapsel inneholder 50 mg nitrofurantoin.

Nitrofurantoin Activase 100 mg harde kapsler: Hver harde kapsel inneholder 100 mg nitrofurantoin.

De andre stoffer i denne medisinen er talkum, maisstivelse og laktosemonohydrat. Kapselens skall inneholder gelatin, titandioksid (E 171) og gul jernoksid (E 172). (E 172).

Hvordan ser Nitrofurantoin ut og hva inneholder en pakning?

Nitrofurantoin 50 mg harde kapsler har en gul hette og elfenbensgul kropp. Kapslene inneholder gul til gulhvitt pulver.

Nitrofurantoin 100 mg harde kapsler har en elfenbensgul hette og kropp. Kapslene inneholder gul til gulhvitt pulver.

Nitrofurantoin er tilgjengelig i blisterpakninger med 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 84 eller 90 harde kapsler.

Det er mulig at ikke alle pakningsstørrelser på markedet er brakt.

Innehaver av tillatelsen for markedsføring handel bringe og produsent

Tillatelsesinnehaver:

Activase Pharmaceuticals Limited  
11 Boumpoulinas,  
P.C. 1060, Nicosia  
Kypros

Produsent:

Elara Pharmaservices Europe Limited  
Regus Block 1, Blanchardstown Corporate Park,  
Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15,  
D15 AKK1  
Irland

I registeret registrert under

Nitrofurantoin Activase 50 mg harde kapsler: RVG 131639

Nitrofurantoin Activase 100 mg harde kapsler: RVG 131640

Dette legemidlet er registrert i medlemsland av Det europeiske økonomiske området under de følgende navn:

Irland	Nitrofurantoin 50 mg harde kapsler en Nitrofurantoin 100 mg harde kapsler
Nederland	Nitrofurantoin Activase 50 mg harde kapsler & Nitrofurantoin Activase 100 mg harde kapsler
Belgia	Nitrofurantoin Activase 50 mg kapsel & Nitrofurantoin Activase 100 mg kapsel
Portugal	Nitrofurantoin 50 mg Kapsel & Nitrofurantoin 100 mg Kapsel
Slovenia	Nitrofurantoin Activase 50 mg kapsel & Nitrofurantoin Activase 100 mg kapsler

Denne pakningsvedlegget er for den sist godkjent i november 2025