

Ulotka: informacja dla użytkownika Nitrofurantoina
Activase 50 mg twarde kapsułki Nitrofurantoina
Activase 100 mg twarde kapsułki nitrofurantoina
Przeczytaj

dokładnie całą całą ulotkę zanim Pan/Pani ten lek zacznie używać, ponieważ zawiera ważne informacje dla Pana/Pani. Zachowaj

- tę ulotkę .. być potrzebna później ponownie potrzebny.
- Czy masz jeszcze pytania? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą.
- Nie podawaj tego leku nie innym osobom inni, ponieważ jest tylko dla Pana/Pani przepisany. To może być szkodliwe dla innych ,nawet jeśli mają oni te same dolegliwości co Pan/Pani. u.
- Czy masz problemy z jednym z działań niepożądanych wymienionych 4 4? Lub czy masz działanie niepożądane które nie jest wymienione w tej ulotce stan? Skontaktuj się z twoim lekarzem lub farmaceutą.

Zawartość tej ulotki Co to jest

1. Nitrofurantoina Activase i do czego jest ten lek używany używa?
2. Kiedy nie wolno tego leku używać lub należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu ?Jak
3. przyjmować ten lek ? lekarstwo w?
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Pan/Pani ten lek?
6. Zawartość opakowania i dodatkowe informacje 1.

1. Nitrofurantoina Activase i w jakim celu stosuje się jest ten lek używany?

Nitrofurantoina jest substancją czynną w w tym leku. Nitrofurantoina jest lekiem przeciw zapaleniom spowodowanym przez jeden bakteria (antybiotyk). To jest używane do leczenia zakażeń dróg moczowych i pęcherza moczowego . To jest również jest też używany aby zapewnić że nie te infekcje nie dostaniesz ..

się podczas lub po leczeniu nie de leczenie nie lepiej? Lub czujesz się gorzej ? Skontaktuj się wtedy z swoim lekarzem. 2.

2. nie wolno tego leku używać lub musisz być szczególnie ostrożny z nim ze są?

Kiedy nie wolno tego leku nie stosować?

Jesteś uczulony na nitrofurantoinę lub na jeden z składników w ten lek.

Ten substancje można znaleźć w sekcji rubryce 6 tego tego ulotki.

Jesteś uczulony na inne nitrofurany.

Twój lekarz powiedział ci że twoje nerki nie działają dobrze (eGFR mniej niż 45 ml na minutę).Jesteś w

ostatniej fazie ciąży swojej ciąży ciąży (de poród).

Możesz ten lek nie używać u niemowląt młodszych niż trzy miesiące.

Brakuje Ci enzymu który dehydrogenaza glukozy-6-fosforanowa dehydrogenaza glukozy-6-fosforanowa gorący. To może twoje czerwone krwinki łatwiej uszkodzić. To zdarza się częściej u czarnych osób i osób z regionu śródziemnomorskiego, Midden-Wschodnie lub Azjatyckie pochodzenie. Twój lekarz będzie to wiedział.

Masz chorobę o nazwie porfiria , porfiria nazywa, jeden grupa choroby krwi które twój układ nerwowy, skóra lub oba uszkodzony.
Masz objawy w twoich płucach , wątrobie lub nerwach nerwy miał (obwodowa neuropatia) po zażyciu nitrofurantoiny lub innych nitrofuranów . Czy.

co do jednego z powyższych punktów ?? Powiedz to swojemu lekarzowi. Kiedy

należy zachować szczególną ostrożność przy tym leku ? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą przed zanim u ten lek przyjmujesz jeśli:

u cukrzycę masz (diabetes).

u problemy z twoimi nerkami masz. U musisz wtedy możliwie dodatkowo są kontrolowane przez twojego lekarza podczas leczenia terapii.

masz cierpisz z braku czucia lub uczucie słabości słabe w twoje ramiona i nogi (obwodowa neuropatia).

masz niedokrwistość . Topowoduje mniej czerwonych krwinek komórki krwibłada skóra ,, jeden słaby uczucie i duszność być. Lub jeśli Pan za mało witamina B lub jeden nieprawidłowa ilość sól w Pana krwi ma. Twój lekarz może ci porady udzielić. cię wcześniej alergiczne reakcje miał ..

punkty mogą być pomocne de szansa zwiększać na jeden działanie niepożądane które powoduje dla uszkodzenie do twoje nerwy. To może sprawić że rzeczy czują się inaczej of troski dla mrowienie.

u chorobę choroba w twoje płuca, wątroba lub układ nerwowy ma.

musi pan/pani ten lek przed jeden kilka miesięcy używać? Wtedy chce twój lekarz może regularnie sprawdzać jak dobrze twoje płuca i wątroba pracują. Zwłaszcza jeśli u starszy jesteś.

ten lek może również powodować u chorobę płuc u pacjentów którzy nie wcześniejsze uszkodzenie płuc mają mieć miał. Choroba płuc może wystąpić u pacjentów którzy krótką lub długą leczenie otrzymują ..

biegunkę masz która jest spowodowana powoduje przez bakterię bakteria która nazywa się clostridium difficile nazywa się.

jeśli inne leki przeciw bakteriom stosujesz.

jeśli masz problemy z zmęczeniem być, żółty kolor skóry twojej skóry lub oczu, swędzenie, wysypka, ból stawów, dolegliwości w twoim brzuchu, nudności są,

wymioty, brak apetytu, ciemny mocz i białe lub szary kał. To mogą być objawy są choroby jeden choroba w twojej wątrobie.

ten lek może wpływ mieć na wynik badań glukozy glukozy w twoim moczu. Wynik może być przez to fałszywie dodatni są.

Niektórzy czarnoskórzy ludzie i ludzie z śródziemnomorskim, wschodnim lub azjatyckim pochodzeniem mogą podczas leczenia anemię dostać .. Należy Pan/Pani do tej grupy? A czy Pan/Pani podczas leczenia odczuwa zmęczenie, zawroty głowy duszność ? Proszę przerwać przyjmowanie są? Przestań wtedy z przyjmować z tego leku. Weź również kontakt z swoim lekarzem.

Czy używasz ty jeszcze inne leki?

Czy używasz ty oprócz Nitrofurantoina Activase jeszcze inne leki, czy Pan/Pani to niedawno zrobił/a lub zamierza Pan/Pani to może wkrótce zrobić ? Proszę to wtedy następnie twój

lekarz lub farmaceuta. Czy używasz ty jednego z następujących leków razem z Nitrofurantoina Activase? Wtedy mogą te leki inaczej działać. Lub może Nitrofurantoina Activase inaczej zacząć działać:

Magnezjotrisilikat. To jest lek przeciwkwasowy. Ten lek jest stosowany gdy trawienie przebiega z jedzeniem w twoje ciało nie dobrze idzie.

Leki przeciw zapaleniu w stawie z bólem (dna moczanowa).Na przykład). Na przykład probenecyd z sulfinpyrazonem.

Leki które powodują że jedzenie dłużej w Twoim żołądku pozostaje. Na przykład atropina lub hioscyna.

Leki przeciw na rodzaj zaćma (jaskra). Takie jak inhibitory anhidrazy węglanowej. Na przykład acetazolamid.

Leki które twoje mocz mniej kwaśny robią (moczowo-alkalizujące środki). Na przykład jeden mieszanina cytrynianu potasu.

Leki przeciw infekcjom (chinolony).

Szczepionka przeciw durowi brzuszemu jeśli jest podawana doustnie jest przyjmowana.

Na co należy zwrócić uwagę uważać z jedzeniem i piciem?

Ten lek należy z jedzeniem lub mlekiem przyjmować . Topomaga aby zapewnić że nie masz żadnych problemów dolegliwości żołądkowe otrzymuje. Het będzie również pomagać przy het wchłanianiu tego tego leku.

Ciąża i karmienie piersią

Czy jesteś w ciąży, myślisz u w ciąży być jest, chcesz w ciąży zajść lub karmisz u piersią? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą przed u tym lekiem stosujesz.

Ciąża

Dla tyle wiadomo może ten lek podczas ciąży być używany . Nie wolnego stosować podczas porodu podczas de poród. Stosowanie tego leku podczas porodu może mieć wpływ na twoje dziecko (patrz sekcja' Kiedy nie wolno używaćtego leku ten środek nie używać?' powyżej).

Karmienie piersią

Chcesz karmić piersią ?Skontaktuj się najpierw z lekarzem. Twoim lekarzem. Ten lek przechodzi do mleka matki. Dit może być niebezpieczne dla niemowląt młodszych niż 3 miesiące. To może również być niebezpieczne dla niemowląt, które nie mają pewnego rodzaju enzymu nie posiadają.

Zdolność prowadzenia pojazdów i używanie maszyn maszyn

Ten lek może powodować że poczujesz się oszołomiony i senny . Nie prowadź. Jedź nie auto i obsługiwać nie maszyn jeśli Pan/Pani tutaj cierpi na ma. Poczekaj, aż te dolegliwości ponownie znikną ..

lek lekarstwo zawiera laktozę i sól

Czy twój lekarz ci powiedział że niektórych cukrów nie tolerujesz ? Skontaktuj się zswim lekarzem zanim zażyjesz ten lek lek przyjmuje.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na kapsułkę, co oznacza że jest w istocie ' bezsodowy'.3.

3. przyjmować Pan/Pani u ten lek w?

Używaj ten lek zawsze dokładnie jak twój lekarz lub farmaceuta ci to powiedział .. co do właściwej właściwe użycie? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą.

Postępuj bardzo dokładnie zgodnie z instrukcjami od swojego lekarza. Dokończ kurację . Nawet jeśli czujesz się lepiej się lepiej czuje.

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci powyżej niż 10 lat:

Zwykła dawka zależy od rodzaju infekcji rodzaj zakażenia że Pan ma. Instrukcje użytkowania muszą być napisane na etykiecie że Państwa farmaceuta Panu daje. Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą jeśli te instrukcje użytkowania nie jasne są.

Normalne dawkowanie to ::

leczenia infekcji : 1 kapsułka 50 mg 4 razy dziennie przez na dzień dla 7 dni
Dla leczenia ciężkich infekcji które nie ustępują i ciągle nawracają : 1 kapsułka 100 mg 4 razy dziennie przez 7 dni 7 dni
Aby zapewnić że nie masz innych infekcji otrzymujesz otrzymuj przed snem to Aby zapewnić że nie masz infekcji brak zakażenia otrzymuje podczas operacji : 1 kapsułka 50 mg 4 razy dziennie w dzień operacji i przez 3 dni potem . 3 dni następnie.

Użycie przy dzieciach i niemowlętach starszych niż 3 miesiące:

Dawka zależy od wagi dziecka. Twój lekarz określi dawkę określa de dawka. Postępuj bardzo dokładnie według instrukcji użycia od swojego lekarza.

Stosowanie tego leku tego leku (kapsułki) może nie odpowiadać dobrze dobrze przy młodszych dzieciach. Inne formy tego leku mogą być lepsze .. płyn . Masz. Skontaktuj się z swoim lekarzem twój lekarz farmaceuta.

Stosowanie u dzieci młodszych niż 3 miesiące:

Dzieci młodsze niż 3 miesiące nie mogą tego leku używać ..

Sposób podania podawania

Ten lek należy zawsze z jedzeniem lub mlekiem przyjmować . Lekle działa wtedy lepiej .. należy w całości cały być połknięte. Nie zapomnij swojego leku nie w wziąć ..

lekarskie Twój

lekarz będzie bardzo uważnie obserwować na na możliwe wpływy na twoją wątrobę, płuca, krew lub układ nerwowy. Ten lek może wpływać na wyniki niektórych badań niektórych badań glukozy w twoim moczu.

Czy masz za dużo tego leku przyjęto ? Skontaktuj się

natychmiast z twoim lekarzem lub farmaceutą . Lub idź do de oddział ratunkowy van het szpital w pobliżu.

Zawsze zabierz kapsułki, które jeszcze masz pozostałe. Zabierz również opakowanie i etykietę to etykieta ze. Tak wie to medyczny personel co Pan/Pani przyjął/a ..

wziąć ten lek w przyjąć ? Jeśli przypomni się Panu/Pani później w

dzień pojawią się później na dzień do? Następnie weź dawkę z tego dnia jak zwykle. Czy masz jedną dawkę na cały dzień przegapiłeś? Następnie weź normalną dawkę de następnego dnia w. Przyjmij żadnej podwójnej dawki aby zapomnianą dawkę nadrobić . Masz wątpliwości ? Skontaktuj się z. lekarzem lub farmaceutą twój sztuka farmaceuta.

Jeśli Pan/Pani przestanie przyjmować ten lek Ten lek
Twój lekarz powie Panu/Pani jak długo ten lek należy przyjmować . Przystań. Stop nie wcześniej niż ci powiedziano .Również nie jeśli się czujesz lepiej ..

masz jeszcze inne pytania dotyczące użytkowania użycie van ten leku? Skontaktuj się z swoim lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek może również ten lek działania niepożądane mieć. Nie każdy dostaje z tym do czynienia.

Większość działań niepożądanych jest łagodna. One ustępują ponownie znikają gdy Pan/Pani u przestań z używaniem tego tego leku.

Wszystkie leki mogą powodować reakcje alergiczne. Ale ciężkie reakcje alergiczne występują prawie nigdy dla. Czy masz nagłe jakiś świszczący oddech, problemy z oddychaniem, obrzęk twoich powiek ,twarzy lub z wargi, wysypka lub swędzenie (zwłaszcza na całym ciele)? Przystań wtedyprzyjmować ten lek . Udaj się również natychmiast do lekarza . jeden lekarz.

Czy masz problemy z jednym z poniższych działań niepożądanych? Przystań wtedy używać tego leku . Skontaktuj się również z swoim lekarzem. Grupa

osób grupa choroby krwi które twoje układ nerwowy, skóra, lub oba uszkodzony (ostra porfiria).

Twoje płuca mogą reagować na nitrofurantoina. To może szybko, w ciągu tygodnia po rozpoczęciu leczenia wystąpić . Może również bardzo powoli się rozwijać .

Szczególnie. starszych pacjentów starszy pacjenci. Dł może powodować gorączkę ,dreszcze , kaszel, duszność, omdlenie lubniebieski kolor skóry jeden niebieski kolor z twój skóra. Er mogą blizny powstać przez uszkodzenie tkanki w twoich płucach ..

(zapaleniewątroby, które powoduje żółte zabarwienie kolor z twojej skóry lub białka oka powoduje). Twoja wątroba może również mniej dobrze zacząć pracować (niewydolność wątroby). To może śmiertelny są.

De nerwy poza twoim rdzeniem kręgowym mogą uszkodzić. To może powodować zmiany zmiany czuciu i używaniu to użycie z twoich mięśni. Leczenie musi zostać przerwane przy pierwszych objawach mrowienia lub braku czucia w ciele lub kończynach brak czucia twoje ręce lub stopy. Możesz również mieć problemy z bólem głowy, skrajne zmiany nastroju lub zdrowia psychicznego, być zdezorientowany, jedno słaby uczucie i niewyraźne widzenie. Te dolegliwości mogą być bardzo silne. W niektórych przypadkach nie ustępują nigdy więcej.

Wyższe ciśnienie w twojej czaszce. To powoduje silny ból głowy.

Niebieski lub fioletowy kolor twojej skóry z powodu zbyt mało tlenu tlen w twojej krwi. Ta choroba nazywa się sinica.

Objawy gorączki ,grypy ,ból brzucha ,biegunki ,, krew w twoim stolcu i uczucie osłabienia . Tomogą być objawy choroby o nazwie skórna zapalenie naczyń zwane cutane vasculitis się.

Objawy z żółtaczką, zmęczenie ,ból brzucha ,ból stawów obrzęk . Tomogą być objawy są choroby jeden która auto- tenzijautoimmunologiczne zapalenie wątroby gorący.

Pamiętaj o tym że twoje mocz ciemnożółty lub brązowy może stać się podczas stosowania tego leku .To jest całkowicie normalne. To jest nie powód do przerywania stosowania tego leku . Inne działania niepożądane.

obejmować działania niepożądane Rzadko (:

Rzadko (przyjść dla przy mniej niż 1 na 1000 użytkowników)

Uszkodzenie szpiku kostnego twojego .. otrzymujesz zbyt mało czerwonych krwinek (anemia).niedokrwistość).

Nie znany (może z dostępnych danych nie być określony)

U niektórych pacjentów są komórki krwi uszkodzone . Tomoże może powodować do siniaki ,wolniejsze krzepnięcie krwi ,ból gardła ,gorączka ,niedokrwistość niedokrwistość szybciej przeziębienie złapać lub przeziębienie z jeden przeziębienie mieć które nie znika ..

być Biegunka

(luźnestolce)Brak apetytu,

ból brzucha i wymioty Niektóre

Niektóre pacjenci otrzymali dolegliwości różne rodzaje wysypki lub problemy skórne. Zostały są również przypadki zgłoszone z ciężkiego zapalenia skóry z skóry i inne części ciała ciała przez alergię na lek lek (zespół DRESS). Możesz odczuwać dyskomfort z powodu łuszczenia się skóry na swojej skóra, czerwona wysypka skórna lub gorączka razem z jednym szybkim tętnem i ciężka wysypka skórna z pęcherzami. Inne objawy mogą być: zapalenie gruczołów ślinowych (które ból twarzy powodują), zapalenie trzustki (które silny ból brzucha powoduje) powodujeból stawów . De. De nerwy na zewnątrz twoje rdzeń kręgowy mogą uszkodzić. To może powodować zmiany zmiany czuciu i w używaniu użycie twoich mięśni .. Ponadto możesz mieć problem z bólem głowy, skrajnymi zmianami nastroju lub zdrowia psychicznego (psychoza), być zdezorientowany lub czuć się słabo ,, ruchy z twoimi oczami wykonywać bez że ty to sam chcesz (powodując twoje oko szybko tam i z powrotem, w górę i w dół lub w jeden okrąg może poruszać się i ty rozmazany możesz widzieć). Te dolegliwości mogą bardzo być. W niektórych przypadkach iść nigdy nie więcej znikają.

Zmęczony być, zimne dreszcze i gorączka przez leki

Szybka utrata włosów Infekcja

z z twój drogi moczowe przez patogeny które nie wrażliwe są na nitrofurantoina.

Zapalenie ścian naczyń krwionośnych małych krwionośnych. W wyniku tego powstaje uszkodzenie na twojej skórze.

Zapalenie w twojej wątrobie ponieważ twój układ odpornościowy twoje komórki wątroby atakuje.

Zapalenie w tkance wokół de rurki w twoich nerkach. To powoduje, że twoje nerki działają mniej dobrze ..

lek może mieć wpływ na na wyniki z niektórymi badaniami glukozy w twoim moczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią działania niepożądane , skontaktuj się z twoim lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką farmaceutą or pielęgniarką. Dł dotyczy również dla działań niepożądanych które nie w tej ulotce są. Możesz zgłaszać działania niepożądane również zgłosić przez Niderlandzkie Centrum Działań Niepożądanych Lareb, strona internetowa: www.lareb.nl. Dzięki działania niepożądane do zgłosić, pomaga Ci nam w więcej informacji uzyskać o bezpieczeństwie tego leku . 5..

5. Jak przechowuje u to lek?

Poza zasięgiem i dostępem dla dzieci trzymać.

Nie używaj tego leku po upływie daty ważności ostateczny termin ważności. Ten znajduje się na pudełku i na blistrze po EXP. Tam jest miesiąc i rok . Ostatni dzień. ostatni dzień z tego miesiąca jest ostateczny termin ważności.

Przechowywać poniżej 25 °C.

Nie wylewaj leków nie do zlewu ani do toalety i wyrzucaj ich nie w koszu na śmieci. Zapytaj swojego farmaceutę co zrobić z lekami należy zrobić których nie już używasz. Jeśli leki w właściwy sposób utylizujesz zostaną one na właściwy sposób zniszczone i nie trafią one do środowiska ..

6. opakowania i pozostałe informacje inne informacja

Jakie substancje są w tym leku?

Substancja czynna w tym leku to nitrofurantoina nitrofurantoina.

Activase 50 mg twarde kapsułki: Każda twarda kapsułka zawiera 50 mg nitrofurantoina.

Nitrofurantoina Activase 100 mg twarde kapsułki: Każda twarda kapsułka zawiera 100 mg nitrofurantoina.

Inne inne substancje w tym leku są talk, skrobia kukurydziana i jednowodny laktozy. Osłonka kapsułki zawiera żelatynę, dwutlenek tytanu (E 171) i żółty tlenek żelaza (E 172). (E 172).

Jak wygląda Nitrofurantoina lub i co zawiera opakowanie ? Nitrofurantoina 50 mg twarde kapsułki mają żółtą nasadkę i kość słoniową-żółtą dop w kość słoniowa-żółty tułów. Kapsułki zawierają żółty do żółtawobiały proszek. Nitrofurantoina 100 mg twarde kapsułki mają jedną kość słoniowa-żółtą nasadkę i tułów. Kapsułki zawierają żółty do żółtawobiały proszek.

Nitrofurantoina jest dostępna w blisterach z 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 84 lub 90 twardych kapsułkach.

Możliwe jest że nie wszystkie rozmiary opakowań są na rynku dostępne są dostarczony.

Posiadacz zezwolenia na wprowadzenie do obrotu handlowego i producent Posiadacz zezwolenia

Posiadacz pozwolenia:

Pharmaceuticals Limited Pharmaceuticals Limited
11 Boumpoulinas P.C. 1060, Nikozja
Cypr
Cypr

Producent:

Elara Pharmservices Europe Limited
Regus Block 1, Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15,
D15 AKK1
Irlandia

W rejestrze zarejestrowany pod

Nitrofurantoina Activase 50 mg twarde kapsułki: RVG 131639

Nitrofurantoina Activase 100 mg twarde kapsułki: RVG 131640

Ten lek jest zarejestrowany w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami : Irlandia:

twarde kapsułki	twarde kapsułki en Nitrofurantoina 100 mg twarde kapsułki
Holandia	Nitrofurantoina Activase 50 mg twarde kapsułki & Nitrofurantoina Activase 100 mg twarde kapsułki
Belgia	Nitrofurantoina Activase 50 mg kapsułka & Nitrofurantoina Activase 100 mg kapsułka
Portugalia	Nitrofurantoina 50 mg Kapsułka & Nitrofurantoina 100 mg Kapsułka
Słowenia	Nitrofurantoina Activase 50 mg kapsułki & Nitrofurantoina Activase 100 mg kapsułki

Ten ulotka jest dla tego ostatnio zatwierdzony w listopadzie 2025