

Folheto: informação para o utilizador
Nitrofurantoína Activase 50 mg cápsulas duras
Nitrofurantoína Activase 100 mg cápsulas duras
nitrofurantoína

Leia cuidadosamente todo o folheto antes você este medicamento vai usar, pois há importante informação em para você. Guarde

- este folheto .. tenha tem você mais tarde novamente precisar.
- Tem você mais perguntas? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.
- Não dê este medicamento a outras pessoas outros, pois é apenas para você prescrito. Pode ser prejudicial para outras pessoas, mesmo que tenham os mesmos sintomas que você.
- Tem você problemas de um dos efeitos colaterais que na seção 4 estão? Ou tem você um efeito colateral que não neste folheto informativo estado? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

Conteúdo deste folheto informativo

1. O que é Nitrofurantoína Activase e para que é este medicamento usado?
2. Quando pode você este medicamento não usar ou deve você ter extra cuidado com ser?
3. Como toma você este medicamento ?
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como armazenar você este medicamento?
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Nitrofurantoína Activase e para que é este medicamento usado?

Nitrofurantoína é a substância ativa no este medicamento. Nitrofurantoína é um medicamento contra infecções por um bactéria (antibiótico). O é usado para o tratamento de infecções do seu trato urinário e bexiga. O é também usado para assegurar que você estas infecções não contraia ..

você durante ou após o tratamento não tratamento não melhor? Ou sente você se pior? Então entre em contato com seu médico.

2. Quando você pode este medicamento não usar ou deve ter cuidado extra com são?

Quando pode você este medicamento não usar?

Você é alérgico a nitrofurantoína ou a um dos componentes em este medicamento.

Este substâncias pode você encontrar em seção 6 deste este folheto.

Você é alérgico a outros nitrofuranos.

Seu médico lhe disse que os seus rins não funcionam trabalhar minuto).Você está na

última fase da sua gravidez gravidez (de parto).

Você pode este medicamento não usar em bebês menores que três meses.

Você falta uma enzima que glicose-6-fosfato desidrogenase chama. Isso pode seu vermelhas células sanguíneas mais facilmente danificar. Isso ocorre mais frequentemente em pessoas negras e pessoas de origem mediterrânea, Médio-Oriental ou Asiática origem. Seu médico saberá isso ..

tem uma doença chamada porfiria , quente, um grupo doenças sanguíneas que seu sistema nervoso, pele ou ambos danificado.

Você tem sintomas nos seus pulmões, fígado ou nervos sofrido (periférica neuropatia) após a ingestão de nitrofurantoína ou outros nitrofuranos.

Tem dúvidas sobre algum dos pontos acima? Diga o ao seu médico.

Quando deve você ter cuidado com este medicamento ?Entre em contato com seu médico ou farmacêutico antes de antes de você este medicamento toma se:

você diabetes tem (diabetes).

você problemas com seus rins tem. Você deve então possivelmente extra serão controlados por seu médico durante o tratamento.

você sente tem de nenhuma sensação ou uma fraca sensação em seu braços e pernas (neuropatia periférica).

você anemia tem. Isso causa menos glóbulos vermelhos células sanguíneaspele pálida ,, um fraco sensação e falta de ar estar. Ou se você muito pouco vitamina B ou uma quantidade anormal sal no seu sangue tem. Seu médico pode lhe aconselhamento dar.

você anteriormente alérgicas reações teve ..

acima pontos podem poder de chance aumentar em um efeito colateral que causa danos aos seus nervos . Issopode fazer com que as coisas pareçam diferentes sentir de preocupações para formigamento.

você uma doença nos seus pulmões, fígado ou sistema nervoso tem.

deve você este medicamento antes um poucos meses usar? Então deseja seu médico talvez regularmente verificar quão bem seus pulmões e fígado funcionam.

Especialmente se u mais velho está.

este medicamento pode também causar uma doença pulmonar em pacientes que não têm danos nos pulmões anteriores ter sofrido. Doença pulmonar pode ocorrer em pacientes que recebem curto ou longo tratamento ..

diarreia tem que é causada causado por um bactéria chamada clostridium difficile chama-se.

você outros medicamentos contra bactérias usa.

você tem problemas de cansaço estar, amarela cor de sua pele ou olhos, coceira, erupção cutânea, dor nas articulações, sintomas no seu abdômen, náusea são, vômito, sem apetite, urina escura e fezes pálidas ou cinzentas. Isso pode ser sintomas de uma doença em seu fígado.

este medicamento pode influenciar ter no resultado de exames de glicose na sua urina. O resultado pode por isso falso-positivo ser.

Algumas pessoas negras e pessoas de origemmediterrânea , oriental ou asiática podem durante o tratamento desenvolver anemia. Pertence você a este grupo? E sente você durante o tratamento desconforto de cansaço, tontura e falta de ar ? Pare então detomar ingerir de este medicamento. Tome também contato com seu médico.

Usa você outros medicamentos ?Usa

você além de Nitrofurantoína Activase ainda ainda outros medicamentos, tem você isso recentemente feito ou vai você fazer talvez em breve fazer ?Informe isso então então seu

médico ou farmacêutico. Usa você um dos seguintes medicamentos juntos com Nitrofurantoína Activase? Então podem estes medicamentos diferente funcionar trabalhar. Ou pode Nitrofurantoína Activase diferente ir trabalhar:

Magnesiumtrisilicato. Isto é um antiácido. Este medicamento é usado como a digerir de comer em seu corpo não bem vai.

Medicamentos contra uma inflamação em uma articulação com dor (gota). Por exemplo probenecida de sulfonpirazona.

Medicamentos que fazem com que a comida permaneça no seu estômago por mais tempo. Por exemplo atropina ou hioscina.

Medicamentos contra uma tipo catarata (glaucoma). Como inibidores da anidrase carbônica. Por exemplo acetazolamida.

Medicamentos que sua urina menos ácida fazem (urina-alkalinizantes agentes). Por exemplo um mistura de citrato de potássio.

Medicamentos contra infecções (quinolonas).

Vacina contra a febre tifoide se for via oral for ingerida.

Em que deve você prestar atenção com comida e bebida?

Este medicamento deve com comida ou leite ser tomado. Isso ajuda a assegurar que você não tenha problemas gástricos recebe. O irá também ajudar com o absorver este este medicamento.

Gravidez e amamentação

Está grávida, acha u grávida estar estar, deseja grávida ficar ou dá u amamentação? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico antes de u este medicamento usar.

Gravidez

Para tanto quanto conhecido pode este medicamento durante a gravidez ser usado. Não deve ser usado durante o parto parto. Uso de este medicamento durante o parto pode afetar o seu bebê (vera seção ' Quando não deve posso este medicamento não usar?' acima).

Amamentação

Você quer amamentar dar? Então, consulte primeiro contato com seu médico. Este medicamento passa para o leite materno. Isto pode ser perigoso para bebês menores de 3 meses. Pode também ser perigoso para bebês que não têm um tipo de enzima não têm.

Habilidade de condução e o uso de máquinas

Este medicamento pode fazer com que você se sinta tonto e sonolento .. Dirija nenhum auto e operar nenhum máquinas se você aqui desconforto tem. Espere até estes sintomas novamente desaparecerem ..

medicamento medicamento contém lactose e sódio

O seu médico lhe disse que você alguns açúcares não tolera? Então entre em contato com seu médico antes de este medicamento toma.

Este medicamento contém menos de 1 mmol de sódio (23 mg) por cápsula, o que quer dizer que na essência 'isento de sódio'.

3. Como toma você este medicamento em?

Use este medicamento sempre exatamente como seu médico ou farmacêutico lhe disse .. dúvidas sobre o correto uso? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico.

Siga muito bem as instruções de uso do seu médico. Complete o tratamento . Mesmose você se sente melhor sente.

Recomendado dose

Adultos e crianças acima de 10 anos:

A dosagem normal depende de do tipo infecção que você tem. O instruções de uso devem ser escritas no rótulo que seu farmacêutico lhe dá. Entre em contato com seu médico ou farmacêutico se estes instruções de uso não claras são.

O normais dosagens são:

Para o tratamento de infecções: 1 cápsula de 50 mg 4 vezes por dia para 7 dias

Para o tratamento de infecções graves que não desaparecem e continuam recorrentes: 1 cápsula de 100 mg 4 vezes por dia durante 7 dias

Para assegurar que você não tenha outras infecções recebeantes de dormir Para assegurar que você não tenha infecções recebe durante uma operação: 1 cápsula de 50 mg 4 vezes por dia no dia da operação e por 3 3 depois ..

Uso em crianças e bebês mais velhos que 3 meses:

A dose depende de do peso da criança. Seu médico determina a dose. Siga muito bem as instruções de uso do seu médico.

O uso deste medicamento (umacápsula) pode possivelmente não se ajustar bem em adolescente crianças. Outras formas de este medicamento podem ser melhores. Como um líquido. Tem dúvidas? Entre em contato com seu médico de farmacêutico.

Uso em crianças menores de 3 meses:

Crianças menores de 3 meses não devem usar este medicamento.

Modo de administração

Este medicamento deve sempre com comida ou leite ser tomado. O medicamento funciona então melhor.

Cápsulas devem inteiras ser engolido. Esqueça seu medicamento não em tomar ..

médicos Seu

médico irá muito bem observar atentamente em possíveis influências em seu fígado, pulmões, sangue ou sistema nervoso. Este medicamento pode influenciar ter nos resultados de alguns exames de glicose na sua urina.

Tomou você demasiado de este medicamento ingerido ?Contacte

imediatamente o seu médico ou farmacêutico . Ou vápara para de departamento de emergência do hospital na vizinhança.

Leve sempre as cápsulas que você ainda tem restantes. Leve também a embalagem e o rótulo com. Assim sabe o médico pessoal o que você tomou ..

tomar este medicamento em tomar ? Lembre-semais tarde no

dia você mais tarde no dia a? Então tome a dose de esse dia como normal. Perdeu você uma dose para o dia inteiro ? Então tome adose normal dose de seguinte dia em. Tome nenhuma

dose dupla para uma dose esquecida para compensar .. ? Entre em contato com seu médico ou farmacêutico farmacêutico.

Se você parar de tomar este medicamento medicamento
Seu médico irá lhe informar quanto tempo você este medicamento deve tomar. Pare não antes do que lhe é dito .Também não se você se melhor sente.

Tem você mais perguntas sobre o uso uso de este medicamento? Entre em contato com seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como qualquer medicamento pode também este medicamento efeitos colaterais ter. Nem todo mundo tem com isso a ver.

A maioria dos efeitos colaterais são leves. Eles desaparecem novamente quando você você pare com o uso deste este medicamento.

Todos os medicamentos podem reações alérgicas causar. Mas graves reações alérgicas ocorrem quase nunca para. Tem você repentina um chiado respiração, problemas com respirar, inchaço de suas pálpebras, rosto ou lábios, erupção cutânea ou coceira (especialmente por todo o corpo)? Pare então de tomar este medicamento . Vátambém imediatamente ao para um médico.

Tem efeitos colaterais um dos seguintes efeitos colaterais? Pare então com o uso deste medicamento . Entretanto em contato com seu médico. Um

grupo grupo doenças sanguíneas que seu sistema nervoso, pele, ou ambos danificado (porfiria aguda).Seus

pulmões podem reagir a nitrofurantoína . Isso pode rápido, dentro uma semana após o início do tratamento acontecer. O pode também muito lentamente surgir.

Especialmente em pacientes idosos. Dit pode causar febre ,calafrios , tosse, falta de ar, desmaiar ou uma cor azul da azul cor de sua pele. Há podem cicatrizes surgir devido a danos ao tecido nos seus pulmões.

Icterícia (inflamação do fígado que uma amarela cor de sua pele ou esclera causado).

Seu fígado pode também menos bem começar a funcionar (insuficiência hepática).

Isso pode fatal são.

O nervos fora da sua medula espinhal podem danificar. Isto pode causar mudanças na sensação e no uso uso de seu músculos. A tratamento deve ser interrompido ao primeiro sinais de uma sensação de formigamento ou nenhuma sensação em em suas mãos ou pés. Você pode também ter problemas de dor de cabeça, mudanças extremas de humor ou saúde mental, estar confuso, um fraco sensação e visão turva. Esses sintomas podem ser graves. Em alguns casos nunca desaparecem mais .. altas pressão em sua cabeça. Isso causa uma forte dor de cabeça.

Azul ou roxa cor da sua pele devido a muito pouco oxigênio em seu sangue. Esta doença chama-se cianose.

Sintomas de febre, gripe, dor abdominal, diarreia, sangue em seu cocô e uma sensação fraca. Isto podem ser sintomas de uma doença que vasculite cutânea se chama.

Sintomas de icterícia, cansaço estar, dor abdominal, dor nas articulações e inchaço. Isso podem ser sintomas de uma doença que auto- o carrohepatite autoimune quente.

Tenha em mente que sua urina amarelo escuro ou marrom pode ficar durante uso deste medicamento . Isso é muito normal. Isto é muito normal. Isto é não razão para parar de usar o uso deste medicamento.

Outros efeitos colaterais podem ser:

Raramente (ocorrem para em menos de 1 em 1000 usuários)

Dano da sua medula óssea. Isso faz com que você tenha poucos glóbulos vermelhos sanguíneos (anemia).

Não conhecido (pode com os dados disponíveis não ser determinado)

Em alguns pacientes as células sanguíneas estão danificadas. Isso pode causar para hematomas ,coagulação mais lenta do sangue ,dor de garganta ,febre ,anemia anemia mais rapidamente um resfriado pegar ou de um resfriado ter que não vai embora.

Náusea estar

Diarréia (fezes soltas)

Falta de apetite, dor abdominal e vômito

Alguns pacientes receberam desconforto de diferentes tipos de erupção cutânea ou problemas de pele. Há também casos relatados de uma grave inflamação da pele e em outros partes do corpo por uma alergia a um medicamento (síndrome DRESS). Você pode ter problemas de descamação na sua pele, vermelha erupção cutânea ou febre junto com uma rápida frequência cardíaca e grave erupção cutânea com bolhas.

Outros sintomas podem ser: inflamação de glândulas salivares (que dor facial causam), inflamação do pâncreas (que dor abdominal severa causa causae dor nas articulações dor nas articulações.

De nervos fora seu medula espinhal podem danificar. Isto pode causar alterações na sensação e o uso dos seus músculos .. Além disso pode ter desconforto de de dor de cabeça, mudanças extremas de humor ou saúde mental (psicose), estar confuso estar, uma sensação de fraqueza, movimentos com seus olhos fazer sem que você isso mesmo queira (fazendo com que seus olho rápido para frente e para trás, para cima para baixo ou em um círculo pode mover e você embaçado pode ver). Esses sintomas podem muito ser. Em alguns casos ir eles nunca mais embora.

Cansado estar, calafrios e febre por medicamentos Rápida

perda de cabelo Infecção

de de seu trato urinário por patógenos que não sensíveis são a nitrofurantoína.

Inflamação das paredes de pequenos vasos sanguíneos. Isso causa dano a sua pele.

Inflamação do seu fígado porque seu sistema imunológico suas células hepáticas ataca.

Inflamação do tecido ao redor de tubos em seus rins. Isso faz com que seus rins funcionem menos bem.

Este medicamento pode ter efeito sobre o resultados de alguns exames de glicose na sua urina.

O relato de efeitos colaterais

Se você tiver efeitos colaterais, entre em contato com seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Dit aplica-se também a efeitos secundários que não neste folheto estão .

Você pode efeitos secundários também relatar através do Centro Holandês de Efeitos Secundários Lareb, site: www.lareb.nl. Ao efeitos colaterais para relatar, ajuda você nos a mais informações obter sobre a segurança do este medicamento ..

5. Como guarda você este medicamento?

Fora da vista e alcance de crianças manter.

Use este medicamento não mais após o última data de validade. A encontra no caixa e o blister após EXP. Lá está um mês e um ano. O último dia de mês é a data de validade final.

Conservar abaixo 25 °C.

Não jogue medicamentos no ralo da pia ou no vaso sanitário e descarte os não na lixeira. Pergunte ao seu farmacêutico o que fazer com medicamentos que devem ser descartados e não mais usados . Se você descartar medicamentos da maneira correta serão elas uma maneira correta destruídas e entram elas não no meio ambiente acabam.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Quais substâncias estão no este medicamento?

A substância ativa no este medicamento é nitrofurantoína nitrofurantoína.

Activase 50 mg cápsulas duras cápsulas: Cada dura cápsula contém 50 mg nitrofurantoína. Nitrofurantoína Activase 100 mg dura cápsulas: Cada dura cápsula contém 100 mg nitrofurantoína.

O outro substâncias em este medicamento são talco, amido de milho e lactose monoidratada. A cápsula da cápsula contém gelatina, dióxido de titânio (E 171) e óxido de ferro amarelo (E 172).

Como parece Nitrofurantoína er é e o que contém uma embalagem?

Nitrofurantoína 50 mg cápsulas duras têm uma tampa amarela e amarelo-marfim romp. As cápsulas contém amarelo até amarelo-claro pó.

Nitrofurantoína 100 mg cápsulas duras têm uma tampa marfim-amarela e romp. As cápsulas contém amarelo até até amarelo-esbranquiçado pó.

Nitrofurantoína é disponível em blisteres com 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 84 ou 90 cápsulas duras.

É possível que nem todos os tamanhos de embalagem no comércio estejam trazido.

Titular da autorização para a comercialização introdução e fabricante

Titular da Autorização:

Activase Pharmaceuticals Limited

11 Boumpoulinas,

P.C. 1060, Nicósia

Chipre

Fabricante:

Elara Pharmservices Europe Limited
Regus Block 1, Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15,
D15 AKK1
Irlanda

No registo inscrito sob

Nitrofurantoína Activase 50 mg cápsulas duras: RVG 131639

Nitrofurantoína Activase 100 mg cápsulas cápsulas: RVG 131640

Este medicamento é registrado nos Estados-Membros do Espaço Económico Europeu sob os seguintes nomes:

Irlanda	Nitrofurantoína 50 mg cápsulas duras en Nitrofurantoína 100 mg harde cápsulas
Países Baixos	Nitrofurantoína Activase 50 mg harde cápsulas & Nitrofurantoína Activase 100 mg harde cápsulas
Bélgica	Nitrofurantoína Activase 50 mg cápsula & Nitrofurantoína Activase 100 mg cápsula
Portugal	Nitrofurantoína 50 mg Cápsula & Nitrofurantoína 100 mg Cápsula
Eslovênia	Nitrofurantoína Activase 50 mg cápsula & Nitrofurantoína Activase 100 mg cápsula

Este folheto é para o última aprovado em novembro 2025