

Prospect: informații pentru utilizatorul Nitrofurantoină
Activase 50 mg capsule dure Nitrofurantoină
Activase 100 mg capsule dure nitrofurantoină
Citiți

cu atenție întregul prospect înainte dumneavoastră acest medicament veți utiliza, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră. Păstrați

- acest prospect .. aveți are ul mai târziu din nou nevoie.
- Aveți dumneavoastră întrebări ? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul ..
- acest medicament nu mai departe altora la alții, deoarece este doar pentru dumneavoastră prescris. Acesta poate fi dăunător pentru alții ,chiar dacă au aceleași simptome ca dumneavoastră . u.
- Aveți dumneavoastră disconfort de la una dintre efectele secundare menționate în secțiunea 4 ?Sau aveți dumneavoastră un efect secundar care nu este menționat în acest prospect stare? Contactați pe dumneavoastră medicul sau farmacistul.

Conținutul acestui prospect Ce este

1. Nitrofurantoina Activase și pentru ce se utilizează acest medicament utilizat?
2. Când nu trebuie să acest medicament nu utilizați sau trebuie să fiți extra precaut cu fiți?
3. Cum luați acest medicament ? în?
4. Posibile efecte secundare
5. Cum păstrați dumneavoastră acest medicament?
6. Conținutul ambalajului și alte informații 1.

1. Nitrofurantoina Activase și pentru ce este este acest medicament utilizat?

Nitrofurantoina este substanța activă în în acest medicament. Nitrofurantoina este un medicament împotriva infecțiilor cauzate de un bacterie (antibiotic). Este utilizat pentru tratarea infecțiilor ale tractului urinar și vezicii urinare . Este utilizat de asemenea vezică. Acesta este de asemenea utilizat pentru a asigura că dumneavoastră aceste infecții nu primiți.

Vă simțiți dumneavoastră vă în timpul sau după tratamentului nu nu mai bine? Sau vă simțiți dumneavoastră se mai rău? Contactați atunci medicul dumneavoastră.

2. Când nu aveți voie să acest medicament nu utilizați sau trebuie să fiți precaut cu sunt?

Când aveți voie să acest medicament nu utilizați?

Sunteți alergic la nitrofurantoină sau la una dintre substanțele din acest medicament.

Aceste substanțe puteți dumneavoastră găsi în rubrica 6 din acest prospect. Sunteți alergic la alte nitrofurani.

Medicul dumneavoastră v-a spus că rinichii dumneavoastră nu funcționează bine lucru minut).Sunteți în

ultima etapă a sarcinii dumneavoastră sarcină (de naștere).

Puteți acest medicament nu utiliza la bebeluși mai mici de trei luni.

Vă lipsește o enzimă care glucozo-6-fosfat dehidrogenază fierbinte. Astfel pot dumneavoastră roșii globule mai ușor deteriora. Acest apare mai des la

persoanele de culoare neagră și persoanele de origine mediteraneană, Orientale sau asiatică origine. Medicul dumneavoastră va ști acest lucru.

Aveți o boală numită porfirie , porfirie, un grup boli de sânge care vă sistemul nervos, pielea sau ambele deteriorat.

Aveți simptome în plămâni dumneavoastră , ficat sau nervi avuți (periferică neuropatie) după administrarea administrării de nitrofurantoină sau alte nitrofurani.

Aveți îndoieli cu privire la unul dintre punctele de mai sus? Spuneți al medicului dumneavoastră .

Când trebuie să fiți precaut cu acest medicament ? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua acest medicament dacă:

aveți diabet (diabet).

aveți probleme cu rinichii dumneavoastră . Trebuie să atunci posibil posibil extra sunt verificate de medicul dumneavoastră în timpul tratamentului tratament.

probleme cu lipsa de senzație sau un sentiment slab în în dumneavoastră brațele și picioarele (neuropatie periferică).

aveți anemie . Acest lucru cauzează mai puține globule roșii mai puțin roșu piele palidă, paloare piele, un slăbit senzație și respirație scurtă fi. Sau dacă dumneavoastră prea puțin vitamina B sau o cantitate anormală de sare în sângele dumneavoastră are. Medicul dumneavoastră poate să vă sfat dea.

aveți avut reacții alergice înainte ..

de mai sus pot fi importante de șansa crește pe un efect secundar care cauzează pentru deteriorare la nervii dumneavoastră. Acest poate cauza că lucrurile se simt diferit de îngrijorări pentru furnicături.

dumneavoastră un boală în dumneavoastră plămâni, ficat sau sistem nervos aveți. trebuie să acest medicament pentru un cuplu luni utiliza? Atunci doriți dumneavoastră medicul poate regulat verifica cât de bine dumneavoastră plămâni și ficatul funcționează. Mai ales dacă u vârstnic sunteți.

acest medicament poate de asemenea provoca o boală pulmonară la pacienți care nu au deteriorare deteriorare plămânilor au avut gehad. Boală pulmonară poate apărea la pacienți care un scurtă sau lungă tratament primesc.

aveți diaree care este provocată cauzată de o bacterie numită clostridium difficile se numește.

dvs. alte medicamente împotriva bacteriilor utilizați.

aveți probleme cu oboseală fiind ,, galben culoare de dumneavoastră piele sau ochi, mâncărime, erupție cutanată, dureri articulare, probleme în abdomenul dumneavoastră ,greață greață sunt, vărsături, lipsa poftei de mâncare, urină închisă la culoare și scaun palid sau gri . Acestea pot fi simptome ale unei boli un boală în dumneavoastră ficat.

acest medicament poate influența avea asupra rezultatului al testelor de glucoză în dumneavoastră urină. Rezultatul poate astfel fals-pozitiv fi ..

Unii negri oameni și oameni de mediteraneană, orientală sau asiatică origine pot în timpul tratamentului anemie face .. Aparțineți dumneavoastră acestei grup ? Și aveți dumneavoastră în timpul tratamentului simptome de oboseală ,amețeală și dificultăți de respirație sunteți ? Opriti administrarea ingera de acest medicament. Luați de asemenea legătura cu medicul

dumneavoastră. Utilizați dumneavoastră alte medicamente?

Utilizați dumneavoastră pe lângă Nitrofurantoina Activase alte medicamente, ați u asta recent făcut sau de veți u acest lucru poate în curând face? Spuneți asta atunci dumneavoastră medicul sau farmacistul. Utilizați dumneavoastră unul dintre următoarele medicamente împreună cu Nitrofurantoină Activase? Atunci pot aceste medicamente altfel acționa funcționa. Sau poate Nitrofurantoină Activase altfel merge funcționa:

Magnesiumtrisilicat. Acesta este un antiacid. Acest medicament este utilizat ca să digera de mâncare în dumneavoastră corp nu bine merge.

Medicamente împotriva unei inflamații în o articulație cu durere (guta). De exemplu probenecid de sulfpirazon.

Medicamente care asigură că alimentele rămân în stomacul dumneavoastră mai mult timp. De exemplu atropină sau hioscină.

Medicamente împotriva unei tip cataractă (glaucom). Cum inhibitori ai anhidrazei carbonice. De exemplu acetazolamidă.

Medicamente care fac urina mai puțin acidă să devină (urina-alkalinizante substanțe). De exemplu un amestec de citrat de potasiu.

Medicamente împotriva infecțiilor (chinolone).

Vaccinul împotriva febrei tifoide dacă este administrat oral este luat.

La ce trebuie să a fi atent cu mâncare și băutură?

Acest medicament trebuie cu mâncare sau lapte să fie administrat. Acest ajută să asigure că dumneavoastră nu aveți dureri de stomac primiți. Va ajuta de asemenea la absorbția acestui medicament . Sarcina și.

Sunteți însărcinată alăptare

credeți căsunteți însărcinată u însărcinată să fiți, doriți să rămâneți însărcinată sau alăptați dați dumneavoastră alăptare? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de să utilizați acest medicament.

Sarcină

Pentru cât cunoscut poate acest medicament în timpul sarcinii sarcinii fi utilizat. Nu trebuie să fie utilizat în timpul nașterii nașterii utilizat. Utilizarea a acestui medicament în timpul nașterii poate avea efect asupra copilului dumneavoastră (vezisecțiunea ' Când nu trebuie săutilizați poți acest medicament nu utilizați?' mai sus).

Alăptare

Doriți să alăptați ?Consultați mai întâi medicul dumneavoastră. dumneavoastră medic. Acest medicament se regăsește în. Acest poate fi periculos pentru bebelușii mai mici de 3 luni. Acesta poate de asemenea fi periculos pentru bebelușii care nu au un tip de enzimă nu au.

Aptitudinea de a conduce vehicule și utilizarea mașinilor de mașini

Acest medicament poate face să vă simțiți amețit și somnoros . Conduceți. Conduceți nu auto și manipulați nu mașini dacă dumneavoastră aici suferiți de aveți. Așteptați până când aceste simptome din nou dispar sunt.

Acest medicament conține lactoză și sodiu

V-a dumneavoastră medicul spus că dumneavoastră anumite zaharuri nu tolerați? Contactați dumneavoastră medicul înainte să acest medicament administrați.

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol sodiu (23 mg) per capsulă, ceea ce înseamnă că este în esență 'fără sodiu' .3.

3. administrați dumneavoastră u acest medicament în?

Utilizați acest medicament întotdeauna exact așa cum medicul dumneavoastră sau farmacistul v-a spus v-a spus. Aveți îndoieli cu privire la corect utilizare? Contactați dumneavoastră medicul sau farmacistul.

Urmați foarte bine instrucțiunile de utilizare de la medicul dumneavoastră. Finalizați cura de tratament . Chiardacă vă simțiți se mai bine se simte.

Recomandat doză

Adulți și copii mai mari de 10 ani:

Doza normală depinde de tipul de infecție care dumneavoastră are. Instrucțiunile de utilizare trebuie să fie scrise pe etichetă care farmacistul dumneavoastră vă oferă . Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă ca aceste instrucțiuni de utilizare nu clare sunt.

Dozele normale sunt ::

tratamentul infecțiilor : 1 capsulă de 50 mg de 4 ori: 1 capsulă de 50 mg 4 zi pentru zi pentru 7 zile

Pentru tratamentul infecțiilor severe care nu dispar și revin constant : 1 capsulă de 100 mg de 4ori pe zi timp de 7 7 zile

Pentru a asigura că dumneavoastră nu alte infecții primește înainte de culcare Pentru a asigura că dumneavoastră nu infecții primiți infecții primește în timpul o operație: 1 capsulă de 50 mg de 4 ori pe zi în ziua operației și pentru 3 zile după 3 . Utilizare.

Utilizare la copii și bebeluși mai mari de 3 luni:

Doza depinde de de greutatea copilului. Medicul dumneavoastră determină doza de doză.

Urmați foarte bine instrucțiunile de utilizare ale medicului dumneavoastră. Utilizarea acestui medicament (o capsulă) poate să nufie potrivită pentru dumneavoastră bine la tineri copii. Alte forme acest medicament pot fi mai bune. Cum ar fi un lichid. Aveți îndoieli? Contactați dumneavoastră medic farmacist.

Utilizare la copii mai mici de 3 luni:

Copiii mai mici de 3 luni nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Mod de administrare

Acest medicament trebuie întotdeauna cu mâncare sau lapte să fie luat. Medicamentul medicamentul funcționează atunci mai bine.

Capsulele trebuie întregi a fi înghițit. Uitați dumneavoastră medicament nu în a lua.

Medicale controale

Dumneavoastră medic va foarte bine observa la posibile influențe asupra ficatului , plămânilor, sângelui sau sistemului nervos . Acest medicament poate avea efect asupra rezultatelor unor teste de anumite investigații de glucoză în dumneavoastră urină.

Ați luat prea mult din acest medicament ? Contactați

imediat medicul dumneavoastră sau farmacistul . Sau mergeți la către de departamentul de urgență al spitalului din apropiere.

Luați întotdeauna capsulele pe care le mai aveți rămase. Luați de asemenea ambalajul și eticheta al etichetă cu tine. Astfel știe personalul medical ce ați luat ..

uitat să luați acest medicament la timp ?Vă

amintiți mai târziu în zi zi la? Luați atunci doza de acea zi ca de obicei. Ați omis o doză pentru întreaga zi ? Luați atunci doza normală doză de următoarea zi în. Luați nu dublă doză pentru a o doză uitată a recupera . Aveți. medicul dumneavoastră sau farmacistul dumneavoastră farmacist.

Dacă dumneavoastră opriți administrarea acestui medicament Acest medicament Medicul dumneavoastră vă va spune cât timp trebuie să luați acest medicament trebuie să luați. Opriți nu mai devreme decât vi se spune .De asemenea, nu dacă vă simțiți mai bine ..

Aveți dumneavoastră alte întrebări despre utilizarea utilizare de acest medicament? Contactați dumneavoastră medicul, farmacistul sau asistenta medicală.

4. Posibile efecte secundare

Ca orice medicament poate de asemenea acest medicament efecte secundare au. Nu toată lumea primește cu asta de a face.

Cele mai multe efecte secundare sunt ușoare. Ele dispar din nou pleacă dacă dumneavoastră opriți utilizarea acestui medicament acest medicament.

Toate medicamentele pot cauza reacții alergice. Dar reacții alergice severe sunt aproape niciodată pentru. Aveți dumneavoastră bruscă un șuierătoare respirație, probleme cu respirația, umflarea pleoapelor dumneavoastră ,fața sau de buze, erupție cutanată sau mâncărime (în special pe corpul întreg dumneavoastră)? Opriți atunci administrarea acestui medicament . Mergeți de asemenea imediat la către un medic.

Aveți probleme cu un dintre următoarele efecte secundare? Opriți atunci utilizarea acestui medicament . Contactați de asemenea medicul dumneavoastră dumneavoastră medic. Un

grup grup boli de sânge care dumneavoastră sistemul nervos, pielea, sau ambele deteriorat (porfirie acută).Plămâni dumneavoastră pot reacționa la nitrofurantoină . Acest lucru poate. Acest poate rapid, în o săptămână după începutul tratamentului apare. Poate de asemenea foarte lent să se dezvolte .. la pacienții vârstnici pacienți. Acest poate provoca febră ,frisoane , tuse, dificultăți de respirație, leșin sau culoare albastră a pielii sau buzele dumneavoastră piele. Pot apărea cicatrici din cauza deteriorării țesutului din plămâni dumneavoastră . Icter. inflamația ficatului care provoacă ficatului care culoare galbenă culoarea a dumneavoastră pielii sau albul ochilor cauzat). Ficatul dumneavoastră poate de asemenea mai puțin bine începe să funcționeze (insuficiență hepatică). Acest lucru poate letal sunt.

Nervii nervii în afara măduvei spinării pot deteriora. Acest lucru poate provoca schimbări în senzație și utilizarea lor utilizare de dumneavoastră mușchii. Tratamentul tratament trebuie să fie oprit la primele simptome de un senzație de furnicături sau lipsa senzației sau fără în dumneavoastră mâinile sau picioarele. Puteți avea de asemenea probleme cu dureri de cap, schimbări extreme de dispoziție sau sănătate

mentală, să fiți confuz, un slab senzație și vedere neclară. Aceste simptome pot fi grave. În unele cazuri nu dispar niciodată mai mult.

Doze presiune în dumneavoastră craniu. Acest lucru provoacă o durere de cap. Albastru sau violet culoare a pielii dumneavoastră din cauza prea puțin oxigen în dumneavoastră sânge. Această boală se numește cianoză.

Simptome de febră, gripă, dureri abdominale, diaree, sânge în dumneavoastră scaun și un sentiment slab. Acestea pot fi simptome ale unei boli numită vasculită cutanată se.

Simptome de icter, oboseală a fi, dureri abdominale, dureri articulare și umflare.

Acestea pot fi simptome ale unei boli care este auto- această auto-hepatită autoimună fierbinte.

Țineți cont de faptul că urina dumneavoastră poate deveni galben închis sau maro poate deveni în timpul utilizării acestui acest medicament. Acest lucru este foarte normal. Aceasta nu este un motiv pentru a opri utilizarea acestui medicament de la acest medicament.

Alte efecte secundare pot fi:

Rareori (apar pentru la mai puțin de 1 din 1000 utilizatori)

Deteriorare a măduvei osoase. Acest lucru duce la prea puține globule roșii (anemie).

Nu cunoscute (poate cu disponibile datele nu fi determinat)

La unii pacienți sunt celulele sanguine deteriorate. Acest lucru poate vântăți pentru albastre ,coagulare mai lentă a sângelui ,durere în gât ,febră ,anemie și mai rapid o răceală a face sau de un răceală avea care nu dispare ..

a fi Diaree

(scaune moi) Lipsa poftei de mâncare,dureri de burtă

și vărsături Unele vărsături

Unele pacienți au primit disconfort de diferite tipuri de erupții cutanate sau probleme ale pielii. Au fost sunt de asemenea cazuri raportate de o inflamație severă a pielii și în alte părți ale corpului din cauza unei alergii la un medicament (sindromul DRESS).

Puteți avea probleme din cauza descuamării pe pielea dumneavoastră piele, roșie erupție cutanată sau febră împreună cu un ritm cardiac rapid și erupție cutanată severă cu vezicule . Alte simptomepot fi : sunt: inflamație de glandele salivare (care durere facială cauzează), inflamație a pancreasului (care durere severă abdominală cauzează cauzeazăși durere articulară dureri articulare.

De nervi în afara dumneavoastră măduva spinării pot deteriora. Acest lucru poate provoca schimbări în senzație și utilizarea mușchilor dumneavoastră . dumneavoastră mușchi. În plus puteți avea disconfort de la dureri de cap, schimbări extreme de dispoziție sau sănătate mentală (psihoză), să fiți confuzsau ,un sentiment de slăbiciune ,, mișcări cu ochii dumneavoastră faceți fără ca să vă doriți (ceea ce face ca ochiul dumneavoastră să se miște înainte și înapoi, sus și jos sau în un cerc poate mișca și dumneavoastră neclar puteți vedea). Aceste simptome pot foarte fi. În unele cazuri a merge ei niciodată mai mult departe.

Obosit a fi, frisoane și febră din cauza medicamente Pierdere rapidă

de păr Infecție de

Infecție de dumneavoastră tractul urinar de către patogeni care nu sensibili sunt la nitrofurantoină.

Inflamație a pereților ai vaselor sanguine mici. Astfel apare deteriorare la pielea dumneavoastră.

Inflamație a ficatului dumneavoastră din cauza sistemului imunitar care atacă celulele hepatice ..
a țesutului din jur în jurul de tuburi în rinichii dumneavoastră. Din această cauză rinichii dumneavoastră funcționează mai puțin bine ..
medicament poate avea influență asupra pe rezultatele de unele investigații de glucoză în urina dumneavoastră. urină.

Raportarea efectelor secundare Aveți efecte secundare, contactați medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală medic, farmacist de asistent medical. Acest se aplică de asemenea pentru efecte secundare care nu sunt în acest prospect . Puteți raporta efecte secundare de asemenea raporta prin Centrul Olandez de Raportare a Efectelor Secundare Lareb, website: www.lareb.nl. Prin efecte secundare a raporta, ajutați ne pe noi să obținem informații despre siguranța acestui medicament . 5. Cum.

5. Cum păstrați dumneavoastră acest medicament?

A se păstra departe de vederea și îndemâna copiilor a se păstra ..

acest medicament după data de expirare indicată termen data de expirare. Aceasta găsiți dumneavoastră pe cutie și ambalajul blister după EXP. Acolo este o lună și un an. Ultima zi a din lună este data de expirare.

Păstrați sub 25 °C.

Nu aruncați medicamentele nu în chiuvetă sau în toaletă și aruncați le nu în coșul de gunoi. Întrebați farmacistul dumneavoastră ce să faceți cu medicamentele pe care nu le mai utilizați . Dacă medicamentele sunt eliminate corect , în mod corespunzător , eliminați sunt ele pe un mod corect distruse și ajung ele nu în mediu ajung.

6. Conținutul al ambalajului și alte informații

Care substanțe sunt în acest medicament?

Substanța activă în acest medicament este nitrofurantoina nitrofurantoină.

Activase 50 mg capsule tari capsule: Fiecare tare capsulă conține 50 mg nitrofurantoină.
Nitrofurantoină Activase 100 mg tare capsule: Fiecare tare capsulă conține 100 mg nitrofurantoină.

Alte ingrediente substanțele în acest medicament sunt talc, amidon de porumb și lactoză monohidrat. Capsula învelișul conține gelatină, dioxid de titan (E 171) și galben oxid de fier (E 172). (E 172).

Cum arată Nitrofurantoină sau și ce conține un ambalaj ? Nitrofurantoină

50 mg capsule tari au un capac galben dop și ivoriu-galben trunchi. Capsulele conțin galben până la galben-alb pulbere.

Nitrofurantoină 100 mg capsule tari au un capac ivoire-galben și trunchi. Capsulele conțin galben până la până la alb-gălbui pulbere.

Nitrofurantoină este disponibil în ambalaje blister cu 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 84 sau 90 capsule tari.

Este posibil că nu toate dimensiunile ambalajului pe piață sunt adus.

Deținător al autorizației pentru introducerea pe piață a și producător

Deținătorul autorizației:

Activase Pharmaceuticals Limited

11 Boumpoulinas,

P.C. 1060, Nicosia

Cipru

Producător:

Elara Pharmaservices Europe Limited

Regus Block 1, Blanchardstown Corporate Park,

Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15,

D15 AKK1

Irlanda

În registru înregistrat sub

Nitrofurantoină Activase 50 mg capsule tari: RVG 131639

Nitrofurantoină Activase 100 mg capsule capsule: RVG 131640

Acest medicament este înregistrat în statele membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri ::

Nitrofurantoin 50 mg capsule tari capsule en Nitrofurantoin 100 mg tari capsule

Olanda Nitrofurantoină Activase 50 mg tari capsule & Nitrofurantoină Activase 100 mg tari capsule

Belgia Nitrofurantoin Activase 50 mg gélule & Nitrofurantoin Activase 100 mg capsulă

Portugalia Nitrofurantoină 50 mg Capsulă & Nitrofurantoină 100 mg Capsulă

Slovenia Nitrofurantoin Activase 50 mg capsule & Nitrofurantoin Activase 100 mg capsule

Acest prospect este pentru ultima dată aprobat în noiembrie 2025