

Bipacksedel: information för användaren användaren
Nitrofurantoin Activase 50 mg hårda kapslar
Nitrofurantoin Activase 100 mg hårda kapslar
nitrofurantoin

Läs noga hela bipacksedel innan du detta läkemedel ska använda, eftersom det finns viktig information i för dig.

- Spara denna bipacksedel. Kanske har du honom senare igen behöver.
- Har du ytterligare frågor? Kontakta då din läkare eller apotekare.
- Ge denna medicin inte vidare till andra, eftersom det är endast till dig förskrivet. Det kan skadligt vara för andra, även om de har samma symtom som du.
- Får du besvär av en av de biverkningar som i avsnitt 4 står? Eller får du en biverkning som inte i denna bipacksedel tillstånd? Kontakta då din läkare eller apotekare ..

av denna bipacksedel Vad är

1. Nitrofurantoin Activase och vad används denna medicin för används?
2. När får du detta läkemedel inte använda eller måste du vara extra försiktig med vara?
3. Hur tar du detta läkemedel in?
4. Möjliga biverkningar
5. Hur förvarar du denna medicin?
6. Innehåll av förpackningen och övrig information 1.

1. Nitrofurantoin Activase och vad används det till blir detta läkemedel använt?

Nitrofurantoin är den aktiva substansen i detta läkemedel. Nitrofurantoin är ett läkemedel mot inflammationer på grund av en bakterie (antibiotikum). Det används för behandling av infektioner i dina urinvägar och blåsa . Det används också blir också används för att se till att du inte får dessa infektioner ..

du dig under eller efter behandlingen inte behandling inte bättre? Eller känner du dig sämre? Kontakta då din läkare.

2. När får du detta läkemedel inte använda eller måste du vara extra försiktig med är?

När får du detta läkemedel inte använda?

Du är allergisk mot nitrofurantoin eller mot en av de ämnena i detta läkemedel. Dessa ämnen kan du hitta i avsnitt 6 i denna bipacksedel.

Du är allergisk mot andra nitrofuraner.

Din läkare har dig berättat att dina njurar inte fungerar arbeta minut).Du är i sista fasen av din graviditet graviditet (de förlossningen).

Du får detta läkemedel inte använda hos spädbarn yngre än tre månader.

Du saknar ett enzym som glukos-6-fosfatdehydrogenas heter. Detta kan dina röda blodkroppar lättare skadas. Detta förekommer oftare hos svarta människor och människor från Medelhavet mediterrän, Mellan-östlig eller asiatisk härkomst. Din läkare kommer att veta.

Du har en sjukdom som porfyri kallas, en grupp blodsjukdomar som ditt nervsystem, hud eller båda skadad.

Du har symtom i dina lungor, lever eller nerver haft (perifer neuropati) efter att ha tagit av nitrofurantoin eller andra nitrofuraner.

Tvekar du om någon av ovanstående punkter? Berätta det för din läkare.

När bör du vara extra försiktig med detta läkemedel? Kontakta din läkare eller apotekare innan du tar detta läkemedel om:

du har diabetes (diabetes).

du har problem med dina njurar. Du måste då möjligen extra kontrolleras av din läkare under behandlingen. du besväras.

ingen känsla eller en svag känsla i dina armar och ben (perifer neuropati).
du har anemi. Detta orsakar mindre röda blodkroppar, blek hud, en svag känsla och andfådd vara. Eller om du får lite vitamin B eller en avvikande mängd salt i ditt blod har.
Din läkare kan du råd ge.

du tidigare allergiska reaktioner har haft.

De ovanstående punkter kan de risk öka på en biverkning som orsakar för skada på dina nerver. Detta kan göra att saker känns annorlunda av oro för stickningar.

du har en sjukdom i dina lungor, lever eller nervsystem har.

måste du ta detta läkemedel för en par månader använda? Då vill din läkare kanske regelbundet kontrollera hur bra dina lungor och lever fungerar. Särskilt om du äldre är.
detta läkemedel kan också orsaka en lungsjukdom hos patienter som inte tidigare skada på lungorna har haft. Lungsjukdom kan uppstå hos patienter som en kort eller lång behandling får.

du har diarré som orsakas av en bakterie som kallas clostridium difficile heter.
du använder andra mediciner mot bakterier använder.

du har besvär av trött vara, gul färg av din hud eller ögon, klåda, hudutslag, ledvärk, besvär i din mage, illamående är, kräkas, ingen aptit, mörk urin och blek eller grå avföring. Detta kan symptom vara av en sjukdom i din lever.

detta läkemedel kan påverka resultatet av undersökningar av glukos i din urin.
Resultatet kan därför falskt positivt vara är.

Vissa svarta människor och människor från medelhavsregionen, orientaliska eller asiatiskt ursprung kan under behandlingen få anemi .. Hör du till denna grupp? Och får du under behandlingen besvär av trött ,yr och andfådd är ? Sluta då med att ta av detta läkemedel. Ta också kontakt med din läkare.

Använder du andra läkemedel? Använder

du förutom Nitrofurantoin Activase andra ännu andra mediciner, har du det nyligen gjort eller ska du ta detta kanske snart göra? Berätta det då till din läkare eller apotekare. Använder du en av de följande läkemedel tillsammans med Nitrofurantoin Activase? Då kan dessa läkemedel annars bli fungera. Eller kan Nitrofurantoin Activase annars gå fungera:

Magnesiumtrisilikat. Detta är en antacida. Detta läkemedel används som det smälta smälta av mat i din kropp inte bra går.

Läkemedel mot en inflammation i en led med smärta (gikt). Till exempel probenecid av sulfinpyrazon.

Läkemedel som gör att mat längre i din mage stannar. Till exempel atropin eller hyoscin.

Läkemedel mot en typ grå starr (glaukom). Som karbanhydrashämmare. Till exempel acetazolamid.

Läkemedel som din urin mindre sur gör (urin-alkaliserande medel). Till exempel en kaliumcitratblandning.

Läkemedel mot infektioner (kinoloner).

Vaccin mot tyfoidfeber om det tas oralt tas tas.

Vad bör du observera med mat och dryck?

Detta läkemedel ska med mat eller mjölk tas . Dettahjälper att se till att du inte får magbesvär får. Det kommer också hjälpa vid upptagning av detta detta läkemedel.

Graviditet och amning

Är du gravid, tror du gravid att vara, vill du bli gravid eller ger du amning ? Kontakta då din läkare eller apotekare innan du denna medicin använder används.

Graviditet

För såvitt bekant kan denna medicin under graviditeten användas . Det får inte användas under förlossningen används under de förlossning. Användning av detta läkemedel under förlossningen kan påverka ditt barn (se avsnittet 'När får du rubrik 'När får du detta medel inte använda?' ovan).

Amning

Vill du amma ge? Kontakta då först din läkare. Detta läkemedel kommer in i bröstmjölken bröstmjölk. Det kan farligt för bebisar yngre än 3 månader. Det kan också farligt vara för bebisar som en typ enzym inte har.

Körförmåga och den användning av maskiner

Detta läkemedel kan orsaka att du känner dig yr och sömning . Kör. Kör ingen bil och använd ingen maskiner om du här besvär har. Vänta tills dessa symtom åter borta är.

Detta läkemedel innehåller laktos och natrium

Har din läkare berättat att du vissa sockerarter inte tål? Kontakta då din läkare innan du detta medicin tar.

Detta medicin innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per kapsel, det betyder att det i princip 'natriumfritt' är.

3. Hur tar du detta läkemedel in?

Använd detta läkemedel alltid exakt som din läkare eller apotekare du det har sagt. Tvivlar du på det rätta användning? Kontakta då din läkare eller apotekare.

Följ mycket noga de bruksanvisningar från din läkare. Avsluta behandlingskuren . Ävenom du känner dig bättre känner.

Rekommenderad dos

Vuxna och barn äldre än 10 år:

Den vanliga dosen beror på typen av infektion infektion som du har. De bruksanvisningar måste skrivas på etiketten etikett som din apotekare du ger. Kontakta din läkare eller apotekare om dessa bruksanvisningar inte tydliga är.

Den normala doserna är:

För behandling av infektioner: 1 kapsel på 50 mg 4 gånger per dag före 7 dagar

För behandling av svåra infektioner som inte försvinner och ständigt återkommer: 1 kapsel på 100 mg 4 gånger per dag i 7 dagar

För att säkerställa att du inte andra infektioner får: 1 kapsel på 50 mg eller 1 kapsel på 100 mg sänggåendet För att

säkerställa att du inte infektioner ingen infektioner får under en operation: 1 kapsel på 50 mg 4 gånger per dag på dagen av operationen och för 3 3 därefter ..

Användning vid barn och bebisar äldre än 3 månader:

Dosen beror på barnets vikt . Din läkare bestämmer dosen de dosering. Följ mycket noggrant anvisningarna från din läkare. Användningen

av denna medicin (en kapsel) passarmöjligen inte bra inte bra vid yngre barn. Andra former av denna medicin kan vara bättre. Som en vätska. Tvekar du? Kontakta då din arts of apotekare.

Användning hos barn yngre än 3 månader:

Barn yngre än 3 månader får inte använda denna medicin.

Sätt för administrering

Detta läkemedel ska alltid med mat eller mjölk tas .Läkemedlet fungerar då bättre .. ska hela hel bli sväljas. Glöm din medicin inte i att ta.

Medicinska kontroller

Din läkare kommer mycket noga observera på möjliga påverkan på din lever, lungor, blod eller nervsystemet. Detta läkemedel kan påverka resultaten av vissa undersökningar vissa undersökningar av glukos i din urin.

Har du för mycket av denna medicin tagit?

Kontakta omedelbart din läkare eller apotekare . Eller gå till till de akutmottagningen på sjukhuset i närheten.

Ta alltid med kapslarna som du fortfarande har kvar. Ta också förpackningen och etiketten det etikett med. Så vet det medicinska personalen vad du har tagit.

Har du glömt denna medicin på att ta?

Tänk på det senare på dagen till? Ta då dos av den dag som vanligt. Har du en dos för hela dagen missat? Ta då vanliga dosen nästa dag in. Ta ingen dubbel dos för att kompensera en glömd dos för att komma ikapp. Är du osäker? Kontakta då din läkare eller apotekare apotekare.

Om du slutar med att ta denna detta läkemedel

Din läkare kommer att berätta för dig hur länge du ska detta läkemedel ta . Sluta ta. Stop inte tidigare än du blir informerad. Också inte om du känner bättre mår.

Har du andra frågor om användningen användning av detta läkemedel? Kontakta då din läkare, apotekare eller sjuksköterska.

4. Möjliga biverkningar

Som varje läkemedel kan också detta läkemedel biverkningar har. Inte alla får det att göra.

De flesta biverkningar är milda. De försvinner igen bort när du slutar med användning av denna medicin.

Alla mediciner kan allergiska reaktioner orsaka. Men svåra allergiska reaktioner förekommer nästan aldrig för. Har du plötslig en väsende andning, problem med andningen, svullnad av dina ögonlock, ansikte eller läppar, hudutslag eller klåda (särskilt över din hela kropp)? Sluta då ta detta läkemedel . Gå ocksåomedelbart till omedelbart till en läkare.

Får du besvär av en av de följande biverkningar? Sluta då med användning av denna medicin. Kontakta också din läkare. En

grupp grupp blodsjukdomar som din nervsystem, hud, eller båda skadad (akut porfyri). Dina lungor kan reagera på nitrofurantoin. Detta kan snabbt, inom en vecka efter början av behandlingen hända. Det kan också mycket långsamt utvecklas. Särskilt hos äldre patienter. Detta kan orsaka feber ,frossa , hosta, andfåddhet, svimning eller en blå färg på blå färg från din hud. Det kan ärr uppstå genom skada på vävnaden i dina lungor.

Gulsot (inflammation i levern som en gul färg av din hud eller ögonvitor orsakar). Din lever kan också mindre bra börja fungera (leversvikt). Detta kan dödlig är.

De nerver utanför din ryggmärg kan skada. Detta kan orsaka för förändringar i känslor och användning användning av dina muskler. Behandlingen måste avbrytas vid de första tecken på en stickande känsla eller ingen känsla i dina händer eller fötter. Du kan också få problem med huvudvärk, extrema förändringar i humör eller mental hälsa, vara förvirrad eller, en svag känsla och suddig syn. Dessa besvär kan vara allvarliga. I vissa fall försvinner de aldrig mer bort.

Högre tryck i din skalle. Detta orsakar svår huvudvärk ..

eller lila färg på din hud på grund av för lite lite syre i ditt blod. Denna sjukdom kallas cyanos.

Symtom av feber, influensa, buksmärta, diarré, blod i din avföring och en svag känsla. Detta kan vara symtom på en sjukdom som kutan vaskulit kallas.

Klagomål av gulsot, trött vara, buksmärta, ledvärk och svullnad. Detta kan vara av en sjukdom som auto- den bilautoimmun hepatit het.

Tänk på att din urin mörkgul eller brun kan bli under användning av denna medicin . Detta är helt normalt normal. Detta är ingen anledning att sluta med användningen av denna medicin ..

biverkningar kan vara ::

(förekommerkomma för vid mindre än 1 av 1000 användare)

Skada på ditt benmärg. Detta leder du till få röda blodkroppar (anemi).

Inte känd (kan med de tillgängliga uppgifter inte fastställas)Hos

vissa patienter är de blodcellerna skadade . Dettakan kan blåmärken för blå fläckar, långsammare koagulering av blodet, halsont, feber, anemi och snabbare få en förkylning eller en förkylning ha som inte försvinner ..

vara Diarré

(lösavföring)Ingen aptit,

magont och kråkas Vissa

Några patienter fick besvär av olika typer hudutslag eller hudproblem. Det finns också fall rapporterade av en allvarlig inflammation i huden och andra delar av kroppen på

grund av en allergi mot en medicin (DRESS-syndrom). Du kan få besvär av fjäll på din hud, röd hudutslag eller feber tillsammans med en snabb hjärtfrekvens och allvarlig hudutslag med blåsor. Andra symtom kan vara: inflammation av spottkörtlar (som ansiktssmärta orsakar), inflammation av din bukspottkörtel (som svår buksmärta orsakar) och ledvärk.

Den nerver utanför ditt ryggmärg kan skada. Detta kan orsaka förändringar förändringar känsel och användning av dina muskler . muskler. Dessutom kan du få besvär av huvudvärk , extremahumörförändringar eller psykisk hälsa (psykos), vara förvirradoch ,en svag känsla ,, rörelser med dina ögon göra utan att du det själv vill (vilket gör att dina öga snabbt fram och tillbaka, upp och ner eller i en cirkel kan röra sig och du suddigt kan se). Dessa symtom kan mycket vara. I vissa fall gå de aldrig mer bort.

Trött vara, kalla frossa och feber på grund av mediciner

Snabb förlust av hår

Infektion av din urinvägar genom patogener som inte känsliga är för nitrofurantoin.

Inflammation av väggarna av små blodkärl. Detta leder till skada på din hud.

Inflammation av din lever på grund av ditt immunförsvar dina leverceller attackerar.

Inflammation av vävnad runt de rör i dina njurar. Detta gör dina njurar mindre bra fungera.

Denna medicin kan påverka ha på resultaten av vissa undersökningar av glukos i din urin.

Att rapportera av biverkningar

Får du besvär av biverkningar, kontakta då din läkare, apotekare eller sjuksköterska. Detta gäller också för biverkningar som inte i denna bipacksedel finns. Du kan biverkningar också rapportera via Nederländerna Biverknings Centrum Lareb, webbplats: www.lareb.nl. Genom biverkningar att rapportera, hjälper du oss att få information om säkerheten för detta läkemedel . 5..

5. Hur förvarar du detta läkemedel?

Utanför synhåll och räckhåll för barn hålla.

Använd detta läkemedel inte mer efter utgångsdatumet sista hållbarhetsdatum. Den finns du på lådan och blisterförpackningen efter EXP. Där står en månad och ett år . Densista dagen dag av den månad är sista hållbarhetsdatum.

Förvara under 25 °C.

Spola mediciner inte ner i handfatet eller toaletten och släng dem inte i soptunnan. Fråga din apotekare vad du ska göra med mediciner som du inte längre använder . Om du mediciner på rätt sätt bortskaffar korrekt sätt dränerar bli de på en korrekt sätt förstörda och kommer de inte i miljön hamnar.

6. Innehåll av förpackningen och övrig information information

Vilka ämnen finns det i denna medicin?

Den aktiva substansen i denna medicin är nitrofurantoin.

Nitrofurantoin Activase 50 mg hårda kapslar: Varje hård kapsel innehåller 50 mg nitrofurantoin.

Nitrofurantoin Activase 100 mg hårda kapslar: Varje hård kapsel innehåller 100 mg nitrofurantoin.

De andra ämnen i denna medicin är talk, majsstärkelse och laktosmonohydrat. Kapselns hölje innehåller gelatin, titandioxid (E 171) och gul järnoxid (E 172). (E 172).

Hur ser Nitrofurantoin ut och vad innehåller en förpackning? Nitrofurantoin 50 mg hårda kapslar har en gul hätta och elfenbensgul elfenbensgul kropp. Kapslarna innehåller gul till gulvit pulver.

Nitrofurantoin 100 mg hårda kapslar har en elfenbensgul hätta och kropp. Kapslarna innehåller gul till gulvit pulver.

Nitrofurantoin är tillgänglig i blisterförpackningar med 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 84 eller 90 hårda kapslar.

Det är möjligt att inte alla förpackningsstorlekar på marknaden finns bragt.

Innehavare av tillstånd för att i handeln sätta och tillverkare

Tillståndsinnehavare:

Activase Pharmaceuticals Limited

11 Boumpoulinas,

P.C. 1060, Nicosia

Cypern

Tillverkare:

Elara Pharmaservices Europe Limited

Regus Block 1, Blanchardstown Corporate Park,

Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15,

D15 AKK1

Irland

I registret registrerad under

Nitrofurantoin Activase 50 mg hårda kapslar: RVG 131639

Nitrofurantoin Activase 100 mg hårda kapslar: RVG 131640

Detta läkemedel är registrerat i medlemsstater i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet under följande namn ::

Nitrofurantoin 50 mg hårda kapslar kapslar en Nitrofurantoin 100 mg hårda kapslar

Nederländerna Nitrofurantoin Activase 50 mg hårda kapslar & Nitrofurantoin Activase 100 mg hårda kapslar

Belgien Nitrofurantoin Activase 50 mg gelkapsel & Nitrofurantoin Activase 100 mg kapsel

Portugal Nitrofurantoin 50 mg Kapsel & Nitrofurantoin 100 mg Kapsel

Slovenien Nitrofurantoin Activase 50 mg kapsel & Nitrofurantoin Activase 100 mg kapslar

Denna bipacksedel är för den senast godkänd i november 2025