

## Notice: information pour l' utilisateur

NorLevo 1,5 mg, comprimés  
lévonorgestrel

Lisez attentivement toute la notice avant de prendre ce médicament prendre car se trouve importante information dans pour vous.

Utilisez ce médicament toujours exactement comme décrit dans cette notice ou comme votre médecin, pharmacien, droguiste ou GGD vous que a dit.

Conservez cette notice. Peut-être aurez vous besoin de lui plus tard de nouveau besoin.

Avez u encore questions? Contactez votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Ressentez -vous des un des effets secondaires mentionnés dans la section 4 figurent?

Ou présente vous un effet secondaire qui n'est pas dans cette notice mentionné?

Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que NorLevo en pourquoi est ce médicament utilisé?
2. Quand ne devez-vous pas ce médicament utiliser ou devez vous faire particulièrement attention avec être être?
3. Comment utilisez vous ce médicament?
4. Effets indésirables
5. Comment conservez vous ce médicament?
6. Contenu de l' emballage et autres information

1. Qu'est-ce que NorLevo et à quoi sert ce médicament ?NorLevo

est un contraceptif d'urgence oral contraceptif d'urgence.

Qu'est-ce que contraception d'urgence?

Contraception d'urgence est une méthode qui est destinée à prévenir une grossesse après un rapport sexuel non protégé ou en cas d'échec de la.

Quand devez vous ce contraceptif d'urgence prendre?

Vous devez ce médicament dès que possible prendre ,de préférence dans 12 12 heure et pas plus tard que 72 heures (3 jours) après le rapport sexuel non protégé ou après l' échec d' une méthode contraceptive . Comment. Comment plus vite ce médicament après le non protégé rapport sexuel est pris, mieux il fonctionne . Cemédicament peut seulement prévenir que vous vous enceinte devient si vous le dans 72 heures après le rapport sexuel prenez. Le médicament ne fonctionne pas si vous êtes déjà enceinte . Si vous après prise de ce médicament rapports sexuels non protégés rapports sexuels avez, ne le médicament pas empêcher que vous enceinte devenir.

Il est démontré que ce médicament 52% à 85% des grossesses attendues prévient.

Si vous pour une des raisons suivantes soupçonnez que vous enceinte peut être:

vous avez eu des rapports sexuels sans contraception  
vous avez oublié de votre pilule contraceptive  
pilule contraceptive temps de prendre à prendre;  
le préservatif de votre partenaire est cassé s'est déchiré, s'est déplacé ou s'est enlevé ;vous avez peur  
que votre stérilet a bougé détaché;  
votre pessaire de votre cape cervicale est déplacé ou vous avez l' trop tôt retiré;  
vous craignez que la méthode du coït interruptus ou la méthode du rythme a échoué;  
dans le cas de viol.

Ce médicament arrête la libération d'un ovule par votre ovaires. Il ne peut pas empêcher qu' un ovule fécondé s' implante dans l' utérus.

Ce comprimé est uniquement destiné à contraception d'urgence, ne comme méthode contraceptive car elles moins efficaces sont que la «normale» pilule contraceptive (« la pilule»).

Ce médicament est pas destiné aux filles précédant à leur première menstruation.

2. Quand ne pouvez-vous ce médicament pas utiliser ou devez u er extra prudent avec être?

Quand pouvez-vous ce médicament ne pas utiliser?

Vous êtes allergique à un des composants de ce médicament. Ces substances pouvez vous trouver dans rubrique 6.

Quand devez vous faire attention être avec ce produit?

Le utilisation de ce médicament est déconseillée dans les cas suivants:

si vous avez eu une grossesse extra-utérine(ectopique grossesse par le passé eu (ceci est le cas si le bébé se en dehors de l'utérus se développe);

si vous une infection de vos trompes de Fallope a eu (salpingite);

si vous avez des antécédents ou familiaux de de un facteur de risque connu pour thrombosecaillots sanguinscaillots sanguins

si vous avez une grave maladie digestive qui affecte l' absorption des aliments et médicaments réduit;

si vous avez de graves problèmes hépatiques ou un grave maladie de l' intestin grêle, comme la maladie de Crohn.

Une précédente grossesse extra-utérine (ectopique) et une un antérieure inflammation des trompes de Fallope augmentent le risque d' une (nouvelle) grossesse extra-utérine grossesse. vous devez consulter si comme u précédemment un extra-utérine (ectopique) grossesse ou une inflammation des trompes de Fallope avez eu contacter prendre avec votre médecin avant vous ce médicament utilisez.

Utilisez contraception d'urgence seulement occasionnellement et en cas d'urgence et pas comme, ou en remplacement de ordinaire méthodes contraceptives parce que:

il ne dans tous les cas grossesse prévenir;

le risque de un excès de hormones un déséquilibre de la cycle peut provoquer.

Par contraception d'urgence peut une grossesse ne pas être interrompue.

Si vous dans le même cycle menstruel (plus de 72 heures il y a) déjà une fois auparavant non protégée rapport sexuel a eu, peut déjà une fécondation avoir eu lieu. L' utilisation de ce

médicament après le deuxième fois rapport sexuel peut donc aucune grossesse plus empêcher.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament que un fois dans un cycle menstruel dans prendre parce que cela votre cycle peut perturber.

Ce médicament fonctionne pas zo bien que les méthodes contraceptives (la pilule, préservatif). Votre médecin peut vous informer sur les méthodes de longue long terme qui plus efficace prévenir que vous tombez enceinte ..

utilisation de ce médicament médicament:

doit être exclue par par un test de grossesse effectuer à faire:

si votre prochaine période menstruelle plus de cinq jours en retard est;  
en cas de anormal perte de sang, aussi à la date prévue des menstruations.

Toutes les femmes doivent aussi rapidement que possible après un rapport sexuel non protégé prendre une contraception d'urgence . Il. Il être indications que ce médicament peut-être moins efficace pourrait être chez un poids corporel élevé ou un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé, mais ces données étaient limitées et non concluantes. C'est pourquoi est ce médicament pour toutes les femmes recommandé, indépendamment de leur poids ou IMC.

Vous est conseillé contact avec de prendre avec votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous vous inquiétez de concernant éventuels problèmes dans pansement avec le prise de contraception d'urgence.

Si vous pendant le rapport sexuel n'avez pas préservatif utilisé (ou si il s'est déchiré ou glissé dérapé) est-il possible que vous une maladie sexuellement transmissible (sexuellement transmissible maladie, MST) ou le VIH-virus avez contracté. L' utilisation de la pilule contraceptive d'urgence offre aucune protection contre sexuellement transmissibles maladies ou contre infection par le VIH-virus et peut les précautions (précaution)mesures chez risque de transmission ne pas remplacer (voir «Autres informations» en bas de cette notice).

Enfants et adolescents jusqu'à 18 an

Le efficacité de NorLevo chez les jeunes (jusqu'à 18 ans) est comparable à celle chez les adultes. La posologie pour les jeunes est identique à qui pour adultes. Prenez ce médicament pas avant la première menstruation.

Utilisez vous encore d'autres médicaments?

Utilisez u encore autres médicaments ou avez vous que récemment fait ?Informez cela à votre pharmacien , médecin oudroguiste . Cela. Cela s'applique également aux médicaments pour lesquels aucune ordonnance n'est nécessaire et médicaments à base de plantes.

Certains médicaments peuvent faire en sorte que NorLevo soit moins bien fonctionne. Si vous avez utilisé dernières 4 semaines un des médicaments avez utilisé qui ci-dessous sont mentionnés, alors peut NorLevo moins approprié pour vous sont. Un médecin peut vous un autre contraceptif d'urgence prescrire, comme un stérilet en cuivre (DIU-Cu), qui par un médecin doit être placé. Si un stérilet pour vous aucune option n'est pas ou si vous ne immédiatement chez votre médecin pouvez aller, prenez alors deux fois autant de NorLevo dans :

- barbituriques et médicaments contre l'épilepsie (comme primidone, phénytoïne, carbamazépine)
- médicaments contre la tuberculose (comme rifampicine, rifabutine)-
- hiv médicaments (ritonavir, efavirenz)
- un médicament contre infection fongique (griséofulvine)
- remèdes à base de plantes avec millepertuis (*Hypericum perforatum*)

Consultez votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous conseil besoin avez sur combien comprimés vous devez prendre.

Consultez dès que possible possible après vous avez comprimés pris avec un médecin pour exclure une grossesse et pour des conseils supplémentaires sur un autre avis fiable forme de régulière contraception (voir aussi rubrique 3 « Comment prenez vous ce médicament » pour plus d'informations).

Aussi peut NorLevo le fonctionnement de autres médicaments affecter:

- un médicament qui ciclosporine est appelé (utilisé pour le système immunitaire de supprimer).

NorLevo ne doit pas être utilisé en combinaison avec médicaments contenant ulipristal acétate ..

et allaitement Si vous  
enceinte enceinte êtes:

Si vous êtes déjà enceinte êtes, peut ce médicament cette grossesse pas interrompre.

Si vous ce médicament utilisez et toutefois enceinte devenez, sont il n'y a aucun indication que cela nuisible est pour le bébé (foetus). Cependant, vous ne devez pas ce médicament pas utiliser si vous enceinte bent.

Si vous après prise de ce médicament enceinte devenez, vous devez contacter pour prendre avec votre médecin. Votre médecin veut puis peut-être vérifier si vous aucune extra-utérine grossesse avez (le bébé se développe quelque part en dehors de votre utérus). Ceci est particulièrement important si vous sévères douleur dans votre ventre ressentez après la prise de ce médicament ou si vous avez déjà une fois eu une grossesse extra-utérine (ectopique) grossesse ou un opération à vos trompes de Fallope ou une maladie inflammatoire du bassin avez eu ..

allaitez allaitement donne:

Allaitement est possible. Mais parce que lévonorgestrel est excrété dans le lait maternel, il est prudent de donner le sein juste avant la prise du comprimé de donner et pendant 8 heures après prise de ce médicament le lait maternel à tirer et lait à jeter à jeter. Si vous pendant cette période lait tirez, devez vous le jeter.

Demandez votre médecin ou pharmacien pour conseil avant de un médicament va utiliser.

Aptitude à conduire et l' utilisation de machines

Après prise de ce produit certaines femmes ont ressenti de la fatigue en vertiges (voir rubrique 4 "Effets indésirables"): ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si vous ressentez des effets ceux-ci symptômes.

Il n'y a aucune étude réalisée sur l'effet de cet médicament sur la conduite et sur la capacité à utiliser des machines . servir.

NorLevo contient lactose monohydraté

Ce médicament contient lactose monohydraté. Si votre médecin vous a dit que vous certaines types de sucres ne tolérez pas bien tolérez, contactez-le /elle avant vous ce médicament allez utiliser.

### 3. Comment utilisez vous ce produit?

Utilisez ce médicament toujours précisément comme dans la notice indiqué ou comme votre médecin, pharmacien ou droguiste vous l'a dit .. -vous sur le bon ? utilisation? Contactez votre médecin.

NorLevo peut à tout moment de votre cycle menstruel être pris, en supposant que vous n'êtes pas enceinte ou pense que vous enceinte pourriez être .Ne pas mâcher le comprimé ne pas mâcher, mais l'avalé entier avec de l'eau. Avalez

le comprimé aussi rapidement que possible .Le de préférence dans 12 heures, mais en tout cas pas plus tard que 72 heures (3 jours) après que vous ayez eu des rapports sexuels non protégés . Ne retardez pas. Réglez le prendre du comprimé pas de. Comment plus vite vous prenez le comprimé après le non protégé rapport sexuel prenez, mieux ça fonctionne . Le comprimé peut seulement prévenir que vous tombez enceinte devenez, si vous le prenez dans les 72 heures après un rapport sexuel non protégé.

Si vous un des médicaments utilisez qui assurer peuvent faire que NorLevo moins bien fonctionne (voir rubrique ci-dessus "Autres médicaments et NorLevo") ou si vous dans le passé 4 semaines un de ces médicaments a utilisé, alors peut NorLevo moins approprié pour vous être. Votre médecin peut vous alors un autre contraceptif d'urgence prescrire, comme un stérilet en cuivre (CuIUD). Si un stérilet en cuivre pour vous n'est pas une option ou si vous ne immédiatement chez votre médecin pouvez aller, prenez alors deux fois autant de NorLevo (donc au même moment tous les comprimés prendre).

Si vous utilisez déjà un régulier méthode contraceptive utilisez comme la pil contraceptive, alors pouvez vous la prendre à l' habituel moment continuer à prendre. Dans le cas où vous aucun menstruelle saignement dans la prochaine période sans pilule a , alors vous devez faire un test de grossesse pour exclure une grossesse de façon sûre.

Si vous dans trois heures après la prise du comprimé devez vomir, vous devez immédiatement prendre un autre comprimé . Contactez votre pharmacien votre pharmacien, arts de pharmacien, si vous encore un comprimé nécessaire avez.

Après l' utilisation de ce médicament vous devez utiliser un contraceptif utiliser (préservatif, spermicide ou un diaphragme ) jusqu'à la prochaine période menstruelle commence . Si vous après l' utilisation de de ce médicament encore non protégée rapport sexuel a (aussi si ce dans le même cycle menstruel est), protège ce médicament ne de nouveau contre un

grossesse. Si vous utilisez fait de un méthode contraceptive comme la pilule contraceptive orale , alorsvous devez sert cette comme d'habitude utiliser à rester continuer.

Votre médecin peut vous conseiller sur les méthodes contraceptives pour le long terme qui seront plus efficaces préviendront empêcheront que vous enceinte devient.

Si vous ordinaire hormonale contraception continuez utilisiez comme la pilule contraceptive et vous dans votre période sans pilule aucune perte de sang n'avez pas, consultez alors votre médecin pour vérifier si vous n'êtes pas enceinte . Votre

prochaine menstruation après que vous ayez pris ce médicament ingéré  
Après le utilisation de ce médicament est votre menstruation habituellement normale et commencera ceci au jour prévu commencer; parfois sera ceci cependant un quelques jours plus tard ou plus tôt sont.

Si votre menstruation plus de 5 jours en retard est, ou inhabituellement légère de lourd est, ou si vous pour un autre raison pensez que vous enceinte êtes, devez vous avec un test de grossesse (faire) vérifier si vous enceinte êtes. Si vous toutefois après prise de ce médicament enceinte devenez, il est important que vous votre médecin consultiez.

Avez -vous trop de ce médicament utilisé ?Il

n'y a pas de rapports d'une intoxication aiguë ou d'effets nocifs graves après le prendre de trop de ce médicament en une fois . Vous pouvez cependant avoir des nausées , vomireffectivement ou vomir de vaginale saignements obtenir. U devez pour conseil contacter prendre contact avec votre médecin, pharmacien ou droguiste.

#### 4. Effets indésirables

Comme chaque médicament peut aussi ce médicament avoir des effets secondaires , bien quetout le monde ne les ressent pas . Les.

suivants peuvent survenir sont observés:

Très souvent (se produisent chez plus de 1 sur 10 utilisateurs ):vertiges

vertigemaux de tête ;nausées

nauséedouleurs abdominales douleur abdominale;

sensibles seins, retard de la menstruation, lourdes menstruations, saignements, douleurs utérines;

fatigue.

Souvent (surviennent fréquemment chez moins de 1 sur 10 utilisateurs):

diarrhée, vomissements;

douleurs menstruelles.

Non connu (ne peut avec les données disponibles pas être déterminé):

Depuis ce médicament sur le marché est ont été thrombo-emboliques événements (caillots sanguins) signalés.

Réactions allergiques, telles que gonflement de la gorge et dans le visage et éruption cutanée peuvent survenir après prise de ce médicament.

## Le signalement des effets indésirables

Avez-vous vous souffrez de effets secondaires, contactez votre médecin. Cela s'applique également pour d'éventuels effets secondaires qui ne sont pas dans cette notice. Vous pouvez effets secondaires également directement signaler via le Néerlandais Effets Indésirables Centre Lareb, site web : [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). En signalant à signaler, vous pouvez nous aider plus d'informations à obtenir sur la sécurité de ce médicament.

## 5. Comment conservez -vous ce médicament?

Hors de la vue et portée des enfants conserver.

La plaquette dans l' emballage extérieur conserver pour protéger contre la lumière.

N'utilisez ce médicament plus après la date de péremption qui est indiquée mentionné sur le boîte et le blister après « EXP ». La date de péremption fait référence à le dernier jour de ce mois.

Utilisez ce médicament non si vous visibles signes de détérioration remarquez; le produit doit alors être retourné ramené votre pharmacien ..

médicaments médicaments ne par le évier ou les toilettes et jetez -les ne dans la poubelle. Demandez à votre pharmacien ce que vous devez faire avec les médicaments que vous devez faire dont vous ne plus utilisé. Elles sont alors de une manière responsable détruites et ne pas dans l'environnement se retrouvent ..

## 6. de l' emballage et dans autres informations

Quelles substances contiennent il y a dans ce médicament?

La substance active dans ce médicament est le lévonorgestrel. Les autres substances dans dans ce médicament sont: lactose monohydraté, amidon de maïs, povidone, colloïdal silice anhydre, stéarate de magnésium.

Levonorgestrel appartient à un groupe de médicaments que l'on désigne comme contraceptifs d'urgence.

Comment se présente NorLevo 1,5 mg et combien contient un emballage ?Un NorLevo NorLevo 1,5 mg comprimé est un blanc, rond biconvexe comprimé avec inscription du code NL 1.5 sur une face.

Chaque emballage contient un comprimé avec 1,5 mg de lévonorgestrel.

Titulaire de l' autorisation pour la mise sur le marché apporter

Laboratoire HRA Pharma  
200 avenue de Paris  
92320 CHATILLON  
France

Fabricants CENEXI

17, Rue de Pontoise  
95520 OSNY - FRANCE

Delpharm Lille S.A.S.  
Parc d'Activités Roubaix-Est  
22 rue de Toufflers  
CS 50070  
59452 Lys Lez Lannoy – France

NorLevo 1,5 mg comprimés est inscrit au registre enregistré sous RVG 32303.

Si vous après la lecture de ce notice encore quelque part pas sûr de cela ou si vous questions avez, contactez votre pharmacien ou médecin ou consultez le site de Rutgers WPF ([www.rutgerswfpf.nl](http://www.rutgerswfpf.nl)).

Ce médicament est enregistré dans les États membres de l'EEE sous les noms : Pays-Bas  
NorLevo 1,5 mg, comprimés Autriche  
Vikela 1,5 mg comprimé Cette

notice notice est pour le dernière approuvé en mai 2025.

## AUTRES INFORMATIONS

### a) Quelques informations sur le cycle menstruel et contraception

#### - Le cycle menstruel

Le cycle menstruel est le temps entre deux périodes menstruelles. Habituellement dure le cycle 28 jours, mais la durée peut varier d'une femme à l'autre différer. Une femme menstrue seulement lorsque elle pas enceinte est.

#### - Fécondation

Au milieu de chaque cycle se produit un un ovule (ovule) libéré dans un des 2 ovaires (ceci moment s'appelle 'ovulation' ou 'ovulation'). Habituellement se produit au ovulation milieu du cycle se produit, mais cela peut également à tout autre moment pendant le cycle se produire.

Après le rapport sexuel peuvent masculines spermatozoïdes (spermatozoïdes) l' ovule libéré s'approcher œuf venir ovule féconder ( c.-à-d. .une. d'un spermatozoïde avec l' ovule ce qui forme un embryon est formé ). formé).

Après quelques jours , l' œuf fécondé s' implante dans l' utérus et commence la grossesse.

#### - Contraceptifs (contraception)

Avec méthodes contraceptives peut être prévenu:

- ovulation: avec l'aide de la pilule contraceptive
- fécondation (fusion d' un spermatozoïde avec l' ovule): avec aide de la préservatif
- implantation d' un ovule fécondé dans l' utérus: avec l'aide du stérilet.

#### - Pilules contraceptives d'urgence

Par l' utilisation de pilules contraceptives d'urgence est après rapports sexuels le ovulation bloqué ou retardé ou est la implantation de l' ovule fécondé empêchée. Elles ne fonctionnent pas comme de implantation déjà a eu lieu.

Quand une femme rapport sexuel a sans utilisation d' une méthode contraceptive peut la probabilité de grossesse pas être exclu.

Si vous ce médicament avez pris, mais aucune méthode contraceptive utilisez, est fortement recommandé de un médecin ou GGD à consulter. Vous recevrez alors des conseils sur la méthode contraceptive qui pour vous est le plus appropriée .

b) Conseils en cas de risque de transmission de une sexuellement transmissible maladie

Si vous non protégée rapport sexuel avez, courez le risque d'attraper une sexuellement transmissible maladie de contracter, surtout si vous le sexuelle antécédents de votre partenaire ne connaissez ou si vous plusieurs partenaires avez. Pour questions pouvez u à juste titre chez votre médecin, pharmacien ou GGD.

## GLOSSAIRE

Extra-utérine (ectopique) grossesse: une grossesse qui se développe en dehors de utérus, généralement dans une des trompes de Fallope. Parmi les symptômes figurent douleurs abdominales persistantes, règles manquées, saignements vaginaux, signes de grossesse (nausées, seins sensibles). Si vous présentez de tels symptômes, vous devez immédiatement consulter votre médecin pour avis.

Salpingite: infection des trompes de Fallope. Parmi les symptômes figurent douleurs abdominales, fièvre et écoulement vaginal abondant.