

## Pakuotės lapelis: informacija vartotojui de vartotojui

NorLevo 1,5 mg, tabletės  
levonorgestrelis

Perskaitykite atidžiai visą pakuotės lapelį prieš jus šį vaistą pradėsite vartoti nes yra svarbi informacija joje jums. Naudokite

šį vaistą visada tiksliai kaip aprašyta šiame pakuotės lapelyje arba kaip jūsų gydytojas gydytojas, vaistininkas, vaistininkas ar GGD jums kad turi pasakė.

Laikykite šį pakuotės lapelį. Galbūt jums jo vėliau vėl prireiks.

Ar u dar klausimai? Tada susisiekiite su jūsų gydytoju, vaistininku arba vaistininku.

Ar jus vargina vienas iš šalutinių poveikių nurodytų skyriuje 4 paminėti? Arba gaunate jus šalutinį poveikį kuris nėra šiame lapelyje nurodytas ? Susisiekiite susavo gydytoju arba vaistininku ..

lapelyje : Kas yra:

1. Kas yra NorLevo en kam šis vaistas naudojamas ?Kada
2. jums šio vaisto negalima naudoti arba turite būti ypač atsargūs su juo?
3. Kaip naudoti jūs šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti jūs šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija informacija

1. Kas yra NorLevo ir kam šis vaistas naudojamas ?NorLevo

yra geriamasis skubiosios kontracepcijos vaistas.

Kas yra skubioji kontracepcija?

Skubioji kontracepcija yra metodas metodas kuris yra skirtas užkirsti kelią nėštumui po neapsaugoto lytinio akto arba kai kontracepcija nepavyksta . nepavykti iš kontracepcija.

Kada turite jūs šį skubios kontracepcijos priemonę vartoti?

Jūs turite šį vaistą kuo greičiau galima išgerti, geriausia per 12 12 valanda ir ne vėliau nei 72 valandos (3 dienos) po neapsaugoto lytinio akto arba po kontracepcijos nesėkmės metodo nesėkmės . Kaip kontracepcijos metodas. Kaip greičiau šis vaistas po de neapsaugoto lytinis aktas yra vartojamas, kuo geriau jis veikia. Šis vaistas gali tik užkirsti kelią kad jūs nėščia tampa jei jūs per 72 valandas po neapsaugoto lytinio akto vartojate . Vaistasneveikia jei jūs jau nėščia esate. Jei jūs vaistas neveikia jei jūs jau po vartojimas iš šio vaisto neapsaugotas seksas turėjote, nebus šis vaistas ne apsaugos kad jūs pastosite ..

Tai yra įrodyta kad ši priemonė 52% iki 85% numatomų nėštumų apsaugo ..

vienos iš šių priežasčių įtariate kad esate nėščia nėščia gali būti:

jūs turėjote lytinius santykius be kontracepcijos kontracepcijajūs  
pamiršote išgerti savo kontraceptinę tabletę laiku ant laikas į ar vartoti;

het prezervatyvas van jūsų partneris yra sugedęs nuėjęs, paslinkęs arba nukritęs ;jūs bijote  
kad jūsų spiralė yra atsipalaidavusi atsiskyres;  
jūsų pessarium of jūsų cervixkapje yra perkelta arba jūs turite jį per anksti pašalinote;  
jūs bijote kad metodos metodos iš koitus nutraukimas arba ritmo metodos nepavyko  
nepavyko;  
atveju atveju prievartavimo prievartavimo.

Ši priemonė sustabdo sustabdo išskyrimą išskyrimą kiaušialąstės kiaušialąstės per jūsų kiaušidės. gali ne užkirsti kelią kad apvaisintas kiaušinėlis prisitvirtintų prie gimdos . Ši tabletė yra.  
skirta kaip neatidėliotina kontracepcija . skubioji kontracepcija, ne kaip įprastas kontracepcijos metodus kadangi ši mažiau veiksminga yra nei „įprasta“ kontraceptinė tabletė („ tabletė“).

Ši priemonė yra ne skirtas mergaitėms prieš jų pirmąją menstruaciją . 2..

2. šio vaisto nevertoti arba turite naudoti arba privalote u er extra atsargiai su būti?

Kada jums negalima šio vaisto nenaudoti ? Jūs esate  
alergiškas vienai iš šių medžiagų šiame vaistu šis vaistas. Šias medžiagas galite jūs rasti skyriuje skirsnyje 6.

Kada turite būti papildomai atsargūs su šiuo vaistu ? Šis  
vaistas naudojimas nuo šio vaisto nerekomenduojamas nerekomenduojama šiais atvejais ::  
jūs anksčiau turėjote ne gimdos negleivietė ektopinis)nėštumas turėjote turi patyrė (tai yra atvejis kai kūdikis vystosi už gimdos ribų vystosi);  
jei jūs turite uždegimą savo kiaušintakių kiaušintakiai turi turėjo (salpingitas);  
jei jūs turite asmeninę ar šeimos istoriją turi dėl žinomo rizikos veiksnio trombosei ( kraujo krešuliai );kraujo krešuliai);  
jei jūs turite sunkų virškinimo sutrikimą turite kuris absorbciją maisto maisto ir vaistų sumažina;  
jei jūs sunkų kepenų sutrikimą turite arba viena rimta liga plonosios žarnos ,tokia kaip Krono liga . Ankstesnis

negimdinis nėštumas perneštos ektopinis )nėštumasir nėštumas ir viena ankstesnis uždegimas kiaušintakių padidina riziką tas nėštumo nuo viena (naujas) neįprastas nėštumas. Todėl turite u kaip u anksčiau vieną ne gimdoje esančio (ektopinio) nėštumo ar vieną uždegimą kiaušintakių kiaušintakių turėjo turėjote susisiekti su savo gydytoju gydytoju prieš jūs šį vaistą vartojate.

Vartokite skubią kontracepciją tik atsitiktinai ir esant neatidėliotiniams atvejams ir ne kaip, arba vietoj įprastos nuo kontracepcijos kontracepcijos metodai nes:

tai ne visais atvejais nėštumą neapsaugo;  
rizika rizika dėl pertekliaus hormonų hormonų sutrikimas sutrikimas sutrikimas organizmo ciklas gali sukelti.

Dėl skubios kontracepcijos gali nėštumas ne būti nutrauktas pertrauktas.

tą pačią menstruacijų ciklą menstruacinis ciklas daugiaunei 72 valandos valanda prieš) jau kartą anksčiau neapsaugotą lytinius santykius turėjo turėjo, gali jau apvaisinimas įvyko įvyko .

Šisnaudojimas šio šio vaisto vaistas po antras kartas santyčiai gali taigi ne nėštumas daugiau išvengti ..

nėra rekomenduojama naudoti šį vaistą dažniau vaistas dažniau tada vieną kartą per vieną menstruacinį ciklą į vartoti nes tai gali sutrikdyti jūsų ciklą ..

Ši priemonė neveikia ne taip gerai kaip įprasti kontracepcijos metodai (tabletė, tabletė, prezervatyvas). Jūsų gydytojas gali jums papasakoti apie kontracepcijos metodus ilgalaikiam naudojimui ilgam laikui ilgas terminas kuris efektyviau užkirsti kelią kad jūs pastotumėte ..

vartojimo šio vaisto : Nėštumas:

būti atmestas būti neįtrauktas per vieną nėštumo testą atlikti norint atlikti:

jei jūsų kitas menstruacijų ciklas daugiau nei penkias dienas vėluoja yra; jeigu atvejis yra nuo nenormalus kraujavimas, taip pat numatytą menstruacijų datą.

Visos moterys turi kuo greičiau po neapsaugoto lytinio akto skubią kontracepciją vartoti . Yra. Yra yra nurodymai kad šis vaistas galimai mažiau veiksmingas galėtų būti yra prie didesnio kūno svorio arba didesnio aukštesnė šis šie duomenys buvo riboti ir neįtikinami. Todėl ši priemonė visoms moterims rekomenduojama , nepriklausomai nuo jų svorio ar KMI. Jūs

U yra patariama susisiekti su imtis su jūsų gydytoju, vaistininku ar vaistininku jei jūs nerimaujate dėl problemų apie galimų problemų į tvarstis su vartojimas nuo skubioji kontracepcija.

Jeif jūsų lytinio akto metu de lytinį aktą nėra prezervatyvas turite naudojote (arba jei jis yra suplyšęs arba nuslydęs) yra galima kad jūs turite lytiškai plintančią ligą (seksualiai perduodama ligą, LPL) arba ŽIV-virusą užsikrėtėte . Naudojimasnaudojimas skubiosios kontraceptinės tabletės nesuteikia siūlo nėra apsauga nuo lytiškai plintančių ligų arba nuo infekcijos su ŽIV-virusu ir gali reikalingas atsargumo (priemonių)imtis prie rizikos dėl perdavimo nepakeisti ( žr.“ Kitainformacija ”šio lapelio pabaigoje ).Vaikai

ir paaugliai iki 18 iki 18 metai

De veiksmingumas van NorLevo bij jaunimo (iki 18 metų) yra panašus su tuo bij suaugusiųjų. De dozavimas jaunimui yra vienodas lygus prie tą prieš suaugusiems. Vartokite šį vaistą ne prieš pirmąją pirmą menstruaciją.

Vartojate jūs dar kitus vaistus?

Vartojate u dar kiti vaistai ar turite jūs tai neseniai padarėte ?Pasakykite tai savo vaistininkui , gydytojui ar vaistininkui. Tai vaistininkas. Kad taikoma taip pat vaistams vaistams kuriems nereikia recepto reikalingas yra ir vaistažolių.

Kai kurie vaistai gali sukelti kad NorLevo mažiau mažiau gerai veikia. Jei dabar arba per paskutines 4 savaites vieną iš vaistų vartojote kurie žemiau minimi , tada galiNorLevo mažiau tinkamas mažiau tinkamas prieš jūs yra. Gydytojas gali jums kitą kitą skubios kontracepcijos priemonę išrašyti, kaip varinę spiralę (Cu-IUD), kuri per gydytoją gydytojas turi būti įdedamas įstatytas. Jei vienas spiralė jums ne jokios galimybės yra arba jei jūs negalite nedelsiant pas savo gydytoją galite eiti, tada išgerkite dvi kartų tiek iš NorLevo j:

- barbitūratai ir vaistai nuo epilepsijos (tokie kaip primidonas, fenitoinas, karbamazepinas)
- vaistai nuo tuberkuliozės (kaip rifampicinas, rifabutinas)-
- ŽIV vaistai (ritonaviras, efavirenzas)

- vaistas vaistas nuo grybelinės infekcijos (grizeofulvinas)
- žolelių preparatai su jonažole (*Hypericum perforatum*)

Pasitarkite jūsų gydytojas, vaistininkas arba vaistininkas jei jums patarimo reikia turite apie kiek tablečių jums reikia vartoti.

Pasitarkite kuo greičiau galimas po jūs tabletes turite išgėrę su gydytoju aptarti nėštumą nėštumo iš pašalinti ir dėl tolimesnių patarimų apie nėštumą nėštumą patikima forma nuo reguliarios kontracepcijos (žr. taip pat skyrių 3 „Kaip vartoti šį vaistą“ daugiau informacijos). Taip pat).

Taip pat gali NorLevo de veikimą kitų kitų vaistų paveikti:

- vaistas vaistas kuris ciklosporinas yra vadinamas (naudojamas siekiant imuninę sistemą stiprinti slopinti).

NorLevo negalima naudoti būti naudojamas kartu su vaistais kurie ulipristalacetatą turi .. ir žindymas Jei esate nėščia nėščia esate:

Jei jau nėščia esate, gali šis vaistas šią nėštumą ne nutraukti.

Jei šį vaistą vartojate ir vis dėlto nėščia tampate, yra yra nėra įrodymų kad tai kenksminga yra kūdikiui ( vaisiuvaisiusšio vaisto vartoti jei esate nėščia u nėščia lenktas.

Jei jūs po vartojimo šio vaisto nėščia tampate ,turite susisiekti su gydytoju te pasikonsultuoti su savo gydytoju. Jūsų gydytojas nori ir galbūt patikrinti ar jūs ne ne gimdoje nėštumas turite (kūdikis vystosi kažkur už jūsų gimdos ). Tai ypač svarbu jei jūs sunkus sunkus skausmas į jūsų pilve atsiranda po vartojimo nuo šio vaisto arba jei jau kartą anksčiau turėjote ne gimdos (ektopinis) nėštumas arba viena operacija jūsų kiaušintakiuose arba viena uždegiminė liga dėl dubens turėjo . Jei jūs maitinate krūtimi.

Jei jūs žindymas suteikia:

Žindymas yra galimas. Bet kadangi levonorgestrelis yra išskiriamas į motinos pieną, yra protinga žindymą tiesiogiai prieš tabletes vartojimą vartojimas iš tabletes te duoti ir per 8 valandas po vartojimo šio vaisto vaistas žindymą nutraukti ir pieną ištraukti ir pieną išmesti te mesti. Jei per šį laiką pieną nusitraukiate, turite jį išmesti ..

savo gydytojo ar vaistininko patarimo prieš jūs prieš u vienas vaistas eina naudoti.

Vairavimo gebėjimai ir naudojimas naudojimas mašinų

Po vartojimo šio šio vaisto patyrė kai kurios moterys patyrė nuovargis en galvos svaigimas (žr. skyrių 4 „Galimos nepageidaujamos reakcijos“): nevairuokite ir nenaudokite jokių įrenginių jei jaučiate šiuos simptomus dėl šio simptomai.

Yra nėra tyrimas atliktas su ryšium su poveikiu šio vaisto vairavimo gebėjimui ir gebėjimui valdyti mašinas ar naudoti.

NorLevo turi laktozės monohidrato

Šis vaistas turi laktozės monohidrato. Jei jūsų gydytojas jums pasakė kad jūs tam tikrų rūšių cukrų ne gerai toleruojate toleruoja, susisieki su juo/ją prieš jūs šį vaistą pradėsite vartoti ..

### 3. vartoti jūs šį vaistą ?Vartokite

šį vaistą visada visada tiksliai kaip pakuotės lapelyje nurodyta arba kaip jūsų gydytojas, vaistininkas arba vaistinė jums tai pasakė .. dėl teisingo naudojimo naudojimas? Tada susisieki su jūsų gydytoju.

NorLevo gali bet kuriuo metu jūsų menstruacinio ciklo būti vartojamas, jeigu manoma kad jūs dar nėščia nesate arba mano kad jūs nėščia galėtum būti esate. Tabletes nekramtyti , betnuryti visą su vandeniu. Nurykite tabletes kuo

greičiau galima . Tai. Tai geriausia per 12 valandų, bet bet kokių atveju ne vėliau nei 72 valandų (3 dienos) po to, kai jūs neapsaugotą seksą turėjote . Neatidėliokite. Nustatykite vartoti iš tabletes ne iš. Kaip greičiau jūs tabletes po neapsaugoto neapsaugoto sekso vartojate, tuo geriau ji veikia. Tabletes gali tik užkirsti kelią kad jūs nėščia tampate, jei jūs jį vartojate per 72 valandas po neapsaugoto sekso.

Jei jūs vieną iš vaistų vartojate kurie užtikrina gali rūpintis kad NorLevo mažiau veiksmingai veikty (žr. aukščiau skyrių "Kiti vaistai ir NorLevo") arba jei jūs esate praėjusį 4 savaites vieną iš šių vaistų vartojote , tadagali NorLevo mažiau tinkamas jums būti . Jūsų. Jūsų menai gali jūs tada vieną kitą skubios kontracepcijos priemonę išrašyti, kaip vieną varinę spiralę (CuIUD). Jei viena varinė spiralė jums nėra galimybė yra arba yra iš jei jūs negalite nedelsiant pas savo gydytoją galite eiti, tada išgerkite dvigubai daugiau nei NorLevo ( t.y.tuo pačiu metu visas tabletes tabletes vartoti).

Jei jau vieną reguliarią kontracepcijos metodą naudojate kaip de kontraceptines tabletes, tada galite jas įprastu laiku toliau vartoti .Jei atveju jūs nėra menstruacinis kraujavimas į kitoje be tablečių pertraukoje turite, tada turite u atlikti nėštumo testą vykdyti kad nėštumą atmesti ar galėtumėte.

Jei per tris valandas po tabletes vartojimo turite vėmti, turite nedelsiant dar vieną tabletes išgerti . Kreipkitės įsavo vaistininką vaistininkas, menas vaistininkas, jei jūs dar vieną tabletes reikia turite.

Po vartojimo šio vaisto turite jūs naudoti vieną kontraceptiką naudoti (prezervatyvą, spermicidinę priemonę arba diafragmą )kol prasidės kitas menstruacijų ciklas . Jei ponaudojimo ne naudojimo naudojimas iš šis vaistas dar kartą neapsaugotas lytinis aktas turėjo (taip pat jei tai į toje pačioje menstruacijų cikle yra), neapsaugo šis vaistas vėl nuo nėštumo vienas nėštumas. Jei jūs naudojate daroklis nuo viena įprasta kontracepcijos metodą kaip de geriamąją kontraceptinę tabletes, tada turite jums ją kaip įprasta naudoti likti tęsti.

Jūsų gydytojas gali jus patarti apie kontracepcijos metodus ilgalaikiam laikotarpiui kurie efektyviau užkirs kelią kad jūs nepastotumėte u nėščia tampate.

Jei jūs įprastą hormoninę kontracepciją toliau naudojote kaip de kontraceptinę tabletes ir jūs jūsų tabletes laisvą laikotarpį nėra kraujavimo turite, apsilankykite tada savo gydytoją, kad patikrintumėte ar nesate nėščia . Jūsų

kitos mėnesinės po to, kai vartojote šį vaistą vaistas turi išgertas

Po vartojimo šio vaisto paprastai jūsų menstruacijos būna normalios ir prasidės numatyta dieną; kartais jos galiprasidėti vėliau. Šis tačiau viena pora dienų vėliau arba anksčiau yra.

Jei jūsų menstruacija daugiau nei 5 dienomis per vėluoja yra, arba neįprastai lengva iš sunkus yra, arba jei jūs dėl viena kita priežastis manote kad jūs nėščia esate, turite jūs su viena nėštumo testu (leisti) patikrinti ar jūs nėščia esate. Jei jūs vis dėlto po vartojimo šio šio vaisto nėščia tampate, svarbu, kad svarbu kad jūs savo gydytoją aplankytumėte.

Ar jūs per daug šio vaisto vartojote? Nėra pranešimų apie ūminį apsinuodijimą ar rimtą žalingą poveikį po sunkus žalingas pasekmės ne tas vartojimas nuo per daug nuo šio vaisto į vienu kartu. Jūs galite tačiau jausti pykinimą, iš tikrųjų vemti arba iš vaginalinės kraujavimas gauti. U turite dėl patarimo susisiekti su imtis su jūsų gydytoju, vaistininku arba vaistininku.

#### 4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip kiekvienas vaistas gali taip pat šis vaistas sukelti šalutinį poveikį, norsne visi patiria tai susiduria. Šis.

poveikis gali būti yra pastebėta:

Labai dažnai (pasireiškia daugiau nei 1 iš 10 vartotojų): galvos svaigimas  
galvos svaigimas galvos skausmas; pykinimas  
pykinimas pilvo skausmas pilvo skausmas;  
jautrios krūtys, menstruacijų atidėjimas menstruacijos, sunkios menstruacijos,  
kraujavimas, gimdos skausmas;  
nuovargis.

Dažnai (pasitaiko dažnai prie mažiau nei 1 iš 10 vartotojų):  
viduriavimas, vėmimas;  
menstruacijų skausmas.

Nežinoma (galisu turimais duomenimis ne būti nustatyta būti nustatytas):  
Nuo šis vaistas rinkoje yra buvo pranešta apie tromboembolinius įvykius (kraujo krešuliai) pranešta.  
Alerginės reakcijos, tokios kaip patinimas gerklės ir veide veidas ir odos bėrimas gali pasireikšti po vartojimo šio šio vaisto.

Pranešimas pranešimas apie nepageidaujamas reakcijas  
Atsiranda jei jaučiate šalutinį poveikį, susisiekite su savo gydytoju. Tai taikoma taip pat ir galimam šalutiniam poveikiui, kuris nėra šiame lapelyje paminėtas. Jūs galite šalutinį poveikį taip pat taip tiesiogiai pranešti per Nyderlandų Nepageidaujamų reakcijų Centras Lareb, svetainė: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Pranešdami nepageidaujamas reakcijas galite pranešti, galite jūs mums padėti daugiau informacijos gauti gauti apie saugumą šio šio vaisto.

#### 5. Kaip laikyti jūs šį vaistą?

Laikyti nepasiekiamoje ir neprieinamoje vaikams vaikai laikyti.

Lizdinę plokštelę išorinėje pakuotėje laikyti nuo apsaugos nuo šviesos.

Vartokite šio vaisto ne po ne galiojimo datos kuri nurodyta ant nurodyta ant dėžutės ir ant lizdinės plokštelės pakuotės po „EXP“. galiojimo data nurodo į paskutinę dieną to mėnesio ..

Šį vaistą vaistas ne jei jūs matomi požymiai gedimo pastebite ; produktasturi tada būti grąžintas į jūsų vaistininką . Neskalauskite.

Skalauti vaistai ne per kriauklę ar tualetą ir išmeskite juos ne į šiukšliadėžę. Paklauskite savo vaistininko ką daryti su vaistais turite daryti kurių ne daugiau naudojamas. Jos yra tada vienas atsakingu būdu sunaikinamos ir nepatenka į aplinką ..

## 6. pakuotės pakuotės ir ir kita informacija

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra levonorgestrelis. Kitos medžiagos šiame vaistiniame preparate šis vaistas yra: laktozės monohidratas, kukurūzų krakmolai, povidonas, koloidinis bevandenis silicio dioksidas, magnio stearatas.

Levonorgestrelis priklauso prie grupės grupė iš vaistų kurie yra nurodomi kaip skubios kontracepcijos priemonės.

Kaip atrodo NorLevo 1,5 mg ir kiek yra pakuotėje ? Vienas NorLevo?

Vienas NorLevo 1,5 mg tabletė yra balta apvalibikonvėksė tabletė su užrašu kodu NL 1.5 vienoje pusėje . Kiekvienoje.

yra viena tabletė su 1,5 mg levonorgestrelio. Leidimo turėtojas

yra leidimo turėtojas prieš į prekybą pateikimas

Laboratoire HRA Pharma  
200 avenue de Paris  
92320 CHATILLON  
Prancūzija

Gamintojai CENEXI  
17, Rue de Pontoise  
95520 OSNY - PRANCŪZIJA

Delpharm Lille S.A.S.  
Parc d'Activités Roubaix-Est  
22 rue de Toufflers  
CS 50070  
59452 Lys Lez Lannoy – Prancūzija

NorLevo 1,5 mg tabletės yra įregistruotas įrašytas po RVG 32303.

Jei jūs po skaitymo skaitymas iš šių pakuotės lapelį dar kažkur ne tikras dėl jei jūs klausimų turite, susisieki su savo vaistininku arba gydytoju arba apsilankykite Rutgers WPF svetainėje ([www.rutgerswfp.nl](http://www.rutgerswfp.nl)).

Šis vaistas yra registruotas EEE valstybėse narėse pagal šiuos pavadinimus : Nyderlandai  
NorLevo1,5 mg, tabletės Austrija Vikela  
1,5 mg tabletė Šis pakuotės

lapelis pakuotės lapelis yra dėl paskutinį kartą patvirtinta gegužės 2025 m. KITA  
INFORMACIJA Tam tikra

## informacija

### a) apie menstruacinį ciklą ir kontracepciją Menstruacinis ciklas

#### - Menstruacinis ciklas

yra menstruacinis ciklas laikas tarp dviejų menstruacinių ciklų. Paprastai trunka ciklas 28  
28 , tačiau trukmė gali nuo moters iki moters skirtis . Moteris menstruuoja tik kai kada ji  
ne nėščia yra.

#### - Apvaisinimas

Viduryje kiekvieno ciklo išsiskiria yra kiaušialąstė (ovum) laisvai į vieną iš 2 kiaušidžių  
kiaušidės taišis moment karšta 'ovuliacija' arba 'ovuliacija'). Paprastai vyksta de  
ovuliacija viduryje de ciklo vyksta, bet tai gali taip pat bet kuriuo kitas momentas per  
ciklo ciklą pasireikšti.

Po lytinio akto gali vyriškos spermos ląstelės (spermatozoidai) arti išlaisvinto kiaušinėlio  
patekti ateiti en de kiaušialąstė apvaisinti (t.y. viena susiliejimas su viena spermatozoidu  
su kiaušialąste dėl ko vienas embrionas yra sukurtas).

Po kelių dienų apvaisintas kiaušinėlis įsivirtina gimdoje ir prasideda nėštumas .

Kontraceptikai ( kontracepcija nėštumas.

#### - Kontraceptikai (kontracepcija)

Su kontracepcijos metodais gali būti išvengta:

- ovuliacija: su pagalba iš kontraceptinės tabletės
- apvaisinimas (susiliejimas iš vienos spermos ląstelės su kiaušialąste): su pagalba iš  
prezervatyvo
- implantacija iš vieno apvaisinto kiaušinėlio į gimdą: su pagalba iš spiralės.

#### - Skubios kontraceptinės tabletės

Dėl naudojimo iš skubios kontraceptinės tabletės yra po lytinių santykių de ovuliacija  
blokuojama arba vėluojama arba yra de implantacija apvaisinto kiaušinėlio užkertama .  
Jie veikia ne kaip kaip de implantacija al turi įvyko.

Kai viena moteris lytiniai santykiai turi be naudojimo iš viena kontracepcijos metodas gali de  
tikimybė dėl nėštumas ne būti atmestas.

Jeigu jūs šį vaistą vartojote , bet nėra įprasto kontracepcijos metodo naudojate ,yra griežtai  
rekomenduojama kad apie vienas gydytojas arba GGD aplankyti apsilankyti. Jūs gausite tada  
patarimas apie kontracepcijos metodą kuris jums labiausiai tinka yra. Patarimas

### b) dėl rizikos dėl ant perdavimas iš viena lytiškai plintančios ligos

Jei jūs nesaugų lytinių santykių turite, rizikuojate gauti galimybę viena lytiškai plintančios ligos gauti gauti, ypač jei jūs seksualinę istoriją savo savo partnerio nežinote arba jei jūs turite daugiau partnerių . Dėl klausimų galite gali u pagrįstai prie jūsų gydytojo, vaistininko arba GGD.

## ŽODYNAS

Negimdinis (ektopinis) nėštumas: nėštumas kuris silysto už gimdos lauke de gimda, dažniausiai į viename iš kiaušintakių. Prie simptomų priklauso nuolatinis pilvo skausmas, praleistos menstruacijos, makšties kraujavimas, nėštumo požymiai nėštumas pykinimaspykinimasjautrios krūtys ). Jeiturite tokių simptomų ,turite nedelsiant kreiptis nedelsiant savo gydytoją ar pasitarti.

Salpingitas: infekcija iš kiaušintakių. Tarp simptomų yra pilvo skausmas, karščiavimas ir stiprus makšties išskyros.