

Prospect: informații pentru utilizator utilizator

NorLevo 1,5 mg, comprimate
levonorgestrel

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a lua acest medicament utilizați pentru că este informații importante informații în pentru dumneavoastră.

Utilizați acest medicament întotdeauna exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum medicul dumneavoastră medic, farmacist, droguerie sau GGD v-a că a spus v-a spus.

Păstrați acest prospect. Poate aveți nevoie de el mai târziu din nou nevoie.

Aveți dumneavoastră încă întrebări? Contactați medicul dumneavoastră, farmacistul sau plafarul.

Aveți probleme cu una dintre efectele secundare menționate în secțiunea 4 sunt? Sau primește dumneavoastră un efect secundar care nu în acest prospect este menționat? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

În acest prospect::

1. Ce este NorLevo en pentru ce este acest medicament utilizat?
2. Când nu trebuie să acest medicament nu utilizați sau trebuie să fiți precaut cu el?
3. Cum utilizați dumneavoastră acest medicament?
4. Posibile efecte secundare
5. Cum păstrați dumneavoastră acest medicament?
6. Conținutul ambalajului și alte informații informație

1. Ce este NorLevo și pentru ce se utilizează acest medicament ?NorLevo

este un contraceptiv de urgență oral contraceptiv de urgență.

contracepția de urgență contracepție de urgență?

Contracepție de urgență este o metodă care este destinată să prevină sarcina după contact sexual neprotejat sau în caz de eșec al contracepției sau în cazul în care contracepția.

Când trebuie să acest contraceptiv de urgență luați?

Trebuie să luați acest medicament cât mai repede posibil, de preferință în 12 oră și nu mai târziu de 72 ore (3 zile) după contactul sexual neprotejat sau după eșecul unei metode contraceptive . Cum un metodă contraceptivă. Cum mai repede acest medicament după de neprotejată relație sexuală este administrat, cu cât mai bine funcționează . Acestmedicament poate doar preveni că dumneavoastră tu însărcinată devine dacă dumneavoastră îl în 72 ore după contactul neprotejat sexual luați. Medicamentul nu funcționează dacă sunteți deja însărcinată . Dacă sunteți dureri. Dacă dumneavoastră na administrare de acest medicament sex neprotejat sex ați avut, nu va medicamentul medicamentul nu preveni că dumneavoastră să rămâneți însărcinată deveniți.

Este demonstrat că acest medicament 52% până la 85% din sarcinile așteptate previne.

Dacă bănuieți unul dintre următoarele motive că sunteți însărcinată însărcinată poate fi:

ați avut raport sexual fără contracepție anticoncepțieați
uitat să luați pilula contraceptivă la timp să o luați;
het prezervativul van partenerul dumneavoastră este rupt s-a rupt, s-a deplasat sau a
ieșit ;vă este teamă
că dispozitivul intrauterin s-a deplasat este deplasat;
dumneavoastră pessarium of dumneavoastră cervixkapje este deplasat sau ați
îndepărtat îl prea devreme îndepărtat;
vă este teamă că metoda metoda de coitus interruptus sau metoda ritmului a eșuat ;în
cazul
violului . Acest medicament.

eliberarea unui ovul de către dumneavoastră un ovulă ușă dumneavoastră ovare. Het poate nu
preveni că un ovul fertilizat se atașează de uter ..

comprimat este doar destinat ca ca contracepție de urgență, nu ca metodă contraceptivă
obișnuită deoarece acestea sunt mai puțin eficiente decât „pilula pilulă contraceptivă
contraceptivă normală(„

pilula ”). este nu destinat pentru fete înainte de prima lor menstruație.

2. Când nu trebuie să acest medicament nu utilizați sau trebuie u er extra prudent cu fiți?

Când nu aveți voie să acest medicament nu utilizați?

Sunteți alergic la un dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe puteți
dumneavoastră găsi în rubrica 6.

Când trebuie să fiți precaut fiți cu acest medicament?

Acest utilizarea a acestui medicament este descurajată în următoarele cazuri:

dacă ați avut o sarcină extrauterină (ectopică) în trecut a avut (acest este cazul când
dacă bebelușul se în afara uterului se dezvoltă);dacă
aveți o inflamație a trompelor dumneavoastră uterine are a avut (salpingită);
dacă dumneavoastră un personală sau istoric familial aveți de un cunoscut factor de
risc pentru tromboză (cheaguri de sânge);
dacă dumneavoastră aveți o boală digestivă gravă care afectează absorbția de alimente
și medicamente reduce;
dacă dumneavoastră aveți probleme hepatice grave sau o gravă boală a intestinului
subțire, cum ar fi boala Crohn. O

sarcină ectopică anterioară extrauterină (ectopică) și în un anterioară infecție a trompelor
uterine cresc riscul de o (nouă)sarcină ectopică ectopic De aceea. să dacă aveți ca u anterior
un extrauterină (ectopică) sarcină sau o inflamație a trompelor uterine ați avut contactați luați
cu medicul dumneavoastră medic înainte de dumneavoastră acest medicament utilizați.

Utilizați contracepția de urgență doar ocazional și în situații de urgență și nu ca, sau în loc de
obișnuită metode contraceptive pentru că:

nu în toate cazurile previne sarcina ;riscul

de un exces de hormoni o perturbare a de de la ciclul poate cauza.

Prin contracepție de urgență poate o sarcină nu fi întreruptă.

Dacă sunteți în același ciclu menstrual (mai mult de 72 ore în urmă) deja odată anterior neprotejată contact sexual a avut loc, poate deja o fertilizare a avut loc. Utilizarea acestui medicament după de a doua oară contact sexual poate deci nu sarcină mai preveni.

Nu se recomandă nu recomandat să acest medicament mai des dan unul dată în un ciclu menstrual în a lua deoarece acest lucru vă ciclul poate perturba.

Acest medicament nu funcționează la fel de bine ca metodele contraceptive (pilula, pilula, prezervativul). Medicul dumneavoastră vă poate spune despre metodele contraceptive pentru termen lung lungă termen care mai eficient previn că dumneavoastră să rămâneți însărcinată.

După utilizarea acestui medicament medicament:

trebuie să fie exclusă prin ușă un test de sarcină a efectua ::

următoarea dumneavoastră perioadă menstruală mai mult de cinci zile întârzie ; în caz de caz de la anormal pierdere de sânge, de asemenea la data așteptată a menstruației.

Toate femeile trebuie cât mai repede posibil după contact sexual neprotejat să ia contracepția de urgență .Există sunt indicații că acest medicament posibil mai puțin eficient ar putea fi la o greutate corporală sau un indice de masă corporală (IMC) mai mare, dar acestea datele erau limitate și neconvingătoare. De aceea este acest medicament pentru toate femeile recomandat, indiferent de greutatea sau IMC-ul lor.

Dumneavoastră este sfătuit contactați să luați cu medicul dumneavoastră farmacistul, farmacistul sau drogheria dacă vă faceți griji cu privire la posibile probleme în bandaj cu administrarea de contracepție de urgență.

Dacă ați în timpul actului sexual nu ați folosit prezervativ (sau dacă s-a rupt sau alunecat alunecat) este posibil că dumneavoastră o boală cu transmitere sexuală (sexualmente transmisibilă boală, BTS) sau virusulHIV -ului ați contractat . Utilizareautilizarea a pilulelor de urgență oferă oferă niciun protecție împotriva bolilor transmisibile sexual sau împotriva infecției cu HIV-virusul și poate măsurile necesare (de precauție)măsuri la risc de transmitere nu înlocuiți (vezi „Informații suplimentare” la sfârșitul acestui prospect).

Copii și adolescenți până la 18 an

De eficacitatea a NorLevo la tineri (până la 18 ani) este comparabilă cu cea la adulți. De dozajul pentru tineri este egal la care pentru adulți. Luați acest medicament nu înainte de prima menstruație menstruație.

dumneavoastră alte medicamente ? Utilizați?

Utilizat dumneavoastră alte medicamente sau ați făcut asta recent ? Informați acest lucrufarmacistului dumneavoastră , medicului sau drogistului . Aceasta, medic sau farmacist. Asta se aplică de asemenea pentru medicamente pentru care nu este necesară rețetă este și fitoterapeutice.

Unele medicamente pot face ca NorLevo să fie mai puțin eficient bine funcționează. Dacă acum sau în ultimele 4 săptămâni unul dintre medicamentele ați utilizat care mai jos sunt menționate, atunci poate NorLevo mai puțin potrivit pentru dumneavoastră sunt. Un medic poate dumneavoastră un alt contraceptiv de urgență prescrie, cum ar fi un sterilet de cupru (Cu-IUD), care de un medic trebuie sunt plasat. Dacă un dispozitiv intrauterin pentru

dumneavoastră nu este opțiune sau dacă dacă dumneavoastră nu imediat la medicul dumneavoastră puteți merge, luați atunci două ori atât de mult de NorLevo în:

- barbiturice și medicamente împotriva epilepsiei (cum ar fi primidon, fenitoină, carbamazepină)
- medicamente împotriva tuberculozei (precum rifampicină, rifabutină)-
- HIV medicamente (ritonavir, efavirenz)
- un medicament împotriva infecțiilor fungice (griseofulvină)
- remedii pe bază de plante cu sunătoare (Hypericum perforatum)

Consultați dumneavoastră medicul, farmacistul sau plafaristul dacă aveți nevoie de sfat nevoie aveți despre câte comprimate trebuie să luați luați.

Consultați-vă cât de repede posibil după ce ați luat comprimatele ați luat cu un medic pentru a exclude sarcina din a exclude și pentru sfaturi suplimentare despre un de încredere formă de regulată contracepție (vezi de asemenea rubrica 3 „Cum luați dumneavoastră acest medicament ” pentru mai multe informații).

De asemenea poate NorLevo de efectul al altor medicamente afecta:

- un medicament care ciclosporină este numit (utilizat pentru a sistemul imunitar să suprima).

NorLevo nu trebuie să fie utilizat în combinație cu medicamente care conțin ulipristal acetat .. și alăptare Dacă sunteți

însărcinată însărcinată sunteți:

Dacă sunteți deja însărcinată sunteți, poate acest medicament această sarcină nu întrerupe. Dacă acest medicament utilizați și totuși însărcinată deveniți, sunt nu niciun indicații că este dăunător pentru pentru copilul (fătul). Totuși, nu trebuie să acest medicament nu utilizați dacă sunteți însărcinată bent.

Dacă după administrare a acestui medicament rămâneți însărcinată, trebuie să luați legătura cu medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră va dori să dan poate verifica dacă aveți nu extrauterină sarcină aveți (copilul se dezvoltă undeva în afara uterului dumneavoastră). Acest lucru este în special important dacă aveți severe gravă durere în dumneavoastră abdomen aveți după administrarea acestui medicament sau dacă ați avut vreodată anterior o extrauterină ectopic ectopică)) sarcină sau o operație la trompele uterine sau o boală inflamatorie la pelvisul ați avut . Dacă alăptați.

Dacă dumneavoastră alăptare dă:

Alăptare este posibilă. Dar deoarece levonorgestrel este excretat în laptele matern, este înțelept să alăptarea imediat înainte de de administrarea comprimatului să a da și pe durata 8 ore după administrare a acestui medicament să alăptarea să se stoarcă și laptele să se arunce. Dacă pe parcursul acestei perioade lapte extrageți, trebuie să acesta aruncați.

Întrebați medicul dumneavoastră sau farmacistul pentru sfat înainte de să un medicament va utiliza.

Aptitudinea de a conduce și utilizarea mașinilor de la mașini

După administrarea acestui medicament au avut unele femei probleme cu oboseala oboseală en amețea (vezi rubrica 4 "Reacții adverse"): nu conduceți și nu folosiți mașini dacă aveți simptome de acest tip această simptome.

Nu există niciun studiu efectuat cu privire asupra efectului acestui medicament asupra capacității de a conduce și asupra abilității de a opera mașini ..

NorLevo conține lactoză monohidrat

Acest medicament conține lactoză monohidrat. Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că nu tolerați anumite tipuri de zaharuri bine tolerați, contactați-l pe el/eaei înainte de dumneavoastră acest medicament veți utiliza.

3. Cum utilizați dumneavoastră acest medicament?

Utilizați acest medicament întotdeauna precis ca în prospect scrie sau ca medicul dumneavoastră, farmacistul sau drogheria v-a spus a povestit. Aveți îndoieli cu privire la corect utilizare? Contactați dumneavoastră medicul.

NorLevo poate în orice moment al ciclului menstrual dumneavoastră fi administrat, presupunând că nu sunteți deja însărcinată sau îndoit crede că dumneavoastră gravidă ar putea fi .Comprimatul nu mestecați, ci înghițiți-l întreg cu apă. Înghițiți comprimatul cât

mai repede posibil . posibil. Este de preferință în 12 ore, dar în orice caz nu mai târziu de 72 ore (3 zile) după ce ați avut sex neprotejat . Amânați gehad. Stabiliți-l a lua a comprimatului nu din. Cum mai repede luați comprimatul după contactul neprotejat sexual luați, cu atât mai bine funcționează . Comprimatul poate doar preveni prevenire că dumneavoastră sunteți gravidă deveniți, dacă îl administrați în termen de 72 ore după sex neprotejat ..

unul dintre medicamentele utilizați utilizat care pentru pot asigura că NorLevo mai puțin bine funcționează (vezi rubrica de mai sus „Alte medicamente și NorLevo”) sau dacă sunteți în trecut 4 săptămâni unul dintre aceste medicamente ați utilizat, atunci poate NorLevo mai puțin potrivit pentru dumneavoastră fi. Medicul dumneavoastră poate dumneavoastră atunci un alt contraceptiv de urgență prescrie, cum ar fi un sterilet de cupru (CuIUD). Dacă un sterilet de cupru pentru dumneavoastră nu este o opțiune sau dacă dumneavoastră nu imediat la medicul dumneavoastră puteți merge, luați atunci de două ori atât din NorLevo (deci în același moment toate comprimatele a lua).

Dacă deja un regulat metodă contraceptivă utilizați precum de pilula contraceptivă, atunci puteți să o luați la obișnuit moment continuați a lua. În cazul în care niciun menstruală sângerare în următoarea perioadă fără pilule are , atuncitrebuie să efectuați un test de sarcină pentru a exclude sarcina din a exclude.

Dacă în trei ore după administrarea comprimatului trebuie să vomitați, trebuie să luați încă un comprimat . Luați legătura cufarmacistul dumneavoastră farmacist, medic de farmacist, dacă dumneavoastră încă un comprimat nevoie aveți.

După utilizarea acestui medicament trebuie să un contraceptiv folosiți utilizați (prezervativ, spermicide sau un diaphragm) până când următoarea perioadă menstruală începe . Dacă după utilizarea de un de la acest medicament din nou neprotejată raport sexual are (de asemenea dacă acest în aceeași ciclu menstrual este), protejează acest medicament nu din nou împotriva un sarcină. Dacă utilizați face de o metodă contraceptivă precum de pilula contraceptivă, atunci trebuie să o ca de obicei să continua a continua.

Medicul dumneavoastră poate să vă sfătuiască despre metode contraceptive pentru o perioadă lungă care vor fi mai eficiente în a preveni că dumneavoastră tu însărcinată devineți.

Dacă dumneavoastră obișnuită hormonală contracepție continuați să folosiți precum de pilula contraceptivă și dumneavoastră în dumneavoastră perioada fără pilule nu sângerare aveți loc, vizitați atunci medicul dumneavoastră pentru a verifica dacă nu sunteți însărcinată.

Următoarea menstruație după

ce ați luat acest medicament va fi diferită de obicei dacă sunteți însărcinată

După utilizarea acestui medicament , menstruația dumneavoastră este de obicei normală și va începe în ziua așteptată ; uneori va; uneori unguent acest însă un câteva zile mai târziu sau mai devreme sunt.

Dacă dumneavoastră menstruația mai de 5 zile prea târziu este, sau neobișnuit ușoară de sever este, sau dacă vă un alt motiv credeți că sunteți însărcinată sunteți, trebuie să faceți un test de sarcină (să vă) verificați dacă sunteți însărcinată sunteți. Dacă totuși după administrare acestui acest medicament însărcinată deveniți, este important că dumneavoastră medicul dumneavoastră vizitați.

Aveți dumneavoastră te mult de acest medicament utilizat?

Nu există rapoarte de o intoxicație acută sau efecte dăunătoare grave după na al administrarea de prea mult din acest medicament într- o singurădată . Puteți totuși să vă simțiți greață ,să vomitați efectiv sau de vaginale sângerări a obține. U trebuie pentru sfat contactați să luați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau drogheria.

4. Posibile efecte secundare

Așa cum fiecare medicament poate și acest medicament efecte secundare avea, deși nu toată lumea se confruntă cu acestea . a face.

efecte secundare posibile efecte secundare sunt observate:

Foarte frecvent (apar la mai mult de 1 din 10 utilizatori):amețeli

amețelădureri de cap ;greață

greațădureri abdominale durere abdominală;

sensibile sâni, întârziere a menstruației, menstruație abundentă

menstruațiesângerări ,durere uterine durere uterinăoboseală

oboseală.

aparla pentru la mai puțin de 1 din 10 utilizatori):

diaree, vărsături;

dureri menstruale.

Necunoscut (nu poate cu datele disponibile fi determinată nu poate):

De când acest medicament pe piață piață este sunt au fost tromboembolice incidente (cheaguri de sânge) raportate.

Reacții alergice, cum ar fi umflare a gâtului și în față și erupție cutanată pot apărea după administrarea acestui medicament.

reacțiilor adverse la efectele secundare Aveți

Primește suferiți de efecte secundare, contactați medicul dumneavoastră. Acest lucru se aplică de asemenea pentru posibile efecte secundare care nu sunt menționate în acest prospect . Puteți raportaefecte secundare de asemenea efecte secundare de asemenea direct raportați prin Olandez Efecte Adverse Centrul Lareb, site web: www.lareb.nl. Prin raportarea efectelor adverse a raporta, puteți să ne ajutați mai multe informații a obține despre siguranța a acest medicament.

5. Cum păstrați dumneavoastră acest medicament?

Departa de vederea și accesul copiilor copii păstrați.

Blisterul în ambalajul exterior păstrați pentru protecție împotriva luminii.

Utilizați acest medicament nu mai după data de expirare care este indicată menționat pe cutie și ambalajul blister după „EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a acelei luni ..

acest medicament medicament nu dacă dumneavoastră vizibile semne de alterare observați; produsul trebuie atunci să fie returnat la farmacistul dumneavoastră.

Nu aruncați medicamente nu prin chiuvetă sau toaleta și aruncați le nu în coșul de gunoi. Întrebați farmacistul dumneavoastră ce să faceți cu medicamentele care trebuie să faceți nu mai mult utilizat. Ele sunt apoi într-un mod responsabil distruse și nu ajung în mediu deloc în mediu 6..

6. ambalajului și ambalajului și alte informații

Ce substanțe sunt în acest medicament?

Substanța activă din acest medicament este levonorgestrel. Cele lalte substanțe din în acest medicament sunt: lactoză monohidrat, amidon de porumb, povidonă, coloidal silica deshidratată silice, stearat de magneziu.

Levonorgestrelul face parte din un grup de medicamente care sunt indicate ca contraceptive de urgență.

Cum arată NorLevo 1,5 mg și cât conține un ambalaj ?Un

NorLevo NorLevo 1,5 mg tabletă este un albă, rotundă biconvexă tabletă cu inscripție de cod NL 1.5 pe o parte.

Fiecare ambalaj conține o tabletă cu 1,5 mg levonorgestrel.

Deținător al autorizației pentru în comercializare punere pe piață

Laboratoire HRA Pharma
200 avenue de Paris
92320 CHATILLON
Franța

Producători CENEXI
17, Rue de Pontoise
95520 OSNY - FRANȚA

Delpharm Lille S.A.S.
Parc de Activități Roubaix-Est
22 rue de Toufflers
CS 50070
59452 Lys Lez Lannoy – Franța

NorLevo 1,5 mg comprimate este înregistrat înregistrat sub RVG 32303.

Dacă după citirea lecturii a acest prospect încă undeva nu sigur de dacă dumneavoastră întrebări aveți, contactați farmacistul sau medicul dumneavoastră sau consultați site-ul web al Rutgers WPF (www.rutgerswpf.nl www.rutgerswpf.nl..

Acest medicament este înregistrat în statele membre ale SEE sub următoarele denumiri :
Olanda NorLevo 1,5 mg, comprimate Austria
Vikela 1,5 mg comprimat Acest

prospect prospect medicamentos este pentru ultima dată aprobat în mai 2025.

ALTE INFORMAȚII

a) Unele informații despre ciclul menstrual și contracepție

- Ciclul menstrual

Ciclul menstrual este timp între două perioade menstruale. De obicei durează ciclul 28 28 , dardurata poate să difere de la femeie la femeie difera . O femeie menstruează doar când când ea nu însărcinată este.

- Fertilizare

La mijlocul fiecărui ciclu are loc o ovul (ovul) eliberat în unul dintre cei 2 ovare ovare acest moment fierbinte 'ovulație' sau 'ovulație'). De obicei are loc la ovulație la mijlocul ciclului are loc , dar acest lucru poate de asemenea în orice moment alt moment în timpul al ciclului apărea.

După actul sexual pot celulele spermatică (spermatozoizi) aproape de ovulul eliberat ajunge a veni en de ovul fertiliza (adică. un fuziune de un spermatozoid cu ovulul care un embrion este format).

După câteva zile se plantează ovulul fertilizat în uter și începe sarcina . Contraceptive sarcină.

- Contraceptive (contracepție)

Cu metode contraceptive se poate fi prevenit:

- ovulația: cu ajutorul pilulei contraceptive
 - fertilizarea (fuziunea unei celule spermatozoice cu ovulul): cu ajutorul prezervativului
 - implantarea a unui ovul fertilizat în uter: cu ajutorul dispozitivului intrauterin.
- Pilule de urgență pentru contracepție
Prin utilizarea de pilule de urgență pentru contracepție este după actul sexual de ovulația blocat sau întârziat sau este de implantarea a fertilizat ovul prevenit. Ele funcționează nu ca de implantare al are loc.

Când o femeie raport sexual are fără utilizarea a unei metode contraceptive poate riscul șansa de sarcină nu fi exclus.

Dacă ați acest medicament luat , dăruind metodă contraceptivă normală utilizați, este insistent recomandat să un medic sau GGD a vizita. Dvs. veți primi atunci sfaturi despre metoda contraceptivă care pentru dvs. este cea mai potrivită .

b) Sfaturi în caz de risc de transmiterea a unei sexuale transmisibile afecțiuni

Dacă aveți neprotejată relație sexuală aveți, riscați să contractați o boală cu transmitere sexuală a primi, în special dacă aveți sexuală antecedentele ale partenerului dumneavoastră nu cunoașteți sau dacă aveți mai mulți parteneri aveți. Pentru întrebări puteți u justificat la dumneavoastră medic, farmacist sau GGD.

GLOSAR

Extrauterină (ectopică) sarcină: o sarcină care se dezvoltă în afara de uter, de obicei în una dintre trompele uterine. Printre simptome se numără durerea abdominală persistentă ,lipsa menstruațiilor menstruații sângerări vaginale ,, semne de sarcină (greață, sâni sensibili). Dacă aveți astfel de simptome , trebuie să contactați imediat medicul dumneavoastră pentru consultare consultați.

Salpingită: infecție a trompelor uterine. Printre simptomele se numără durerea abdominală, febră și secreție vaginală abundentă.