

Bipacksedel: information för den användare

NorLevo 1,5 mg, tabletter
levonorgestrel

Läs noggrant hela bipacksedeln innan du detta läkemedel ska ta för står viktig information i för dig.

Använd detta läkemedel alltid exakt som beskrivet i denna bipacksedel eller som din läkare, apotekare, drogist eller GGD du det har berättat.

Förvara denna bipacksedel. Kanske har du den senare igen behöver.

Har du ännu frågor? Kontakta då din läkare, apotekare eller drogist.

Får du besvär av en av de biverkningar som i avsnitt 4 står? Eller får du en biverkning som inte i denna bipacksedel står? Kontakta då din läkare eller apotekare.

I denna bipacksedel:

1. Vad är NorLevo en vad används detta läkemedel för?
2. När bör du inte använda detta läkemedel eller måste du vara extra försiktig med det?
3. Hur använder du detta läkemedel?
4. Möjliga biverkningar
5. Hur förvarar du detta läkemedel?
6. Innehåll av förpackningen och övriga övriga information

1. Vad är NorLevo och vad används detta läkemedel för?

NorLevo är ett oralt akutpreventivmedel.

Vad är akutpreventivmedel?

Nödprevention är en metod som är avsedd att förhindra graviditet efter oskyddat samlag eller vid misslyckande av preventivmedel . misslyckas av preventivmedel.

När ska du detta akutpreventivmedel ta?

Du ska detta läkemedel så snart som möjligt ta, helst inom 12 12 timme och inte senare än 72 timmar (3 dagar) efter det oskyddade samlaget eller efter misslyckandet av en preventivmetod . Hur. Hur snabbare detta läkemedel efter de oskyddade samlaget tas in, ju bättre det fungerar . Dettaläkemedel kan endast förhindra att du du gravid blir om du det inom 72 timmar efter det oskyddade samlaget tar. Läkemedlet fungerar inte om du redan är gravid . Om du böjd. Om du efter intag av detta läkemedel oskyddat sex har, kommer läkemedlet inte förhindra att du blir gravid . Det är.

Det är visat att detta läkemedel 52% till 85% av de förväntade graviditeterna förhindrar.

Om du av en av de följande anledningarna misstänker att du gravid kan bli:

du har haft samlag utan preventivmedel preventivmedeldu har

glömt att ta ditt p-piller i tid på att ta;

det kondomen av din partner har gått sönder gått av, förskjutits eller ramlat av ;du är orolig

att din spiral har lossnat losskjuten;
din pessar av din livmoderhalsmössa är förflyttad eller du har det för tidigt borttagit;
du är rädd att metoden metod av samlag interruptus eller rytmmetoden har misslyckats;
i fall av våldtäkt.

Detta läkemedel stoppar frisättningen av ett ägg genom din din äggstockar. Det kan inte förhindra att ett befruktat ägg fäster vid livmodern . Denna endast avsedd som en nödlösning nödpreventivmedel, inte som vanlig preventivmetod eftersom dessa mindre effektiva är än det "vanliga" p-piller ("p- piller").

Detta läkemedel är inte avsedd för flickor före deras första menstruation menstruation.

2. får du detta läkemedel inte använda eller måste måste u är extra försiktig med vara?

När får du detta läkemedel inte använda?

Du är allergisk mot en av de ämnena i detta läkemedel. Dessa ämnen kan du hitta i avsnitt 6.

När måste du vara extra försiktig med detta läkemedel ?Det

Det användning av detta läkemedel rekommenderas inte i de följande fallen:

om du tidigare haft extrauterin utomkvedshavandeskap(ektopisk graviditet graviditet haft (detta är fallet fall om barnet sig utanför livmodern livmoder utvecklas);
om du en inflammation av dina äggledare har haft (salpingit);
om du en personlig eller familjehistoria har av en känd riskfaktor för trombos (blodproppar);
om du en allvarlig matsmältningssjukdom har som upptag av mat och läkemedel minskar;
om du allvarliga leverproblem har eller en allvarlig sjukdom av tunntarmen ,såsom Crohns sjukdom . En

tidigare genomgången utomkvedshavandeskap extrauterin (ektopisk)graviditet och en en tidigare inflammation av äggledarna ökar risken för en (ny)utomkvedshavandeskap extrauterin Därför. du om du som u tidigare en utomkvedshavandeskap (ektopisk) graviditet eller en inflammation i äggledarna har haft kontakta ta med din läkare innan du detta läkemedel använder.

Använd akutpreventivmedel endast tillfälligt och i nödsituationer och inte som, eller i stället för vanliga preventivmetoder eftersom:

det inte i alla fall graviditet förhindrar;

det risk för en överskott av hormoner en störning av cykel kan orsaka.

Genom akutpreventivmedel kan en graviditet inte avbrytas avbruten.

samma menstruationscykel menstruationscykel merän 72 timmar timme sedan) redan någon gång tidigare oskyddat samlag har haft, kan det redan en befruktning ha ägt rum.

Användningen av detta läkemedel medel efter den andra gången samlag kan alltså ingen graviditet mer förekomma.

Det rekommenderas inte att använda denna medicin oftare än en gång inom en menstruationscykel i att ta eftersom detta din cykel kan störa.

Detta läkemedel fungerar inte så bra som vanliga preventivmetoder (p-piller, piller, kondom). Din läkare kan du berätta om preventivmetoder för den långa de lång period som effektivare förhindra att du blir gravid ..

användning av denna medicin läkemedel:

måste uteslutas genom utesluten genom en graviditetstest utföra att göra:

om din nästa menstruationsperiod mer än fem dagar för sen är;

i fall av abnormalt blodförlust, också på den förväntade menstruationsdagen.

Alla kvinnor måste så snart som möjligt efter oskyddat samlag ta akutpreventivmedel . Det finns är indikationer att detta läkemedel möjligen mindre effektivt skulle kunna vara vid en högre kroppsvikt eller en högre body mass index (BMI), men dessa data var begränsade och inte övertygande. Därför rekommenderas detta läkemedel för alla kvinnor rekommenderas, oavsett deras vikt eller BMI.

Du blir rådgiven kontakt med att ta med din läkare, apotekare eller drogist om du är orolig över eventuella problem i i förband med intag av akut preventivmedel.

Om du under samlag inte kondom har använt (eller om den har gått sönder eller glidit av avgliden) är det möjligt att du en könssjukdom (sexuellt överförbar sjukdom, STD) eller hiv-virus har fått . Användningen av nödpreventivpiller erbjuder akut-p-piller erbjuder ingen skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar eller mot infektion med hiv-virus och kan de nödvändiga (försiktighets)åtgärder vid risk för överföring inte ersätta (se "Övrig information" längst ner i denna bipacksedel).

Barn och ungdomar upp till 18 år

De effektivitet av NorLevo hos ungdomar (upp till 18 år) är jämförbar med den hos vuxna. De dosering för ungdomar är samma till den för vuxna. Ta detta läkemedel inte före den första menstruationen.

Använder du andra läkemedel läkemedelAnvänder

Används du ännu andra läkemedel eller har du det nyligen gjort ?Berätta detta för din apotekare , läkare eller drogist . Det. Det gäller också för läkemedel för vilka inget recept behövs är och örtmediciner.

Vissa läkemedel kan göra att NorLevo mindre mindre bra fungerar. Om du nu eller under de senaste 4 veckorna en av de läkemedel har använt som nedan nämns , då kan NorLevo mindre lämplig lämplig för du är. En läkare kan dig ett annat akutpreventivmedel förskriva, såsom en kopparspiral (Cu-IUD), som av en läkare måste placeras placeras. Om en spiral för dig inte alternativ är eller om du inte omedelbart till din läkare kan gå, ta då två gånger så mycket av NorLevo i:

- barbiturater och läkemedel mot epilepsi (såsom primidon, fenytoin, karbamazepin)
- läkemedel mot tuberkulos (såsom rifampicin, rifabutin)-
- hiv medel (ritonavir, efavirenz)
- ett läkemedel mot svampinfektion (griseofulvin)
- örtmedel med johannesört (Hypericum perforatum)

Rådfråga din läkare, apotekare eller drogist om du råd behöver har om hur många tabletter du ska ta.

Rådfråga så snart möjligt efter du har tabletter har tagit med en läkare för en graviditet utesluta att utesluta och för vidare råd om en pålitlig form av reguljär preventivmedel (se även avsnitt 3 "Hur tar du denna medicin " för mer information).Även

Också kan NorLevo de verkan av andra läkemedel påverka:

- ett läkemedel som ciklosporin kallas (används för att immunsystemet att te undertrycka).

NorLevo får inte användas i kombination med läkemedel som innehåller ulipristalacetat ulipristalacetat Graviditet.

amning Om du är gravid

Om du gravid är:

Om du redan gravid är, kan detta läkemedel denna graviditet inte avbryta.

Om du detta läkemedel använder och ändå gravid blir, finns det inga indikationer att det är skadligt för barnet (foster). Men du får inte detta läkemedel använda om du är gravid du gravid är.

Om du efter intag av detta läkemedel blir gravid ,måste du kontakta med ta med din läkare. Din läkare vill kommer att då kanske kontrollera om du ingen utomkvedshavandeskap graviditet har (barnet utvecklas sig någonstans utanför din livmoder). Detta är särskilt viktigt om du allvarliga smärta i din mage får efter intag av denna medicin eller om du redan någon gång tidigare en utomkvedshavandeskap (ektopisk) graviditet eller en operation på dina äggledare eller en inflammatorisk sjukdom i bäckenet har haft ..

ammar amning ger:

Amning är möjligt. Men eftersom levonorgestrel utsöndras utsöndrad bröstmjölken , är det klokt att amma direkt före intag av tabletten av tabletten du ge och under 8 timmar efter intag av denna medicin ska bröstmjolk pumpas ut och mjölk kastas bort att slänga. Om du under denna tid mjölk pumpas, måste du denna kasta.

Fråga din läkare eller apotekare om råd innan du en läkemedel ska använda.

Körförmåga och användning av maskiner

Efter intag av detta läkemedel fick vissa kvinnor besvär av trötthet en yrsel (se avsnitt 4 "Möjliga biverkningar"): kör inte och använd inga maskiner om du har besvär av dessa symptom.

Det finns ingen forskning utförd med avseende på effekten av detta läkemedel på körförmåga och på förmågan att hantera maskiner ..

NorLevo innehåller laktosmonohydrat

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat. Om din läkare har sagt till dig att vissa typer av sockerarter inte tål, kontakta honom/henne innan du denna medicin börjar använda.

3. Hur använder du denna medicin?

Använd denna medicin alltid precis som i bipacksedeln står eller som din läkare, apotekare eller drogist du det har berättat. Tvivlar du på rätt användning? Kontakta då din läkare.

NorLevo kan när som helst under din menstruationscykel tas ,förutsatt att du inte redan gravid är eller gravid böjd av tänker att du gravid skulle kunna vara. Tabletten inte tugga, men i sin helhet svälja med vatten.

Svälj tabletten så snabbt som möjligt. Det helst inom 12 timmar, men i varje fall inte senare än 72 timmar (3 dagar) efter du oskyddat samlag har haft. Fördröj inte ta av tabletten inte ut. Hur snabbare du tar tabletten efter den oskyddade sexen tar, desto bättre den fungerar. Tabletten kan endast förhindra att du blir gravid blir, om du tar det inom inom 72 timmar efter oskyddat samlag.

Om du en av de läkemedel använder som för kan se till att NorLevo mindre bra fungerar (se ovanstående avsnitt "Andra läkemedel och NorLevo") eller om du i senaste 4 veckor en av dessa läkemedel har använt, då kan NorLevo mindre lämplig för dig vara. Din läkare kan du då en annan nödpreventivmedel förskriva, som en kopparspiral (CuUD). Om en kopparspiral för dig inte ett alternativ är eller om du inte omedelbart till din läkare kan gå, ta då två gånger så mycket av NorLevo (alltså på samma gång alla tabletter ta).

Om du redan en regelbunden preventivmetod använder som den p-piller, då kan du den vid den vanliga tidpunkten fortsätta ta. I det fall du ingen menstruell blödning i den nästa pillerfria perioden har, då måste du göra ett graviditetstest för att utesluta graviditet från att utesluta.

Om du inom tre timmar efter intag av tabletten måste kräkas, måste du omedelbart ta en tablett till. Kontakta din apotekare, läkare av apotekare, om du fortfarande en tablett behöver har.

Efter användning av detta läkemedel måste du ett preventivmedel använda använda (kondom, spermadödande medel eller en pessar) tills nästa menstruationsperiod börjar . Om duefter användning av användning från detta medel återigen oskyddat samlag har (också om detta i samma menstruationscykel är), skyddar detta medel inte återigen mot en graviditet. Om du använder dig av en vanlig preventivmetod som den orala preventivpillen, då bör du denna som vanligt ta fortsätta fortsätta.

Din läkare kan dig rådgöra om preventivmetoder för den längre sikt som effektivare kommer förhindra att du gravid blir.

Om du vanlig hormonell preventivmedel fortsätter använde som de p-piller och du under din pillerfria period ingen blödning har, besök då din läkare för att kontrollera om du inte gravid är. Din

nästa menstruation efter du denna medicin har tagit intagen

Efter användning av detta läkemedel är din menstruation vanligtvis normal och kommer den på den förväntade dagen börja; ibland kommer detta dock en par dagar senare eller tidigare är.

Om din menstruation mer än 5 dagar för sen är, eller ovanligt lätt av tung är, eller om du för en annan anledning tror att du gravid är, måste du med ett graviditetstest (låta) kontrollera om du gravid är. Om du ändå efter intag av detta läkemedel gravid blir, är det viktigt att du din läkare besöker.

Har du för mycket av detta läkemedel använt?

Det finns inga rapporter om en akut förgiftning eller allvarliga skadliga effekter efter det intag av för mycket av denna medicin på en gång. Du kan dock bli illamående ,faktiskt kräkas eller av vaginala blödningar få. U måste för råd kontakta att ta med din läkare, apotekare eller drogist.

4. Möjliga biverkningar

Som varje läkemedel kan också detta läkemedel biverkningar ha, även får inte alla det att göra.

De följande biverkningar är observerade:

Mycket vanliga (förekommer hos mer än 1 av 10 användare):yrsel

yrselhuvudvärk ;illamående

illamåendebuksmäta buksmäta;

känsliga bröst, fördröjning av menstruation, kraftig menstruation, blödningar,

livmodersmäta;

trötthet.

Ofta (förekommer i vid mindre än 1 av 10 användare):

diarré, kräkningar;

menstruationssmäta.

Inte känd (kan med de tillgängliga uppgifterna inte fastställas bestämmas):

Sedan detta läkemedel på marknaden är har det tromboemboliska händelser (blodproppar) rapporterats.

Allergiska reaktioner, såsom svullnad i halsen och i ansiktet och hudutslag kan uppstå efter intag av denna medicin.

Att rapportera av biverkningar

Får du besväras av biverkningar, kontakta då din läkare. Detta gäller också för möjliga biverkningar som inte i denna bipacksedel står. Du kan biverkningar också direkt rapportera via Nederländska Biverkningar Centrum Lareb, webbplats: www.lareb.nl. Genom biverkningar att rapportera, kan du oss hjälpa mer information att få om säkerheten för detta läkemedel.

5. Hur förvarar du detta läkemedel?

Utanför synhåll och räckhåll för barn förvara.

Blisterförpackningen i ytterförpackningen förvara för skydd mot ljus.

Använd denna medicin inte längre efter utgångsdatumet som anges står anges på lådan och blisterförpackningen efter "EXP". Utgångsdatumet hänvisar till den sista dagen i den månaden . Använd.

medicin detta medel inte om du synliga tecken på fördärv upptäcker; produkten bör då tas tillbaka till din apotekare ..

läkemedel läkemedel inte genom avloppet eller toaletten och släng dem inte i soporna. Fråga din apotekare vad du ska göra med läkemedel som du har inte mer används. De blir sedan på ett ansvarsfullt sätt förstörda och kommer inte i miljön in.

6. Innehåll av förpackningen och övriga information

Vilka ämnen finns i denna medicin?

Den aktiva substansen i denna medicin är levonorgestrel.

De andra ämnena i detta medel är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

Levonorgestrel tillhör en grupp grupp av läkemedel som man betecknar som akutpreventivmedel.

Hur ser NorLevo 1,5 mg ut och hur många finns det i en förpackning?

En NorLevo 1,5 mg tablett är en vit, rund bikonvex tablett med inskription av kod NL 1.5 på en sida.

Varje förpackning innehåller en tablett med 1,5 mg levonorgestrel.

Innehavare av tillståndet för i handel sätta

Laboratoire HRA Pharma
200 avenue de Paris
92320 CHATILLON
Frankrike

Tillverkare CENEXI

17, Rue de Pontoise
95520 OSNY - FRANKRIKE

Delpharm Lille S.A.S.

Parc d'Activités Roubaix-Est
22 rue de Toufflers
CS 50070
59452 Lys Lez Lannoy – Frankrike

NorLevo 1,5 mg tabletter är registrerat under RVG 32303. Om du

efter att ha läst av från denna bipacksedel ännu någonstans inte säker på eller om du frågor har, kontakta då din apotekare eller läkare eller besök på webbplatsen för Rutgers WPF (www.rutgerswfp.nl).

Detta läkemedel är registrerat i medlemsstaterna i EES under följande namn :

Nederländerna NorLevo 1,5 mg, tabletter Österrike

Vikela 1,5 mg tablett Denna

bipacksedel bipacksedel är för den senast godkänd i maj 2025.

ÖVRIG INFORMATION

a) Någon information om menstruationscykeln och preventivmedel

- Menstruationscykeln
Menstruationscykeln är den tid mellan två menstruationsperioder. Vanligtvis varar cykeln 28 dagar, men längden kan variera från kvinna till kvinna. En kvinnamenstruerar endast när de inte är gravid.
- Befruktning
I mitten av varje cykel släpps ett ägg (ovum) ut i en av de två äggstockarna (detta moment heter 'ägglossning' eller 'ovulation'). Vanligtvis sker den ägglossning mitt i cykeln, men detta kan också ske när som helst på varje annan moment under cykeln.
Efter samlag kan manliga spermier (spermieceller) nära det frigjorda ägget komma och befrukta (d.v.s. en av en spermie med äggcellen vilket ett embryo bildas).
Efter några dagar fäster det befruktade ägget sig i livmodern och börjar graviditeten.
Preventivmedel.
- Antikonception (preventivmedel)
Med preventivmetoder kan förhindras:
 - : med hjälp av p-piller befruktning
 - befruktning sammansmältning av en spermie med äggcellen): med): med hjälp av kondom
 - implantation av en befruktad äggcell i livmodern: med hjälp av spiral.
- Akut-p-piller
Genom användning av akut-p-piller blir efter samlag den ägglossning blockerad eller fördröjd eller blir den implantation av det befruktade ägget förhindrad. De fungerar inte om den implantation redan har inträffat.

När en kvinna samlag har utan användning av en preventivmetod kan det vara risk för graviditet inte bli utesluten.

Om du detta läkemedel har intagit, men ingen normal preventivmetod använder, blir starkt rekommenderad att en läkare eller GGD att besöka. Du får då råd om preventivmetoden som för dig är mest lämplig är.

b) Råd vid risk för överföring av en sexuellt överförbar sjukdom

Om du oskyddat samlag har, löper du risken att få en sexuellt överförbar sjukdom att få, särskilt om du sexuella sjukdomshistoria av din partner inte känner eller om du flera partners har. För frågor kan du rådgöra med din läkare, apotekare eller GGD.

ORDLISTA

Extrauterin (ektopisk) graviditet: en graviditet som utvecklas utanför utero i livmodern, oftast i en av de äggledarna. Till symtomen hör ihållande buksmärta, uteblivna menstruationer, vaginala blödningar, tecken av graviditet (illamående, ömma bröst). Om du sådana symtom har, måste du omedelbart din läkare konsultera.

Salpingit: infektion av äggledarna. Till symtomen hör buksmärta, feber och kraftig vaginal flytning.

Transtoyou