

Beipackzettel: Information für den Anwender

NORMACOL Granulat

Sterculia urens Roxb., Gummi

Lesen sorgfältig den gesamten Beipackzettel bevor Sie dieses Arzneimittel geht verwenden denn es steht wichtige Informationen in für Sie.

Verwenden dieses Arzneimittel immer genau wie in diesem Beipackzettel beschrieben oder wie Ihr Arzt oder Apotheker Ihnen das gesagt hat.

- Bewahren diese Packungsbeilage. Vielleicht brauchen Sie ihn später wieder benötigen.
- Hat u noch Fragen? Nehmen Sie dann Kontakt auf mit Ihrem Apotheker.
- Bekommen Sie Beschwerden von einer der Nebenwirkungen die in Abschnitt 4 stehen? Oder bekommen Sie eine Nebenwirkung die nicht in dieser Packungsbeilage steht? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Wird Ihre Beschwerde nach 4 Tagen nicht weniger, oder wird er sogar schlimmer? Nehmen Sie dann Kontakt auf mit Ihrem Arzt.

Inhalt dieser Packungsbeilage Was ist

1. Normacol und wofür wird es verwendet ?Wann
2. Wann dürfen Sie Normacol nicht verwenden oder müssen Sie besonders vorsichtig damit sein?
3. Wie nehmen Sie Normacol ein?
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie bewahren u Normacol?
6. Inhalt von der Verpackung und weitere Informationen

1. Was ist Normacol und wofür wird es verwendet?

Normacol ist ein Abführmittel (Quellmittel). Es ist angezeigt bei der Behandlung der Symptome von Verstopfung, ausgenommen Verstopfung mechanischen Ursprungs .. Normacol ist angezeigt für die Anwendung bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren.

Bleibt Ihr Beschwerde nach 4 Tage nicht weniger, oder wird er sogar schlimmer? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt.

2. Wann dürfen Sie Normacol nicht verwenden oder müssen Sie besonders vorsichtig mit sind?

Wann dürfen Sie Normacol nicht verwenden?

- Sie sind allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe in diesem Arzneimittel. Diese Stoffe können Sie finden in Abschnitt 6 dieses Beipackzettels bei
- Verengung und oder Verschluss des Verdauungssystems bei
- sehr starker Verstopfung Verstopfung, fäkale Impaktierung genannt
- bei Mangel an Muskeltonus des Dickdarms (ColonatonieKolonatoniebei
- Bauchschmerzen ohne klare Ursache bei
- bei Übelkeit und Erbrechen.

Wann müssen Sie besonders vorsichtig sein mit Normacol?

- wenn Sie es langfristig anwenden. Bei chronischer Verstopfung wird Männer zuerst versuchen diese Zustand zu beheben durch Anpassung der Ernährungs- und Lebensgewohnheiten.
- wenn Sie es einnehmen wenn Sie von planen beabsichtigen zu gehen liegen (ruhenschlafen). Normacol sollte nicht eingenommen werden unmittelbar vor dem Schlafen schlafen gehen oder in eine liegende Haltung.
- wenn Sie Schwierigkeiten haben beim Schlucken . DieEinnahme sollte vermieden werden bei werden bei Patienten die Schwierigkeiten haben beim Schlucken ..
- Sie Durchfall haben . ImFall von schwerem Durchfall besteht die Möglichkeit Chance auf ein Flüssigkeit- und Elektrolytmangel. In diesem Fall sollten Sie ausreichend trinken ..
- Sie wenig trinken können trinken. Nehmen Normacol mit einer großen Menge Wasser oder anderen Flüssigkeit. Dies dient zur Verstopfung im Bereich des Verdauungssystems zu verhindern. Ausreichend Flüssigkeitsaufnahme muss zu werden gewährleistet.
- wenn Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat dass Sie bestimmte Zucker nicht vertragen, wenden Sie sich an Ihren Arzt bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen. Siehe auch Abschnitt „Normacol enthält Saccharose und Natrium“.
- es ist möglich dass die Stuhlgang heller von Farbe ist wenn Sie Normacol verwenden. Sie müssen sich darüber weiter keine Sorgen machen zu machen.

Kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

Kinder

Normacol ist nicht empfohlen bei Kindern unter dem Alter von 6 Jahre.

Verwenden Sie noch andere Arzneimittel?

Verwenden Sie neben Normacol noch andere Arzneimittel, haben Sie dass kurz vorher getan oder werden Sie dies vielleicht bald tun? Sagen Sie dann Ihrem Arzt oder Apotheker.

Worauf müssen Sie achten mit Essen und Trinken

Nicht von zutreffend.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fruchtbarkeit

Sind Sie schwanger, denken Sie schwanger zu sein, möchten Sie schwanger werden oder stillen Sie Ihr Baby? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

Normacol mag verwendet werden nach Rat von einem Arzt während der Schwangerschaft.

Normacol darf verwendet werden während der Stillzeit.

Es gibt keine Daten über die Wirkung von Normacol auf die Fruchtbarkeit bei Menschen verfügbar.

Fähigkeit zum Führen von Fahrzeugen und der Gebrauch von Maschinen

Normacol hat kein Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit und auf die Fähigkeit Maschinen zu bedienen.

Normacol enthält Saccharose und Natrium

Falls Ihr Arzt Ihnen verordnet hat mitgeteilt dass Sie bestimmte Zucker nicht vertragen, wenden Sie sich an Ihren Arzt bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

Enthält 2,5 g Saccharose pro Dosis für Erwachsene (Menge in 1 Beutel von 10 g). Vorsicht ist geboten bei Patienten mit Diabetes mellitus.

Dieses Arzneimittel enthält 41 mg Natrium (ein wichtiger Bestandteil von KochsalzSpeisesalz) pro Dosis für Erwachsene (Menge in 1 Beutel von 10 g). Dies entspricht 2% der empfohlenen maximalen täglichen Menge Natrium in der Natrium in der Ernährung für einen Erwachsenen.

3. Wie nehmen Sie Normacol ein?

Verwenden dieses Arzneimittel immer genau wie in diesem Beipackzettel steht oder wie Ihr Arzt oder Apotheker Ihnen das gesagt hat. Zweifeln Sie an der richtigen Anwendung? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn es keine Besserung eintritt nach 4 Tagen, konsultieren dann Ihren Arzt erneut.

Gebrauchsanweisung Normacol

Orale Anwendung: legen Sie die Körner trocken auf die Zunge und schlucken sie ohne kauen oder zerdrücken sofort mit einem großen Menge Wasser oder einem kühlen Getränk. Sie können sie auch auf weich Lebensmittel wie Joghurt streuen und so einnehmen. Trinken danach sofort viel Wasser oder ein anderes kühles Getränk. Bei Kinder kann man die empfohlene Dosis mischen mit Marmelade oder lassen quellen in einem wenig Wasser oder anderer Flüssigkeit. Trinken sofort nach der Einnahme noch ein groß Glas Wasser oder ein anderes Flüssigkeit.

Jugendliche und Erwachsene:

1 bis 2 Kaffeelöffel oder 1 Beutel, 2 bis 3 Mal pro Tag nach den Mahlzeiten

Gebrauch bei Kindern von 6 bis 12 Jahren:

½ bis 1 Kaffeelöffel oder ½ Beutel, 2 bis 3 x pro Tag nach den Mahlzeiten

Der Wirkstoff Wirkung von Sterculia urens Roxb., Gummi wird beobachtet zwischen 1 und 3 Tagen nach Einnahme, wie es der Fall ist bei alle Fasern.

Haben Sie zu viel von Normacol eingenommen?

Wenn Sie zu viel von Normacol eingenommen haben, nehmen Sie dann, dann nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem Giftnotruf (070/245.245).

Das Präparat kann, trocken eingenommen, einen Verschluss des Darms verursachen. Deshalb sollte man bei Überdosierung viel Wasser zu trinken. Wenn Sie schweren Durchfall haben, besteht die Gefahr einer Dehydratation en ein Elektrolytmangel. U sollten dann ausreichend zu trinken.

Haben Sie vergessen Normacol zu nehmen ?Nehmen

keine doppelte doppelt Dosis um eine vergessene Dosis nachzuholen , aber nehmen Sie einfachIhre nächste Dosis zum Zeitpunkt wie dies vorgesehen war . Hat.

Hat u noch andere Fragen über die Anwendung von diesem Arzneimittel? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Mögliche Nebenwirkungen

Wie jedes Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben. Nicht jeder bekommt damit zu tun.

Erkrankungen des Immunsystems:

- Allergische Reaktionen

Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts:

- Ausdehnung von dem Unterbauch
- Verstopfung der Speiseröhre
- Durchfall
- Übelkeit
- Bauchschmerzen
- Manchmal tritt Blähungen auf, die verschwinden bei Anpassung der Dosis.
- Fälle von Verstopfung oder Impaktierung (Verstopfung durch verhärteten Stuhl) auf Höhe des Darms sind ebenfalls beschrieben. Dies tritt im Allgemeinen für bei unzureichende Flüssigkeitsaufnahme bei älteren Patienten oder bei dem Vorhandensein einer Verengung auf Höhe des Verdauungssystems Verdauungssystem.

Das melden von Nebenwirkungen

Bekommen Sie Beschwerden von Nebenwirkungen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen die nicht in dieser Packungsbeilage stehen. Sie können Nebenwirkungen auch melden über:

Föderal Agentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
Abteilung Vigilanz

Galileelaan, 5/03
1210 BRÜSSEL

Postfach 97
B-1000 BRÜSSEL Madou

Website: www.eenbijwerkingmelden.be

e-mail: adr@fagg.be

Durch Nebenwirkungen zu melden, helfen Sie uns um mehr Informationen zu erhalten über die Sicherheit von diesem Arzneimittel.

5. Wie bewahren Sie Normacol?

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Schachtel mit 1 Beutel von 375 g:

Aufbewahren unter 25 °C und in der ursprünglichen Verpackung.

Die Schachtel sorgfältig geschlossen halten zum Schutz vor Feuchtigkeit.

Haltbarkeit nach opening: 3 Monate.

Schachtel mit 30 Beuteln von 10 g:

Lagern unter 25 °C.

Lagern in der ursprünglichen Verpackung zum Schutz vor Feuchtigkeit.

Verwendung dieses Arzneimittel nicht mehr nach dem Verfallsdatum
HaltbarkeitsdatumDieses finden Sie auf der Schachtel und den Beuteln nach „EXP“. Dort
steht ein Monat en ein Jahr. Der letzte Tag dieses Monats ist das Verfallsdatum
Haltbarkeitsdatum.

Arzneimittel nicht durch das Spülbecken oder die Toilette und und werfen sie nicht in den
Mülleimer. Fragen Sie Ihren Apotheker was Sie mit Arzneimitteln tun sollen die Sie nicht mehr
verwenden. Wenn Sie Arzneimittel in den richtige Weise entsorgt werden sie auf eine richtige
Weise vernichtet und gelangen sie nicht in die Umwelt gelangen.

6. Inhalt der Verpackung en andere Informationen

Welche Stoffe sind in Normacol?

- Der wirksame Stoff in Normacol ist: Sterculia urens Roxb., Gummi. (62 g pro 100 g Granulat)
- Die anderen Stoffe in Normacol sind: Natriumhydrogencarbonat, Talkum, Titandioxid (E171), Paraffin (fest), Vanillin, Saccharose (siehe Abschnitt 2 „Normacol enthält Saccharose en natrium“).

Wie sieht Normacol aus und was ist in einer Verpackung?

Normacol Granulat sind kleine weiße, unregelmäßig geformte Körner um in zu nehmen über den Mund.

Normacol ist erhältlich in einer Schachtel mit 1 Beutel von 375 g Granulat (Beutel bestehend aus Papier/niedrige Dichte Polyethylen). Normacol ist auch erhältlich in einer Schachtel mit 30 Beuteln von 10 g (Beuteln bestehend aus Papier/niedrige Dichte PolyethylenAluminiumniedrige Dichte Polyethylen).

Inhaber der Zulassung für das Inverkehrbringen bringen ::

N.V. „ Haasrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee

Hersteller:

Norgine Pharma, 29 Rue Ethé Virton, 28100 Dreux, Frankreich

Nummern der Genehmigung für das Inverkehrbringen bringen ::

Normacol in ein Schachtel mit 1 Beutel von 375 g: BE016484

Normacol in ein Schachtel mit 30 Beutel von 10 g: BE498604

Abgabemodus: Freie Abgabe

Dieser Beipackzettel ist für das zuletzt genehmigt in 01/2021.