

Prospecto: información para el usuario

NORMACOL Granulado

Sterculia urens Roxb., goma

Lea cuidadosamente todo el prospecto antes de que este medicamento va usar porque hay indica importante información en para usted.

Use este medicamento siempre exactamente como en este prospecto descrito o como su médico o farmacéutico le ha dicho ..

- este prospecto .. lo necesite más tarde de nuevo . Tiene.
- Tiene u todavía preguntas? Póngase en contacto con su farmacéutico.
- ¿Tiene efectos secundarios de uno de los efectos secundarios que en sección 4 se mencionan? O ¿tiene usted un efecto secundario que no en este prospecto figura? Póngase en contacto con su médico o farmacéutico.
- ¿Su síntoma después de 4 4 no mejora, o menos, o se él incluso peor? Póngase en contacto con su médico.

Contenido de este prospecto

1. Qué es Normacol y para qué se utiliza ?Cuándo
2. Cuándo puede Normacol no usar o debe tener cuidado con ello?
3. Cómo toma usted Normacol ?
4. Posibles efectos secundarios
5. Cómo almacena u Normacol?
6. Contenido de la empaque y otra información

1. Qué es Normacol y para qué se utiliza ?Normacol

es es uno laxante (formador de masa). Es indicado en el tratamiento de los síntomas de estreñimiento, excepto estreñimiento de origen mecánico. Normacol es indicado para uso en adultos, adolescentes y niños a partir de 6 años.

¿Persiste su síntoma después de 4 días no menos, o se vuelve él incluso peor? Entonces contacte a su médico.

2. Cuándo no debe Normacol usar o debe tener especial cuidado cautela mee son?

Cuándo puede Normacol no usar?

- Usted es alérgico a uno de los componentes en este medicamento. Este sustancias puede usted encontrar en sección 6 de este prospecto
- en estrechamiento y3 obstrucción del sistema digestivo
- en caso de severo estreñimiento, fecal impactación llamada
- en falta de tono muscular del intestino grueso (colónatonía)
- en dolor abdominal sin causa aparente
- en náuseas y vómitos.

Cuándo debe tener especial cuidado al con Normacol?

- si lo usa prolongadamente . En caso deestreñimiento crónico se debe hombres primero intentar esta condición a remediar mediante ajuste de la alimentación- y hábitos de vida.

- si usted lo toma cuando usted de plan dispuesto a ir acostarse (descansar o dormir). Normacol no debe tomarse justo antes de dormir o en una posición acostada.
- si usted dificultades tiene al tragar. La ingestión debe evitarse al ser realizada en pacientes que dificultades tienen al tragar ..
- tiene diarrea. Encaso de diarrea grave existe la posibilidad de un líquido y déficit de electrolitos. En este caso debe usted suficiente beber ..
- usted poco puede beber. Tome Normacol con una gran cantidad de agua o otro líquido. Esto sirve para prevenir la obstrucción en el sistema digestivo té prevenir. Suficiente ingesta de líquidos debe ser asegurada garantizado.
- su médico le ha informado que usted ciertos azúcares no tolera, póngase en contacto con, póngase en contacto con su médico antes de usted este medicamento tome. Vea también sección "Normacol contiene sacarosa y sodio".
- es posible que eso de heces más claras de color es cuando usted Normacol usa. Usted no necesita preocuparse por eso más preocupaciones sobre que tener.

Póngase en contacto con su médico o farmacéutico antes de que este medicamento tome.

Niños

Normacol no es recomendado para niños menores de la edad de 6 años.

Usa usted otros medicamentos

usted además de Normacol otros medicamentos, ¿usted tiene o que corto atrás hecho o va usted esto quizás pronto hacer? Diga que entonces su médico o farmacéutico.

Sobre qué debe usted tener cuidado con la comida y bebidas

No de aplicación.

Embarazo, lactancia y fertilidad

¿Está embarazada, piensa usted embarazada de estar, desea embarazada quedar o da usted lactancia? Entonces contacte a su médico o farmacéutico antes de que usted este medicamento use.

Normacol mag utilizarse después de consultar a un médico durante el embarazo.

Normacol puede utilizarse durante el periodo de lactancia.

No hay datos sobre el efecto de Normacol en la fertilidad en humanos disponibles.

Aptitud para conducir el uso de máquinas Normacol

tiene ninguna influencia en la capacidad de conducir y en la capacidad para operar máquinas de manejar.

Normacol contiene sacarosa y sodio

Si su médico le ha comunicado que usted ciertos azúcares no tolera, póngase en contacto con su médico antes de que este medicamento tome.

Contiene 2,5 g de sacarosa por dosis para adultos (cantidad en 1 sobre de 10 g). Precaución es necesaria en pacientes con diabetes mellitus.

Este medicamento contiene 41 mg de sodio (un componente importante de sal de cocinasal de mesa) por dosis para adultos (cantidad en 1 sobre de 10 g). Esto equivale a al 2% de la cantidad máxima diaria recomendada de sodio en la alimentación para un adulto.

3. Cómo toma usted Normacol ?

Use este medicamento siempre exactamente como en este prospecto estado o como su médico o farmacéutico le ha dicho .. sobre el uso correcto uso? Póngase en contacto con médico o farmacéutico .. Si hay no mejora después de 4 días, consulte entonces a su médico nuevamente.

Instrucciones de uso Normacol

Uso oral: coloque el gránulos seco en la lengua y trague ellos sin masticar o aplastar inmediatamente con una gran cantidad de agua o una bebida fría. Usted puede ella también en suave alimentos como yogur espolvorear y así tomar. Beber después inmediatamente mucho agua o una otra fría bebida. En niños puede se puede recomendada dosis mezclar con mermelada o dejar hinchar en un poco agua o otro líquido. Beber inmediatamente después de la ingesta otro un grande vaso agua o un otro líquido.

Adolescentes y adultos:

1 a 2 cucharaditas o 1 sobre, 2 a 3 veces al día después de las comidas

Uso en niños de 6 a 12 años:

½ a 1 cucharadita o ½ sobre, 2 a 3 veces al día después de las comidas

El principio activo efecto de *Sterculia urens* Roxb., goma se observa entre 1 y 3 días después de la ingestión , como es el caso todas fibras.

Ha usted demasiado de Normacol ingerido ? Cuando usted demasiado de Normacol ha ingerido , tome entonces ingerido, entonces tome inmediatamente contacte con su médico, farmacéutico o el Centro de Toxicología (070/245.245).

El preparado puede, seco ingerido, una obstrucción del intestino causar. Por eso se debe uno en sobredosis mucho agua que beber. Si usted grave diarrea tiene, existe la posibilidad de deshidratación en uno déficit de electrolitos. U debe entonces suficiente que beber.

¿Olvidó tomar Normacol en que tomar?

No tome doble dosis om una olvidada dosis en recuperar , pero tomes simplemente su siguiente dosis en el momento como esto fue previsto ..

Tiene u todavía otras preguntas sobre el uso de este medicamento? Entonces póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios

Como cualquier medicamento puede también este medicamento efectos secundarios tener. No todos experimentan eso con ello.

Trastornos del sistema inmunológico:

- Reacciones alérgicas

Trastornos gastrointestinales:

- Distensión de la parte inferior del abdomen

- Obstrucción del esófago
- Diarrea
- Náuseas
- Dolor abdominal
- A veces ocurre flatulencia , que desaparece con ajuste de la dosis.
- Casos de estreñimiento o impactación (estreñimiento por heces endurecidas) a la altura del intestino también se han descrito . Esto ocurre en general sobre el general para en insuficiente ingesta de líquidos en pacientes ancianos o en la existencia de una estenosis a la altura del sistema digestivo.

El informar de efectos secundarios

Tiene molestias de efectos secundarios, póngase en contacto con su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a efectos secundarios que no están en este prospecto estar. U puede efectos secundarios también informar a través de:

Agencia Federal de medicamentos y productos sanitarios
Departamento Vigilancia

Avenida Galileo, 5/03
1210 BRUSELAS

Apartado de correos 97
B-1000 BRUSELAS Madou

Sitio web: www.eenbijwerkingmelden.be
e-mail: adr@fagg.be

Por efectos secundarios a informar, ayuda a nosotros a obtener información sobre la seguridad de este de esto medicamento.

5. Cómo conservar usted Normacol?

Fuera de la vista y alcance de niños mantener.

Caja con 1 sobre de 375 g:

Conservar por debajo de 25 °C y en el envase original.

La caja mantener cerrada cuidadosamente para proteger contra la humedad.

Caducidad después de apertura: 3 meses.

Caja con 30 sobres de 10 g:

Conservar por debajo de 25 °C.

Conservar en el envase original para proteger contra la humedad.

Uso este medicamento no más después de fecha de caducidad . La encuentra en la caja y los sobres después de "EXP". Allí se encuentra un mes mes en un año. El último día de ese mes es la fecha de caducidad fecha de caducidad.

medicamentos por el fregadero o el inodoro y un tire ellos no en el basurero. Pregunte a su farmacéutico qué hacer con medicamentos debe hacer que no más usa. Si medicamentos en el correcta manera elimina sean las en una correcta manera destruidas y lleguen no al medio ambiente terminen.

6. Contenido del empaque en otros información

¿Qué sustancias contiene en Normacol?

- El principio activo en Normacol es: Sterculia urens Roxb., goma. (62 g por 100 g granulado)
- De otros componentes en Normacol son: bicarbonato de sodio, talco, dióxido de titanio (E171), parafina (sólida), vainillina, sacarosa (ver sección 2 "Normacol contiene sacarosa en natrium").

Cómo se ve Normacol y qué contiene un empaque ? Normacol

Granulado son pequeños blancos ,irregularmente formados gránulos gránulos para en tomar por la boca.

Normacol está disponible en una caja con 1 bolsa de 375 g granulado (bolsa compuesta de papel/baja densidad polietileno). Normacol es también disponible en una caja con 30 sobres de 10 g (sobres compuestos de papel/baja densidad polietilenoaluminio baja densidad polietileno).

Titular de la autorización para la comercialización ::

N.V. ,, Haasrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee

Fabricante:

Norgine Pharma, 29 Rue Ethé Virton, 28100 Dreux, Francia

Números de la licencia para la comercialización ::

Normacol en un caja con 1 sobre de 375 g: BE016484

Normacol en una caja con 30 sobres de 10 g: BE498604

Modo de dispensación: Libre dispensación

Este prospecto está para el último aprobado en 01/2021.