

## Pakendi infoleht: teave kasutajale de kasutaja

### NORMACOL Graanulid

Sterculia urens Roxb., kumm

Lugege hoolikalt kogu pakendi infoleht enne kui seda ravimit läheb kasutama sest seal seisab oluline teave sees teie jaoks.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nagu selles selles infolehes kirjeldatud või nagu teie arst või apteeker teile seda on öelnud.

- Hoidke seda infolehte. Võib-olla on teil seda hiljem jälle vaja.
- Kas u veel küsimused? Võtke ühendust teie apteekriga.
- Kas teil tekivad üks nendest kõrvaltoimetest mis on jaotises 4 loetletud? Või kas teil mõni kõrvaltoime mis ei selles selles infolehes seisab? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.
- Kas teie kaebus pärast 4 päeva ei vähene, või muutub ta isegi hullemaks? Võtke ühendust oma arstiga.

Sisu sellest sellest infoleht

1. Mis on Normacol ja milleks kasutatakse seda kasutatakse?
2. Millal ei tohi Normacol kasutada või peate olema ettevaatlik sellega olema ?Kuidas
3. võtate te Normacol sisse? Võimalikud
4. kõrvaltoimed Kuidas
5. säilitate säilitab u Normacol?
6. Sisu pakendi ja muud teave 1.

#### 1. Normacol ja milleks kasutatakse seda ? Normacolon

Normacol on üks lahtisti (mahu suurendaja). See on näidustatud juures ravi sümptomite kõhukinnisuse puhul , välja arvatudkõhukinnisus mehaanilise päritoluga . mehaaniline päritolu. Normacol on näidustatud kasutamiseks täiskasvanutel , noorukitelja lastel alates 6 eluaastast 6 Kas.

kaebus pärast 4 ei 4 päeva mitte vähem või muutub ta isegi hullemaks? Võtke siis ühendust oma arstiga.

#### 2. Millal ei tohi te Normacol mitte kasutada või peate olema eriti ettevaatlik kaasa on?

Millal tohib te Normacol mitte kasutada?

- Te olete allergiline mõne ühe nendest ainetest selles selles ravimis. See ained saate te leida jaos rubriik 6 sellest sellest pakendi infoleht
- kitsenemine ja võiummistus seedetrakti seedeelundkonna juures
- väga tõsine kõhukinnisus kõhukinnisus, fekaalne impaktsioon nimetatakse
- juures puudus lihastoonus jämesoole alates jämesool sool (kolonotoonia)
- juures kõhuvalu ilma selge põhjus
- juures iiveldus ja oksendamine.

Millal peate olema eriti ettevaatlik olema koos Normacol?

- kui kasutate seda pikaajaliselt . Kroonilise kõhukinnisuse korral on vaja mehed esmalt püüdma seda seisundit kõrvaldada läbi kohandamise toitumis- ja elustiili- harjumusi elustiilid.
- te seda võtate kui te olete teie alates plaan kaldub et minna lamama (puhkama2Fmagama). Normacol ei tohi võtta enne kui vahetult enne magama minekut magama minema või üks lamav asend.
- kui teil raskused on neelamisel . Manustamine peaks vältima olema kui on probleeme neelamisel patsiendid kes raskused on neelamisel raskusi neelamisega.
- kui teil kõhulahtisus on. Juhul kui raske kõhulahtisus on oht võimalus võimalus peal üks vedelik- ja elektrolüütide puudus. Selles juhtumis tuleb teil piisavalt juua . kui.
- vähe suudate juua võib jooma. Võtke Normacol koos suure koguse veega või muu vedelikuga . See on selleks, et ummistust seedetrakti kõrgusel vältida . seedetrakt te ärahoidmine. Piisav vedeliku tarbimine peab olema tagatud tagatud.
- teie arst teile on teatanud et te teatud suhkruid ei talu , võtke ühendust oma arstiga arst enne te seda ravimit võtate. Vaata ka jaotis "Normacol sisaldab sahharoosi ja naatriumi".
- see on võimalik et de väljaheide heledam van värv on kui te Normacol kasutate. Te ei pea muretsema selle pärast edasi üldse muret teha pärast.

Võtke ühendust oma arstiga või apteekriga enne kui te seda ravimit võtate.

#### Lapsed

Normacol ei ole soovitatav lastele alla lastele alla de vanus 6 aastat.

Kasutate te veel teisi ravimeid?

Kasutate te lisaks Normacol veel teisi ravimeid, kas te et lühikest aega tagasi tehtud või lähete te seda võib-olla varsti tegema? Rääkige sellest siis oma arstile või apteekrile.

Millele peab te tähele panema söömisega ja joomisega

Ei kehti kohaldatav.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kas olete rase, arvate te rase olla on, soovite rase jääda või toidate te rinnaga? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga enne kui seda ravimit kasutate.

Normacol võib kasutada pärast nõu arsti soovitusel raseduse ajal . Normacol võib.

imetamise ajal . saama ajal de rinnaga toitmise periood.

Ei ole olemas andmeid Normacoli mõju kohta viljakusele inimestel saadaval . Sõiduvõime ja.

kasutamine Normacol ei mõjuta sõiduvõimet

ega masinate kasutamist puudub mõju sõiduvõimele juhtimisvõimele ja masinate võimele käsitseda masinaid kasutada.

Normacol sisaldab sahharoosi ja naatriumi

Kui teie arst on teile öelnud teatatud et te teatud suhkruid ei talu, võtke ühendust oma arstiga enne kui seda ravimit võtate.

Sisaldab 2,5 g sahharoosi annuse kohta täiskasvanud (kogus 1 kotike 10 g). Ettevaatust on vajalik juures patsientidel diabeet mellitus'ega.

See ravim sisaldab 41 mg naatriumi (üks oluline koostisosa alates keedusoollausool) per annus täiskasvanutele täiskasvanud koguskogus kotike 10 g). See vastab 2% soovitatavast

maksimaalsest päevasest naatriumi kogusest igapäevane kogus naatrium veres toitumine jaoks üks täiskasvanu.

### 3. Kuidas võtate te Normacol sisse?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nagu selles selles pakendi infolehes seisund või nagu teie arst või apteeker teile seda on öelnud .. te õiges kasutuses ? Võtke siis ühendust omaarstiga või apteekriga . apteeker. Kui ei paranemist toimu pärast 4 4 ,konsulterige siis oma arstiga uuesti ..

#### Normacol Suukaudne

kasutamine : asetage: pane graan kuiv keelel ja neela need ilma närimata või purustamata kohe koos ühe suure koguse veega või ühe jaheda joogiga. Te võite neile ka peal pehme toit nagu jogurt puistata ja nii võtta. Joo seejärel kohe palju vett või üks teine jahe jook. Kui lapsed võib võib soovitatav annus segada moosiga või lasta paisuda sisse üks veidi vett või muu vedelik. Joo kohe pärast võtmist veel üks suur klaas vett või üks teine vedelik.

#### Noorukid ja täiskasvanud:

1 kuni 2 kohvilusikat või 1 kotike, 2 kuni 3 korda päevas pärast sööki toidukorrad

#### Kasutamine lastel vanuses 6 kuni 12 aastat:

½ kuni 1 kohvilusikat või ½ kotike, 2 kuni 3 x päevas pärast sööki toidukordi Toimeaine

on toimeaine Sterculia urens'i toime Roxb., kumm on täheldatud vahemikus 1 ja 3 päeva pärast manustamist, nagu see on juhtum on juures kõik kiudained.

#### Kas te liiga palju alates Normacol võtnud?

Kui te liiga palju alates Normacol olete võtnud, võtke siis kohe võtke ühendust oma arstiga, apteekriga või Mürgistusteabekeskusega (070/245.245).

Preparaat võib ,kuival võetuna ,põhjustada soolte ummistust . sooled põhjustama. Seetõttu tuleb inimene üleannustamise korral palju vett juua . Kui teil on raske kõhulahtisus on ,olemas oht dehüdratsiooniks võimalus peal dehüdratsioon en üks elektrolüütide puudus. U peate siis piisavalt juua ..

#### Normacol sisse võtta ? Ärge võtkekahekordset

Võtke ei kahekordne annus et üks unustatud annus sisse järele jõuda, kuid võtkelihtsalt oma järgmine annus ajal nagu see oli ette nähtud ..

Kas u veel muud küsimused selle kasutamise kohta selle ravimi? Võtke ühendust oma arstiga või apteekriga.

### 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu iga ravim võib ka see ravim kõrvaltoimeid omada. Mitte kõigil ei esinenud sellega seoses.

#### Immuunsüsteemi häired:

- Allergilised reaktsioonid



## 6. Sisu pakendi pakend en muud teave

Millised ained sisaldab Normacol ?Toimeaine

- Normacolis on: Sterculia urens Roxb., kumm. (62 g 100 g graanulikohta gom. (62 g 100 g kohta graanulid)
- De teised ained sisse Normacol on: Naatriumvesinikkarbonaat, talk, titaandioksiid (E171), parafiin (tahke), vanilliin, sahharoos (vt punkt 2 "Normacol sisaldab sahharoosi en naatrium").

Kuidas näeb Normacol välja ja mis on pakendis ?Normacol

Graanulid on väikesed valged ,ebakorrapärase kujuga graanulid sisse võtta võtma kaudu suu.

Normacol on saadaval sisse karpis karp 1 kotike 375 g graanulid (kotike koosneb koos paber/madal tihedus polüetüleen). Normacol on ka saadaval sisse ühes karpis koos 30 kotikest 10 g (kotikest koosnevad välja paber/madal tihedus polüetüleenalumiiniummadal tihedus polüetüleen).

Luba omanik müügiloo saamiseks turule toomine ::

N.V. ,, Haasrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee

Tootja:

Norgine Pharma, 29 Rue Ethé Virton, 28100 Dreux, Prantsusmaa

Litsentsi numbrid jaoks turule viimiseks ::

Normacol in üks karp koos 1 kotike 375 g: BE016484

Normacol in üks karp koos 30 kotikest 10 g: BE498604

Manustamisviis: Vaba väljastamine

See pakendi infoleht on jaoks het viimati heaks kiidetud aastal 01/2021.