

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle de käyttäjälle

NORMACOL Rakeet

Sterculia urens Roxb., kumi

Lue huolellisesti koko pakkausseloste ennen kuin tätä lääkettä menee käyttää sillä on lukee tärkeää tietoa tässä sinulle. u.

Käytä tätä lääkettä aina tarkalleen kuten tässä tässä pakkausselosteessa kuvattu tai kuten sinun lääkäri tai apteekkari sinulle sen kertonut ..

- tämä pakkausseloste .. tarvitset sitä myöhemmin uudelleen . Onko.
- tarvetta u vielä kysymyksiä? Ota sitten yhteyttä teidän apteekkariin.
- Saatteko oireita yhdestä näistä sivuvaikutuksista jotka kohdassa 4 mainitaan? Tai saatteko te jonkin sivuvaikutus joka ei tässä tämä pakkausseloste mainita? Ota yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkiin.
- Onko sinun vaiva 4 4 ei vähene, tai vähemmän tai tulee hän jopa pahempi? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäriin.

Sisältö tästä tämä pakkausseloste

1. Mikä on Normacol ja mihin käytetään sitä käytetään?
2. Milloin saatko Normacol ei käyttää tai täytyy sinun olla erityisen varovainen sen kanssa olla?
3. Kuinka otat sinä Normacol sisään?
4. Mahdolliset sivuvaikutukset
5. Kuinka säilytät u Normacol?
6. Sisältö van de pakkaus ja muut tiedot

1. Mikä on Normacol ja mihin sitä käytetään ?Normacol

on on yksi laksatiivi (tilavuuden lisääjä). Se on tarkoitettu hoitoon de oireiden ei ole ummetus alkaen lukuun ottamatta ummetus lukuun ottamatta mekaaninen alkuperä mekaaninen alkuperä. Normacol on tarkoitettu käyttöön aikuisille , nuorilleja lapsille alkaen 6 vuotta 6 Onko.

jälkeen 4 valitus ei 4 päivää ei vähemmän, tai tulee hän jopa pahemmaksi? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäriin.

2. Milloin et saa Normacol käyttää tai täytyy olla erityisen varovainen varovainen mukana ovat?

Milloin et saa Normacol ei käyttää?

- Olet allerginen yhdelle aineelle tässä aineista tässä tässä lääkkeessä. Nämä aineet voit u löytää kohdassa kohta 6 tästä tästä pakkausselosteesta
- ahtauma ja aitukkeuma ruoansulatuskanavan ruoansulatuskanavan tukos
- vakava ummetus vakava ummetus, fekaalinen impaktio nimeltään
- puutteessa lihasjäntevyys puute lihaksissa paksusuolen paksu suoli (koolonatonia)
- vatsakipu ilman selvää syytä kohdalla
- kohdalla pahoinvointi ja oksentelu.

Milloin täytyy olla erityisen varovainen kun käytät Normacol?

- jos käytät sitä pitkäaikaisesti . Kroonisessaummetus tapauksessa on tarpeen miehet ensin yrittää tämä tila korjata korjaamalla mukauttaminen ravitseminen - ja- . jos.
- ottaa kun kun olet ottaa kun olet suunnitelma taipumus tehdä mennä makuuasentoon (levätä2Fnukkua). Normacol ei tule ottaa juuri ennen nukkumaanmenoa varten se nukkua mennä tai yksi makaava asento.
- jos sinä vaikeuksia on kun nielemisessä . Otanauttiminen tulisi välttää että tulee olla kun potilaat jotka vaikeuksia on nielemisessä se nielemisessä.
- jos sinulla ripuli on. Jos tapauksessa vakava ripuli on mahdollisuus de on op yksi neste- ja elektrolyyttivaje. Tässä tapauksessa on teidän juotava riittävästi juoda ..
- te vähän voitte juoda juoda. Ota Normacol veden kanssa yksi suuri määrä vettä tai muuta nestettä. Tämä tarkoitettu estämään tukos ruoansulatuskanavan korkeudella of the ruoansulatusjärjestelmässä te ehkäisemään. Riittävä nesteytys tulee olla taattu taattu.
- lääkärisi on kertonut sinulle että et siedä tiettyjä sokereita , ota sitten yhteyttä lääkäriisi, ota sitten yhteyttä te lääkäri ennen te tätä lääke otat. Katso myös kohta "Normacol sisältää sakkaroosia ja natriumia".
- se on mahdollista että de uloste vaaleampi van väri on kun käytätte Normacol käytätte. Te ei tarvitse huolehtia siitä enempää ei huolia siitä tehdä huolta.

Ota yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin ennen kuin otat tätä lääkettä ..

Normacol

ei ole suositeltava lapsille alle kohdalla vuotiailla alla de ikä 6 vuotta.

Käytättekö te vielä muita lääkkeitä?

Käytättekö te lisäksi Normacol vielä muita lääkkeitä, onko teillä että lyhyt sitten tehty tai menee sinä tämä ehkä pian tehdä? Kerro että sitten sinun lääkäri tai apteekkari.

Mihin täytyy sinun huomioida syömisen ja juomisen

Ei sovellettavissa tapauksessa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Oletko raskaana, ajatteletko sinä raskaana olla ovat, haluatko raskaaksi tulla tai imetätkö sinä imetät? Ota sitten yhteyttä sinun lääkäriin tai apteekkariin ennen kuin käytät tätä lääkettä ..

Normacol saa käyttää vain lääkärin ohjeen mukaan raskauden aikana . Normacol saa. imetyksen aikana lääkärin ohjeen mukaan . imetysaika.

Ei ole tietoa Normacolin vaikutuksesta hedelmällisyyteen ihmisillä saatavilla . Ajamiskyky ja.

käyttö Normacol ei vaikuta ajokykyyn

tai koneiden käyttöön ei vaikutusta ajokykyyn ajokykyyn ja kykyyn kykyyn käyttää koneita käyttää koneita.

Normacol sisältää sakkaroosia ja natriumia

Jos sinun lääkäri on sinulle antanut ilmoitettu että te tiettyjä sokereita ei siedä, ota sitten yhteyttä teidän lääkäriin ennen kuin te tätä lääkettä otatte.

Sisältää 2,5 g sakkaroosia per annos ennen aikuiset (määrä yhdessä pussissa 10 g).

Varovaisuutta on noudatettava potilailla joilla on diabetes mellitus. diabetes mellitusta sairastavilla.

Tämä lääke sisältää 41 mg natriumia (yksi tärkeä ainesosa alkaen keittosuolapöytäsuola) per annos aikuisille aikuiset määrämäärä pussi 10 g). Tämä vastaa 2% suositellusta maksimi päivittäisestä määrästä natriumia päivässä määrä natrium veressä ravitsemus varten yksi aikuinen.

3. Kuinka otatte te Normacol sisään?

Käytä tätä lääkettä aina tarkalleen kuten tässä tässä pakkausselosteessa tila tai kuten teidän lääkäri tai apteekkari teille sen kertonut .. te oikeasta käytöstä ? Ota sitten yhteyttä teidänlääkäriin tai apteekkariin . farmaseutti. Jos ei ole paranemista tapahtunut 4 4 jälkeen, ota yhteyttä sitten lääkäriisi uudelleen ..

Normacol Suun

kautta : aseta: makaa rakeet kuiva kielen päälle ja niele ne ilman pureskelua tai murskaamista välittömästi juomalla suuren määrän vettä tai viileää juomaa. Voit juoda juoman. voit ne myös päällä pehmeä ruoka kuten jogurtti ripottaa ja niin ottaa. Juo sen jälkeen välittömästi paljon vettä tai yksi muu viileä juoma. Jos lapset voi voi suositeltu annos sekoittaa hillon kanssa tai antaa turvota vedessä vähän vettä tai muussa nesteessä. Juo välittömästi ottamisen jälkeen vielä yksi suuri lasi vettä tai yksi muu neste.

Nuoret ja aikuiset:

1–2 teelusikallista tai 1 pussi, 2–3 kertaa päivässä aterioiden jälkeen ateriat

Käyttö lapsilla 6 vuodesta 12 12 ::

kahvilusikallinen tai ½ pussia , 2à 3 kertaa päivässä aterioiden jälkeen Tehoaine ateriat

Se aktiivinen Sterculia urens -vaikutus Roxb., kumihartsia havaitaan havaittu ja 1 päivän 3 nauttimisesta , kutenon tapauksessa kun se on tilanne kun kaikki kuidut.

Onko sinulla liian paljon alkaen Normacol ottanut?

Kun sinä liian paljon alkaen Normacol olet ottanut, ota sitten välittömästi ota yhteyttä sinun lääkäriin, apteekkariin tai Myrkytystietokeskukseen (070/245.245).

Valmiste voi ,kuivana otettuna ,aiheuttaa suolitukoksen sulkeminen suolistossa suolisto aiheuttaa. Siksi tulee henkilön yliannostuksen sattuessa paljon vettä juoda juoda. Jos sinulla on vakava ripuli on, on mahdollisuus kuivumiseen päällä dehydraatioon en yksi elektrolyyttivajaus. U täytyy sitten riittävästi ottaa juoda.

Oletko unohtanut Normacol sisään ottaa ?Ota

ei kaksinkertainen kaksois annos klo yksi unohtunut annos sisään kiinni , mutta otayksinkertaisesti sinun seuraava annos ajankohtana kuten tämä oli suunniteltu ..

Onko u vielä muita kysymyksiä koskien käyttöä tästä tästä lääkkeestä? Ota yhteyttä teidän lääkäriin tai apteekkariin.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten jokainen lääke voi myös tämä lääke haittavaikutuksia olla. Ei kaikki saa niitä kohdata ..

Immuunijärjestelmän sairaudet:

- reaktiot Ruoansulatuskanavan häiriöt

Ruoansulatuskanavan sairaudet:

- Laajentuminen ei mitään käännettävää sisältöä alavatsa
- Ummetus ei käännettävää sisältöä ruokatorvi
- Ripuli
- Pahoinvointi
- Vatsakipu
- Joskus esiintyy ilmavaivat , jotka katoavat sopeutumisen säätö annos ..
- Tapaukset alkaen ummetus tai impaktio (ummetus kovettuneen ulosteen vuoksi)korkeus suoliston suoli on myös kuvattu . Tämäesiintyy yleensä yleisesti yleinen ennen sivuvaikutuksena riittämätön nesteytys sivuvaikutuksena iäkkäillä potilailla tai sivuvaikutuksena se olemassaolo alkaen ahtauma ahtauma korkeudella korkeus ruoansulatusjärjestelmä ruoansulatusjärjestelmä.

Se ilmoittaa alkaen haittavaikutuksista

Saatteko haittavaikutuksia , ottakaa yhteyttä lääkäriinne tai apteekkiinne . Tämäkoskee myös sellaisia haittavaikutuksia jotka eivät ole tässä pakkausselosteessa pakkausseloste seistä. U voit sivuvaikutukset myös ilmoittaa kautta:

Liittovaltion virasto lääkkeille ja terveystuotteille Osasto
Valvonta Galileokatu, 5/03

Postilokero 97
B-1000 BRYSSEL Madou

1210 BRYSSEL
Verkkosivusto:

Verkkosivusto: www.eenbijwerkingmelden.be
sähköposti: adr@fagg.be

Ilmoittamalla haittavaikutuksista te ilmoittaa autatte meitä saamaan enemmän tietoa lisää saada tietoa lääkkeen turvallisuudesta turvallisuus tämän tämä lääke.

5. Kuinka säilytät sinä Normacol?

Poissa näkyvistä ja ulottuvilta lasten pidettävä ..

jossa 1 pussi 375 g: 375 g:

Säilytä alle 25 °C ja alkuperäisessä pakkauksessa ..

huolellisesti suljettuna suojaksi kosteudelta . Säilyvyys avaamisen jälkeen on.
aika . opening: 3 kuukautta.

Laatikko 30 pussia 10 g:

Säilytä alle 25 °C.

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa suojassa kosteudelta suojaus Käyttö ohjeet.

. tätä lääkettä ei enää jälkeen de viimeinen käyttöpäivä. Se löytyy löydät laatikosta ja de pussit jälkeen "EXP". Siellä on kuukausi kuukausi en yksi vuosi. De viimeinen päivä siitä kuukaudesta on viimeinen käyttöpäivä.

Älä huuhtele lääkkeitä ei viemäriin tai wc:hen ja ja heitä ne ei roskakoriin roskakoriin. Kysy apteekkariltasi apteekkariltasi mitä sinun pitäisi tehdä lääkkeillä tehdä tehdä joita et ei enää käytä. Jos sinulla on lääkkeitä roskeen oikea tapa poistaa tulee ne yksi oikea tapa hävitetään ja pääsevät ne ei ympäristöön joutua.

6. Sisältö pakkauksen sisältö en muut tiedot

Mitkä aineet sisältyvät Normacoliin ?Vaikuttava

- aine Normacolissa on: Sterculia urens Roxb ., kumi . (62 g per 100 rakeet gom. (62 g per 100 g rakeet)
- De muut aineet sisään Normacol ovat: Natriumvetykarbonaatti, talkki, titaanidioksidi (E171), parafiini (kiinteä), vanilliini, sakkaroosi (katso kohta 2 "Normacol sisältää sakkaroosia en natrium").

Miltä näyttää Normacol ja mitä pakkaus sisältää ?Normacol

Granulaatti ovat pieniä valkoisia ,epäsäännöllisen muotoisia rakeita rakeet suun kautta ottaa suun kautta kautta suun.

Normacol on saatavilla sisään yksi laatikko ja 1 pussi 375 g rakeita (pussi koostuu ulos paperi/matala tiheys polyetyleni). Normacol on myös saatavilla sisään laatikossa laatikko 30 pussia 10 g (pussit koostuvat ulos paperi/matala tiheys polyeteenialumiinimatala tiheys polyeteeni).

Haltija myöntämis- lupa varten markkinoille saattaminen ::

N.V. ,, Haasrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee

Valmistaja:

Norgine Pharma, 29 Rue Ethé Virton, 28100 Dreux, Ranska

Luvan numerot myöntämiseen markkinoille saattamista varten:

Normacol in yksi laatikko jossa 1 pussi 375 g: BE016484

Normacol in yksi laatikko jossa 30 pussia 10 g: BE498604

Toimitustapa: Vapaa toimitus

Tämä pakkausseloste on sille se viimeksi hyväksytty 01/2021.