

Notice: information pour l' utilisateur

NORMACOL Granulés

Sterculia urens Roxb., gomme

Lisez attentivement toute la notice avant d' utiliser ce va utiliser car il indique importante information dans pour vous.

Utilisez ce médicament toujours exactement comme dans cette notice décrit ou comme votre médecin ou pharmacien vous l'a dit ..

- cette notice .. pourrez en avoir besoin plus tard ..
- A-t-il u encore questions? Contactez alors votre pharmacien.
- Ressentez vous des un des effets secondaires mentionnés dans la section 4 ?Ou ressentez vous un effet secondaire qui n'est pas dans cette notice mentionné? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.
- Votre symptôme après 4 4 ne diminue pas, ou moins, ou est il même pire? Contactez alors votre médecin.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Normacol et dans quel cas est il utilisé?
2. Quand pouvez-vous Normacol pas utiliser ou devez vous y prudent avec être?
3. Comment prenez vous Normacol ?
4. Effets indésirables
5. Comment conservez u Normacol?
6. Inhoud de emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Normacol et à quoi sert-il ? Normacolest

Normacol est un laxatif (agent de lest). Il est indiqué pour le traitement des symptômes de constipation, sauf constipation d' origine mécanique. Normacol est indiqué pour l'utilisation chez les adultes, les adolescents et les enfants à partir de 6 ans.

Votre plainte après 4 4 jours pas moins, ou devient il même pire? Contactez alors votre médecin.

2. Quand ne devez-vous pas Normacol utiliser ou devez vous faire particulièrement attention avec sont?

Quand pouvez-vous Normacol pas utiliser?

- Vous êtes allergique à un des composants de ce médicament. Ces substances pouvez vous trouver dans rubrique 6 de cette notice
- en cas de sténose etou occlusion du système digestif
- en cas de très sévère constipation, fécale impaction nommé
- en cas de manque de tonus musculaire de la gros intestin (colonic atonie)
- en cas de douleur abdominale sans cause évidente
- en cas de nausée et vomissements.

Quand devez vous être prudent avec Normacol ?si

- vous l'utilisez à long terme . En cas de constipation chronique vous devrez être prudent hommes d'abord essayer cette condition à remédier par adaptation de la nutrition- et habitudes de vie.
- si vous le prenez lorsque vous de plan êtes sur le point de aller vous coucher (reposer dormir). Normacol ne doit pas être pris juste avant de dormir le dormir aller ou en un position couchée.
- si vous avez des difficultés à avaler . La prise doit être évitée en cas de problèmes de patients qui difficultés ont à avaler les comprimés.
- si vous avez la diarrhée .En cas de diarrhée sévère il y a un risque chance sur un liquide- et déséquilibre électrolytique. Dans ce cas vous devez boire suffisamment pour boire.
- si vous peu pouvez boire. Prenez Normacol avec une grande quantité d'eau ou d'autre liquide. Cela sert à prévenir une obstruction au niveau du système digestif .. Adéquate apport hydrique doit être assuré garanti.
- votre médecin vous a informé que vous certaines sucres ne tolérez pas , contactezvotre votre médecin avant vous ce médicament prenez. Voir également rubrique "Normacol contient saccharose et sodium".
- il est possible que de selles plus claires de couleur est lorsque vous Normacol utilisez. Vous n'avez pas à vous inquiéter à ce sujet ..

Contactez votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament ..

Normacol

n'est pas recommandé chez les enfants de moins de de âge de 6 ans.

Utilisez vous encore d'autres médicaments?

Utilisez vous en plus de Normacol encore d'autres médicaments, avez vous que récemment fait ou allez vous le peut-être bientôt faire ? Informez que alors votre médecin ou pharmacien ..

Sur quoi doit vous faire attention avec la nourriture et boissons

Non applicable applicable.

Grossesse, allaitement et fertilité

Êtes-vous enceinte, pensez-vous vous enceinte à être, souhaitez-vous enceinte devenir ou donnez vous allaitement? Contactez alors votre médecin ou pharmacien avant d' utiliser ce médicament.

Normacol mag utilisé être après avis d'un médecin pendant la grossesse grossesse.

peut être utilisé pendant la période d'allaitement période d'allaitement.

Il y a aucune données sur l'effet de Normacol sur la fertilité chez les humains disponibles.

Aptitude à conduire et l' utilisation de machines

Normacol n'a aucun influence sur la capacité de conduire et sur la capacité à utiliser des machines à manipuler.

Normacol contient saccharose et sodium

Si votre médecin vous a communiqué que vous certaines sucres ne tolérez, contactez alors votre médecin avant de prendre ce médicament.

Contient 2,5 g de saccharose par dose pour adultes (quantité dans 1 sachet de 10 g).

Prudence est requise chez patients atteints de diabète sucré.

Ce médicament contient 41 mg de sodium (un élément important de sel de cuisine sel de table) par dose pour adultes (quantité dans 1 sachet de 10 g). Ce correspond à 2% de la quantité maximale quotidienne recommandée de sodium dans le nutrition pour un adulte.

3. Comment prenez -vous Normacol ?

Utilisez ce médicament toujours exactement comme dans cette notice état ou comme votre médecin ou pharmacien vous a dit .. sur l' utilisation correcte ? Contactez alors votre médecin ou pharmacien . pharmacien. Si il n'y a pas d'amélioration après 4 4 ,consultez alors votre médecin à nouveau ..

Normacol Usage

oral : placez le: posez la granules sec sur la langue et avale les sans mâcher ou écraser immédiatement avec un grand volume d'eau ou une boisson fraîche. Vous pouvez les aussi sur mou nourriture comme yaourt saupoudrer et ainsi prendre. Buvez ensuite immédiatement beaucoup d'eau ou une autre boisson fraîche. En cas de enfants peut on le recommandée dose mélanger avec de la confiture ou laisser gonfler dans un peu d'eau ou autre liquide. Buvez immédiatement après la prise encore un grand verre eau ou un autre liquide.

Adolescents et adultes:

1 à 2 cuillères à café ou 1 sachet, 2 à 3 x par jour après les repas

Utilisation chez les enfants de 6 à 12 ans:

½ à 1 cuillère à café ou ½ sachet, 2 à 3 x par jour après les repas

La substance active effet de Sterculia urens Roxb., gomme est observé entre 1 et 3 jours après ingestion, comme c'est le cas pour chez tous fibres.

Avez -vous trop de Normacol pris ?Lorsque

vous trop de Normacol avez pris , prenez alors ingéré, prenez alors immédiatement contactez votre médecin, pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).

La préparation peut, prise à sec ,provoquer une occlusion intestinale intestins provoquer.

C'est pourquoi il faut hommes en cas de surdosage beaucoup d'eau à boire. Si vous avez une diarrhée sévère diarrhée avez, il y a un risque de déshydratation en un déficit en électrolytes. Vous devez alors suffisamment de boire.

Avez-vous oublié Normacol de prendre ?Ne prenez

pas double double dose pour un oublié dose pour rattraper , mais prenez simplement votre prochaine dose au moment comme ceci était prévu ..

A-t-il u encore autres questions sur l' utilisation de ce médicament? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

4. Effets indésirables

Comme tout médicament peut aussi ce médicament effets secondaires avoir. Pas tout le monde en souffre . Affections du système immunitaire.

Réactions:

- Affections gastro-intestinales :

Affections gastro-intestinales:

- Distension de la partie inférieure de l'abdomen
- Constipation de l' œsophage
- Diarrhée
- Nausée
- Douleur abdominale
- Parfois survient flatulence , qui disparaît lors de l'ajustement de la dose.
- Cas de constipation ou impaction (constipation due à des selles dures) au niveau de l'intestin sont également décrits . Celase produit généralement en général pour chez insuffisante apport hydrique chez les patients ou en cas de la présence d' un rétrécissement au niveau du système digestif.

Le signaler de effets secondaires

Avez -vous des effets secondaires, contactez alors votre médecin ou pharmacien. Cela s'applique également aux effets secondaires qui ne sont pas dans cette notice se trouvent. Vous pouvez effets secondaires également signaler via :

Agence fédérale des médicaments et produits de santé
Département Vigilance

Avenue Galilée, 5/03
1210 BRUXELLES

Boîte postale 97
B-1000 BRUXELLES Madou

Site web : www.eenbijwerkingmelden.be
e-mail : adr@fagg.be

En signalant les effets indésirables , vous aidez à obtenir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament . de ce médicament.

5. Comment conservez vous Normacol?

Hors de la vue et portée des enfants garder.

Boîte de 1 sachet de 375 g :

Conserver en dessous de 25 °C et dans l' emballage d'origine.

La boîte bien fermée garder pour protéger contre l'humidité.

Durée de conservation après ouverture : 3 mois.

Boîte de 30 sachets de 10 g :

Conserver en dessous de 25 °C.

Conserver dans l' emballage d'origine pour protéger contre l'humidité.

Utiliser ce médicament pas après la date de péremption. Vous la trouvez sur la boîte et les sachets après « EXP ». Il y a un en un an. Le dernier jour de ce mois est la date de péremption.

Ne jetez pas les médicaments dans l'évier ou les toilettes et en jetez les pas dans la poubelle. Demandez à votre pharmacien ce que vous devez faire avec médicaments devez faire que vous ne plus utilisez. Si vous médicaments dans le correcte manière élimine être elles un correcte manière détruites et ne pas dans l'environnement trouvent.

6. Contenu de l' emballage en autres informations

Quelles substances contiennent il y a dans Normacol?

- La substance active dans Normacol est : Sterculia urens Roxb .gomme . (62 g par 100 ggranulés granulé)
- Les autres substances dans Normacol sont: bicarbonate de sodium, talc, dioxyde de titane (E171), paraffine (solide), vanilline, saccharose (voir rubrique 2 «Normacol contient du saccharose en natrium”).

Comment apparaît Normacol et qu'est-ce qui est dans un emballage ?Normacol Granulés sont de petits blancs ,irrégulièrement formés grains granulés pour dans à prendre par la bouche.

Normacol est disponible en une boîte avec 1 sachet de 375 g granulés (sachet composé de papier/faible densité polyéthylène). Normacol est également disponible en une boîte de 30 sachets de 10 g (sachets composés de papier/faible densité polyéthylènealuminiumfaible densité polyéthylène).

Titulaire de l' autorisation de mise sur le marché ::

N.V. ,, Haasrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee

Fabricant:

Norgine Pharma, 29 Rue Ethé Virton, 28100 Dreux, France

Numéros de l'autorisation de mise sur le marché ::

Normacol dans un boîte avec 1 sachet de 375 g: BE016484

Normacol dans un boîte avec 30 sachets de 10 g: BE498604

Mode de délivrance: Délivrance libre

Cette notice est destinée le dernier approuvé en 01/2021.