

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui de vartotojui

NORMACOL Granulės

Sterculia urens Roxb., guma

Perskaitykite atidžiai visą pakuotės lapelį prieš vartodami šį vaistą eina naudoti nes yra stovi svarbi informacija joje jums. u.

Naudokite šį vaistą visada tiksliai kaip šiame lapelyje aprašyta arba iš kaip jūsų gydytojas arba vaistininkas jums tai pasakė ..

- šį pakuotės lapelį .. prireiks jums jo vėliau vėl reikės ..
- Turi u dar klausimai? Susisiekiite su jūsų vaistininku.
- Ar jums pasireiškia vienas iš šalutinių poveikių nurodytų skyriuje 4 nurodyti? Arba pasireiškia jums kitas šalutinis poveikis kuris ne šiame šiame pakuotės lapelyje nurodytas? Susisiekiite su savo gydytoju arba vaistininku.
- Ar jūsų skundas po 4 dienų ne sumažėja, arba tampa jis netgi blogiau? Kreipkitės į savo gydytoją.

Turinys šio lapelio Kas yra

1. Normacol ir kam tampa jis naudojamas ?Kada
2. Kada ar galite Normacol ne naudoti ar turite būti papildomai atsargus su tuo būti?
3. Kaip vartoti jūs Normacol ?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti u Normacol?
6. Turinys iš pakuotės ir kita informacija

1. Kas yra Normacol ir kam yra jis naudojamas?

Normacol yra vienas vidurius laisvinantis vaistas (tūrio formuotojas). Tai yra nurodytas esant gydymui simptomų užkietėjimo , išskyrus užkietėjimą dėl mechaninės kilmės . mechaninis kilmė. Normacol yra nurodytas naudoti naudojimui suaugusiesiems suaugusieji paaugliams ir vaikams nuo 6 6 ..

jūsų skundas po 4 4 dienos ne mažiau, arba tampa jis netgi blogiau? Tada susisiekiite su savo gydytoju.

2. Kada negalite Normacol vartoti arba turite būti ypač atsargūs atsargiai su yra?

Kada galite Normacol negalite vartoti?

- Jūs esate alergiškas vienai iš medžiagų šiame vaistiniame preparate . Šis. Šios medžiagos galite u rasti in skyriuje 6 iš šio pakuotės lapelio
- esant susiaurėjimui ir arba užsikimšimui virškinimo sistemos
- esant labai stipriam vidurių užkietėjimui, fekalinis užkietėjimas vadinamas
- esant raumenų tonuso trūkumui žarnyno storosios žarnos (kolonatonijakolonatonijaesant
- pilvo skausmui be aiškios priežasties esant
- prie pykinimas ir vėmimas.

Kada turite būti ypač atsargūs su Normacol ?jei

- jį ilgai naudojate . Esant lėtiniam vidurių užkietėjimui reikės tepalas vyras pirmiausia bandyti šią būklę pataisyti per pritaikymą mitybos - ir- . jei.
- vartojate kai jūs iš kada jūsų planas linkęs eiti gulėti (ilsėtis miegoti). Normacol neturi būti vartojamas prieš einant miegoti tiesiogiai prieš miegą miegas eiti arba vienas gulima padėtis.
- jei jūs sunkumai turite su rijimu .vartojimas turi būti vengiamas kai yra su pacientai kurie sunkumų turi su rijimu ..
- jūs viduriuojate . Jei atvejis sunkios viduriavimo yra rizika egzistuoja de tikimybė ant vienas skystis- ir elektrolitų trūkumas. Šiuo atveju reikia jums pakankamai gerti . jei.
- mažai galite gerti gali gerti. Vartokite Normacol su didele kiekiu vandens arba kito skysčio . Taip padeda išvengti užsikimšimo virškinimo sistemos aukštyje . virškinimo sistema ar užkirsti kelią. Pakankamas skysčių vartojimas turi būti užtikrintas garantuotas.
- jūsų gydytojas jums pranešė kad jūs tam tikrų cukrų netoleruojate , susisieki su jūsų toleruoja, susisieki su jūsų gydytojas prieš jūs šį vaistą vartojate. Žr. taip pat skyrių "Normacol turi sacharozės ir natrio".
- tai yra galima kad išmatos išmatos šviesesnės iš spalvos yra kai jūs Normacol vartojate. Jūs neturite savęs dėl to toliau jokių rūpesčių dėl turėti daryti.

Susisieki su savo gydytoju arba vaistininku prieš vartodami šį vaistą ..

Normacol

nėra rekomenduojamas vaikams iki metų vaikams iki de amžius nuo 6 metų.

Ar vartojate jūs dar kitus vaistus?

Ar vartojate jūs be Normacol dar kitus vaistus, ar jūs kad trumpai atlikta arba ar ketinate jūs tai galbūt netrukus daryti? Pasakykite tai tada savo gydytojui arba vaistininkui.

J kà turite jūs atkreipti dėmesį su maistu ir gėrimais

Netinka taikoma netaikoma.

Nėštumas, žindymas ir vaisingumas

Ar esate nėščia, manote jūs nėščia būti ,norite nėščia tapti ar žindote jūs krūtimi? Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką prieš jūs šį vaistą vartojate.

Normacol mag naudojamas būti po patarimo iš gydytojo nėštumo metu nėštumo metu nėštumo metu nėštumo.

Normacol gali naudojamas būti žindymo laikotarpiu žindymo laikotarpiu.

Yra nėra duomenų apie Normacol poveikį vaisingumui žmonėms prieinama . Vairavimo.

naudojimo mašinų Normacol neturi iš mašinų

Normacol turi nėra poveikio vairavimo gebėjimui ir gebėjimui valdyti mašinas te valdyti.

Normacol sudėtyje yra sacharozės ir natrio

Jei jūsų gydytojas jums nurodė pranešta kad jūs tam tikrus cukrus netoleruojate , susisieki susavo gydytoju prieš jūs šį vaistą vartojate ..

2,5 g sacharozės per dozę skirta už suaugusieji (kiekis 1 paketėlyje po 10 g). Atsargumas yra būtinas pacientams sergantiems cukriniu diabetu.

Šis vaistas turi 41 mg natrio (svarbi sudėtinė dalis iš valgomosios druskos/stalo druskos) per dozė suaugusiems suaugusieji kiekiskiekis pakelyje po 10 g). Tai atitinka 2%

rekomenduojamos maksimalios dienos kiekio natrio kasdien kiekis natris organizme mityba už vieną suaugusįjį.

3. Kaip vartoti jūsų Normacol ?

Vartokite šį vaistą visada tiksliai kaip šiame šiame pakuotės lapelyje būklė arba kaip jūsų gydytojas arba vaistininkas jums tai pasakė .. jūs dėl teisingo naudojimo ? Tada susisieki su jūsų gydytoju arba vaistininku .. Jei yra nėra pagerėjimo po 4 4 ,kreipkitės į savo gydytoją vėl ..

Normacol Peroralinis

vartojimas : padėkite: padėkite granulės sausas ant liežuvio ir nurykite jas be kramtymo ar trupinimo nedelsiant užgerdami stikline didelio kiekio vandens arba stikline vėsaus gėrimo. Jūs galite jie taip pat ant minkšto maisto kaip jogurtas pabarstyti ir taip vartoti. Išgerkite tada nedelsiant daug vandens arba kitą kitą vėsų gėrimą. Jei vaikai gali galima rekomenduojamą dozę sumaišyti su uogiene arba leisti išbrinkti į truputį vandens arba kito skysčio . Išgerkite nedelsiant po vartojimo dar truputį vandens didelis stiklinė vandens arba vienas kitas skystis.

Paaugliai ir suaugusieji:

1 iki 2 arbatiniai šaukšteliai arba 1 pakelis, 2–3 kartus per dieną po valgio maitinimas

Naudojimas vaikams nuo 6 iki 12 metų:

½ iki 1 arbatinis šaukštelis arba ½ pakelio, 2 iki 3 kartus per dieną po valgio Veikloji

medžiaga veikloji Sterculia urens poveikis Roxb., guma pastebimas tarp 1 1 3 3 po vartojimo ,kaip tai yra atvejis su prie prie visus skaidulas.

Ar jūs per daug iš Normacol išgėrėte?

Kai jūs per daug iš Normacol išgėrėte , kreipkitės į, tada vartokite nedelsiant susisieki su jūsų gydytoju, vaistininku arba Apsinuodijimų kontrolės centru (070/245.245).

Preparatas gali ,sausai vartojamas ,sukelti žarnyno užsikimšimą iš žarnos sukelti. Todėl reikia žmogus per perdozavimą daug vandens gerti gerti. Jei jūs sunkus viduriavimas turite, yra rizika rizika dėl dehidratacijos en vienas elektrolitų trūkumas. Jūs turite tada pakankamai gerti ..

Normacol į vartoti ? Nevartokite dvigubos?

Vartokite nėra dvigubas dozė om vieną pamirštą dozę in pasiimti , bet vartokite paprastai savo kitą dozę tuo metu kaip tai buvo numatyta ..

Turi u dar kiti klausimai apie vartojimą šio šio vaisto? Tada susisieki su jūsų gydytoju arba vaistininku.

4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip kiekvienas vaistas gali taip pat šis vaistas šalutinis poveikis turėti. Ne visi patiria tai susiję su.

Imuninės sistemos sutrikimai:

- Alerginės reakcijos

Virškinimo sistemos sutrikimai:

- Išsipūtimas iš apatinės pilvo dalies
- Užkietėjimas iš stemplės
- Viduriavimas
- Pykinimas
- Pilvo skausmas
- Kartais pasireiškia dujų kaupimasis , kuris išnyksta pritaikius dozę . Atvejai.
- Atvejai nuo vidurių užkietėjimo arba obstrukcijos (vidurių užkietėjimas dėl kietų išmatų) ties žarnyno aukščiau taip pat aprašyti . Tai pasitaikodažniausiai apskritai apie bendras prieš nepakankamas skysčių vartojimas prie senyvo amžiaus pacientams arba prie esant buvimui iš susiaurėjimas susiaurėjimas aukštyje aukštis virškinimo sistemos virškinimo sistema.

Tai pranešti apie nepageidaujamas reakcijas

Ar jaučiate nepageidaujamas reakcijas, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taikoma taip pat ir nepageidaujamoms reakcijoms kurios nėra šiame šiame pakuotės lapelyje stovėti. U galite šalutinius poveikius taip pat pranešti per:

Federalinė agentūra vaistams ir sveikatos produktams Skyrius
Vigilancija Galileelaan, 5/03

Pašto dėžutė 97 1210 BRIUSELIS
B-1000 BRIUSELIS Madou Svetainė:

Svetainė: www.eenbijwerkingmelden.be
e-mail: adr@fagg.be

Pranešdami nepageidaujamas reakcijas , padedatems gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą . apie saugumas iš šis vaistas.

5. Kaip laikyti jūs Normacol?

Laikyti matymo ir pasiekiamumo vaikams atokiau ..

su 1 maišeliu iš 375 g: nuo 375 g:

Laikyti žemiau 25 °C ir originalioje pakuotėje ..

atsargiai uždarytą laikyti apsaugai nuo drėgmės apsauga Tinkamumo laikas po.

Tinkamumo laikas ne atidarymas: 3 mėnesiai.

Dėžutė su 30 pakelių po 10 g:

Laikyti žemiau 25 °C.

Laikyti originalioje pakuotėje apsaugai nuo drėgmės . Naudojimas.

Naudojimas šis vaistas ne daugiau po de galiojimo datą. Ją rasite ant dėžutės ir de maišelių po "EXP". Ten nurodytas mėnuo ir en vieneri metai. De paskutinė diena to mėnesio yra galiojimo pabaigos.

Neleiskite vaistų per kriauklę ar tualetą ir en išmeskite juos ne į šiukšliadėžę. Klauskite savo vaistininko ką daryti su vaistais turite daryti kurių ne be naudojate. Jei vaistus į teisingas būdas pašalina turi jie vienas teisingas būdas sunaikinti ir nepatenka jie ne į aplinką patenka.

6. Turinys pakuotės pakuotės en kita informacija

Kokios medžiagos yra preparate Normacol?

- Veiklioji medžiaga preparate Normacol yra: Sterculia urens Roxb „guma“ (62 g per 100 g granulių granulės)
- De kitos medžiagos in Normacol yra: Natrio vandenilio karbonatas, talkas, titano dioksidas (E171), parafinas (kietas), vanilinas, sacharozė (žr. skyrių 2 “Normacol turi sacharozės en natris”).

Kaip atrodo Normacol ir kas yra pakuotėje ? Normacol Granulės

yra mažos baltos , neregulios formos grūdėliai suformuota granulės kad vartoti per burną ..

yra parduodamas dėžutėje su 1 maišeliu po 375 g granulių (maišelis susidedantis iš esamas iš popierius/mažas tankis polietilenas). Normacol yra taip pat prieinamas į dėžutėje su 30 maišelių po 10 g (maišeliais sudaryti iš popieriaus/ mažotankio tankis polietilenas aliuminis žemas tankis polietilenas).

Turėtojas leidimo prekiauti rinkoje : Norgine N.V.:

Norgine N.V., Haasrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee

Gamintojas:

Norgine Pharma, 29 Rue Ethé Virton, 28100 Dreux, Prancūzija

Leidimo numeriai prekybai rinkoje suteikimo ::

Normacol in vienas dėžutė su 1 pakelis po 375 g: BE016484

Normacol in vienas dėžutė su 30 pakeliai po 10 g: BE498604

Išdavimo būdas: Laisvas išdavimas

Šis pakuotės lapelis yra skirtas tas paskutinį kartą patvirtinta 01/2021.