

Pakningsvedlegg: informasjon for brukeren NORMACOL

Granulat Sterculia urens

Roxb „gummi Les

nøye hele pakningsvedlegget før du tar denne medisinen går bruke for det står viktig informasjon i for deg.

Bruk dette legemidlet alltid nøyaktig som i denne pakningsvedlegget beskrevet eller slik som din lege eller apotek deg det har fortalt.

- Oppbevar denne pakningsvedlegget. Kanskje har du det senere igjen trenger.
- Har du enda spørsmål? Ta da kontakt med din apotek.
- Får du plager av én av de bivirkningene som i avsnitt 4 står? Eller får du en bivirkning som ikke i denne pakningsvedlegg står? Ta kontakt med din lege eller apotek.
- Blir din plage etter 4 dager ikke mindre, eller blir han til og med verre? Ta da kontakt med din lege.

Innhold av denne pakningsvedlegget

1. Hva er Normacol og hva blir det bruktil
2. Når kan du Normacol ikke bruke eller må du være ekstra forsiktig med være?
3. Hvordan tar du Normacol inn?
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan oppbevarer u Normacol?
6. Innhold av emballasjen og annen informasjon

1. Hva er Normacol og hva brukes det til?

Normacol er en avføringsmiddel (bulkdannende). Det er indikert ved behandling av symptomene på forstoppelse forstoppelseunntatt forstoppelse av mekanisk opprinnelse .. Normacol er indikert for bruk hos voksne, ungdom og barn fra 6 år.

Blir ditt symptom etter 4 dagen ikke mindre, eller blir han til og med verre? Ta da kontakt med din lege.

2. Når kan du Normacol ikke bruke eller må du være ekstra forsiktig med er?

Når kan du Normacol ikke bruke?

- Du er allergisk for én av de stoffene i denne medisinen. Disse stoffer kan du finne i rubrikk 6 i denne pakningsvedlegget
- ved forsnerving ogeller blokkering av fordøyelsessystemet
- ved veldig alvorlig forstoppelse, fekal obstruksjon kalt
- ved mangel på muskeltonus av tykktarmen (colonatonicolonatonic)
- magesmerter uten tydelig årsak ved
- ved kvalme og oppkast.

Når må du være ekstra forsiktig med Normacol ?hvis

- du bruker det langvarig . Ved kroniskforstoppelse vil forstoppelse skal men først prøve denne tilstand å avhjelpe ved justering av kostholds- og livsstilsvaner.
- hvis du tar det inntar når du fra plan bøyd om til gå legge seg (hvile/sove). Normacol skal ikke tas til rett før du sover sove gå eller i en liggende stilling.

- hvis du vanskeligheter har med å svelge. Inntaket bør unngås å bli ved hos pasienter som vanskeligheter har med å svelge.
- hvis du diaré har. I tilfelle av alvorlig diaré er det sjans på en væske- og elektrolyttmangel. I dette tilfellet bør du drikke tilstrekkelig ..
- du kan drikke lite drikke. Ta Normacol med en stor mengde vann eller annen væske. Dette tjener til å forhindre en blokkering i fordøyelsessystemet . forebygge. Tilstrekkelig væskeinntak må å bli sikret.
- hvis din lege har har informert at du visse sukkerarter ikke tåler, ta kontakt med din lege før du dette legemidlet tar. Se også avsnitt "Normacol inneholder sukrose og natrium".
- det er mulig at de avføring lysere av farge er når du Normacol bruker. Du trenger ikke bekymre deg videre ingen bekymringer for å.

Kontakt din lege eller apotek før du dette legemidlet tar.

Barn

Normacol er ikke anbefalt for barn under de alder fra 6 år.

Bruker du andre andre legemidler?

Bruker du i tillegg til Normacol andre andre legemidler, har du det kort siden gjort eller skal du dette kanskje snart gjøre? Fortell det da legen eller apotekeren.

Hva må du være oppmerksom med mat og drikke

Ikke av anvendelse.

Graviditet, amming og fruktbarhet

Er du gravid, tror du gravid å være, ønsker du gravid bli eller gir du amming? Ta da kontakt med din lege eller apotek før du dette legemiddel bruker.

Normacol mag brukes bli etter råd fra en lege under svangerskapet graviditet.

kan brukes bli under amming perioden ammingstid.

Er er ingen data om effekten av Normacol på fruktbarhet hos mennesker tilgjengelig.

Kjøreevne og bruk av maskiner

Normacol har ingen påvirkning på kjøreferdigheter og på evnen til å betjene maskiner å betjene.

Normacol inneholder sukrose og natrium

Hvis din lege har gitt informert at du visse sukkerarter ikke tåler, ta da kontakt med din lege før du dette legemidlet tar.

Inneholder 2,5 g sukrose per dose for voksne (mengde i 1 pose på 10 g). Forsiktighet er nødvendig hos pasienter med diabetes mellitus.

Dette legemidlet inneholder 41 mg natrium (en viktig bestanddel av bordsaltbordsalt) per dose for voksne (mengde i 1 pose av 10 g). Dette tilsvarer samsvarer med 2% av den anbefalte maksimale daglige mengden natrium i ernæring for en voksen.

3. Hvordan tar du Normacol inn?

Bruk dette legemidlet alltid nøyaktig som i denne pakningsvedlegget står eller slik som din lege eller apotek du det har fortalt. Er du i tvil om riktig bruk? Ta da kontakt med din lege eller apotek.. Hvis det ikke bedring oppstår etter 4 dager, kontakt da din lege igjen.

Bruksanvisning Normacol

Oral bruk: legg granulater på tungen og svelg dem uten å tygge eller knuse umiddelbart ved å drikke et stort mengde vann eller en kald drikk. Du kan de også på myk mat som yoghurt strø og så ta. Drikk deretter umiddelbart mye vann eller en annen kald drikk. Ved barn kan man den anbefalte dose blande med syltetøy eller la svulle i en liten vann eller annen væske. Drikk umiddelbart etter inntak enda en stor glass vann eller en annen væske.

Ungdom og voksne:

1 til 2 teskjeer eller 1 pose, 2 til 3 ganger per dag etter måltidene måltider

Bruk hos barn fra 6 til 12 år:

½ til 1 teskje eller ½ pose, 2 til 3 ganger per dag etter måltidene Det

aktive virksomme effekt av Sterculia urens Roxb., gummi blir observert mellom 1 og 3 dager etter inntak, slik som det tilfelle er hos alle fibre.

Har du for mye av Normacol inntatt?

Når du for mye av Normacol har inntatt, kontakt da umiddelbart kontakt med din lege, apotek eller Giftinformasjonen (070/245.245).

Preparatet kan ,tørt inntas ,en blokkering av tarmene forårsake forårsake. Derfor bør man ved overdosering mye vann å drikke. Hvis du alvorlig diaré har, finnes det risiko for dehydrering en elektrolyttmangel. U bør da tilstrekkelig å drikke.

Har du glemt Normacol å ta ?Ta

ikke dobbel dobbelt dose om en glemt dose i å ta igjen, men ta bare din neste dose på tidspunktet som dette var forutsatt.

Har du enda andre spørsmål om bruk av dette legemidlet? Ta kontakt med din lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger

Som ethvert legemiddel kan også dette legemiddel bivirkninger ha. Ikke alle får det med å gjøre.

Forstyrrelser i immunsystemet:

- Allergiske reaksjoner

Sykdommer i mage-tarmkanalen:

- Utvide av underlivet
- Forstoppelse av spiserøret
- Diaré
- Kvalme
- Magesmerter
- Noen ganger oppstår luft i magen , som forsvinner ved justering av dosen.

- Tilfeller av forstoppelse eller obstruksjon (forstoppelse på grunn av herdet avføring) på nivå av tarmen er også beskrevet . Dette forekommer generelt sett generell for ved utilstrekkelig væskeinntak hos eldre pasienter eller ved til eksistensen av en forsnævring på nivå av fordøyelsessystemet.

Det rapporteres av bivirkninger

Får du bivirkninger , ta kontakt med din lege eller apotek . Dette gjelder også for bivirkninger som ikke i denne pakningsvedlegget pakningsvedlegg står. Du kan bivirkninger også rapportere via:

Føderalt byrå for legemidler og helseprodukter
Avdeling Vigilans

Galileilaan, 5/03
1210 BRUSSEL

Postboks 97
B-1000 BRUSSEL Madou

Nettsted: www.eenbijwerkingmelden.be
e-mail: adr@fagg.be

Ved bivirkninger å rapportere, hjelper du oss med mer informasjon å få om sikkerheten til dette legemiddel.

5. Hvordan oppbevarer du Normacol?

Utenfor synet og rekkevidde av barn holde.

Eske med 1 pose på 375 g:

Oppbevares under 25 °C og i original emballasjen.

Esken må holdes nøye lukket for beskyttelse mot fuktighet ..
etter na opening: 3 måneder.

Eske med 30 poser à 10 g:

Oppbevares under 25 °C.

Oppbevares i den opprinnelige emballasjen for beskyttelse mot fuktighet.

Bruk dette legemiddel ikke mer etter de siste holdbarhetsdato. Den finner du på esken og posene etter "EXP". Der står en måned måned en en år. Den siste dag i den måneden er utløpsdatoen. utløpsdatoen utløpsdatoen.

Skyll legemidler ikke i vasken eller toalettet og kast dem ikke i søppelbøtta. Spør din apotek hva du skal gjøre med legemidler må gjøre som du ikke lenger bruker. Hvis du legemidler på riktig måte fjernes bli de på en riktig måte destruert og kommer de ikke i miljøet inn.

6. Innhold av emballasjen en andre informasjon

Hvilke stoffer er i Normacol ?Den

- virksomme stoffet i Normacol er: Sterculia urens Roxb .,gummi . (62 g per 100 ggranulat granulat)

- De andre stoffene i Normacol er: Natriumhydrogenkarbonat, talkum, titandioksid (E171), parafin (fast), vanillin, sukrose (se avsnitt 2 "Normacol inneholder sukrose en natrium").

Hvordan ser Normacol ut og hva inneholder en pakke?

Normacol Granulat er små hvite, uregelmessig formede korn om i å ta via munnen.

Normacol er tilgjengelig i en eske med 1 pose på 375 g granulat (pose bestående av papir/lav tetthet polyetylen). Normacol er også tilgjengelig i en eske med 30 poser à 10 g (poser bestående av papir/lav tetthet polyetylenaluminiumlav tetthet polyetylen).

Innehaver av tillatelsen for markedsføring av ::

N.V. ,, Haasrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee

Produsent:

Norgine Pharma, 29 Rue Ethé Virton, 28100 Dreux, Frankrike

Numre på tillatelse for markedsføring av produktet:

Normacol i en eske med 1 pose på 375 g: BE016484

Normacol i en eske med 30 poser på 10 g: BE498604

Utleveringsmåte: Fri utlevering

Denne pakningsvedlegget er for den sist godkjent i 01/2021.