

## Ulotka: informacja dla użytkownika NORMACOL

Granulat Sterculia urens

Roxb „guma Przeczytaj

dokładnie całą ulotkę zanim użyjesz tego leku lekarstwo idzie używać ponieważ stoi ważne informacje w dla ciebie.

Używaj tego leku zawsze dokładnie jak w tej ulotce opisane lub jak twój lekarz lub farmaceuta ci to powiedział ..

- tę ulotkę .. będziesz go potrzebować później ponownie . Czy.
- Ma u jeszcze pytania? Skontaktuj się z swoim farmaceutą.
- Czy masz problemy z jednym z działań niepożądanych wymienionych w sekcji 4 występują? Lub czy masz jakieś działanie niepożądane które nie w tej ulotce wymienione? Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą.
- Czy twoja dolegliwość po 4 dniach nie ustępuje, lub jest on nawet gorzej? Skontaktuj się z swoim lekarzem.

Zawartość tej ulotki Co to jest

1. Normacol i w jakim celu jest stosowany ? Kiedy?
2. Kiedy czy możesz Normacol nie używać lub musisz być szczególnie ostrożny z tym być?
3. Jak przyjmować ty Normacol ?
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać u Normacol?
6. Zawartość opakowania opakowania i pozostałe informacje

1. Co to jest Normacol i do czego jest używany ?Normacol

to jest jeden środek przeczyszczający (środek pęczniący). Jest wskazany w leczeniu objawów zaparcia , z wyjątkiem zaparciapochodzenia mechanicznego zaparcie z mechaniczne pochodzenie. Normacol jest wskazany do użycia u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 lat.

Czy Twoja dolegliwość po 4 dni nie mniej, lub staje się on nawet gorszy? Skontaktuj się z swoim lekarzem.

2. Kiedy nie wolno Normacol używać lub musisz być szczególnie ostrożny ostrożnie ze są?

Kiedy nie wolno Normacol nie stosować?

- Jesteś uczulony na jeden z składników w tym leku. Ten substancje możesz u znaleźć w sekcji 6 tej ulotki informacyjnej
- przy zwiężeniu i/of zablokowaniu układu pokarmowego
- przy bardzo ciężkim zaparciu, kałowe zatrzymanie nazywane
- przy braku napięcia mięśniowego jelita grubego ( atonii okrężnicy )przybólu brzucha
- bez wyraźnej przyczyny przy przyczyna
- przy nudności i wymioty.

Kiedy musisz być szczególnie ostrożny z Normacol ?jeśli

- używasz go długotrwale . Przy przewlekłych zaparciach będzie zaparcie będzie mężczyźni najpierw próbować ten stan do zaradzić przez dostosowanie diety żywieniowych- i nawyków życiowych.
- jeśli przyjmujesz przyjmować kiedy jesteś plan zamierzasz iść położyć się ( odpoczywać spać). Normacol nie powinien być przyjmowany bezpośrednio przed snem płaski dla to sen iść lub w jeden leżącej pozycji.
- jeśli masz trudności z przy połykaniu . Przyjmowanie powinno być unikane w przypadku gdy przy pacjenci którzy trudności mają z przełykaniem ..
- masz biegunkę . W przypadkach ciężkiej biegunki istnieje ryzyko biegunka istnieje de szansa na jeden płyn- i niedobór elektrolitów. W tym przypadku należy pić wystarczająco aby pić.
- jeśli masz mało możliwości pić. Przyjmuj Normacol z dużą ilością wody lub innego płynu . To służy do zapobiegania zatorom w przewodzie pokarmowym układ trawienny to zapobieganie. Wystarczające spożycie płynów musi być zagwarantowane gwarantowany.
- twój lekarz ci powiedział że nie tolerujesz pewnych cukrów , skontaktuj się z twoim nie toleruje, skontaktuj się z twój lekarz zanim Pan/Pani ten lek zażyje. Zobacz również sekcja „Normacol zawiera sacharozę i sól”.
- to jest możliwe że de stolec jaśniejszy od koloru jest kiedy używasz Normacol stosujesz. Nie musisz się tym dalej martwić żadnych o to obaw mieć.

Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem tego leku ..

Normacol

nie jest zalecany dla dzieci poniżej dzieci lat de wiek od 6 lat.

Czy używasz Pan/Pani jeszcze inne leki?

Czy używasz Pan/Pani oprócz Normacol jeszcze inne leki, czy Pan/Pani że krótko temu zrobione lub zamierza Pan/Pani to może wkrótce zrobić? Powiedz to wtedy swojemu lekarzowi lub farmaceutce.

Na co musisz ty uważać z jedzeniem i pić

nie dotyczy zastosowanie.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Czy jesteś w ciąży, myślisz ty w ciąży być są, chcesz w ciąży zajść lub karmisz piersią ?

Skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą zanim użyjesz tego leku lekarstwo używany.

Normacol mag używany być po konsultacji z lekarzem podczas ciąży . Normacol.

używany być podczas okresu karmienia piersią de okres karmienia piersią.

Nie ma danych dotyczących wpływu Normacol na płodność u ludzi dostępnych.

Zdolność prowadzenia pojazdów i używanie maszyn Normacol

nie wpływa brak wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i na zdolność obsługi maszyn do obsługiwać.

Normacol zawiera sacharozę i sól

Jeśli twój lekarz cię zalecił poinformowano że Pan/Pani pewnych cukrów nie toleruje, skontaktuj się z swoim lekarzem zanim Pan/Pani ten lek zażyje.

Zawiera 2,5 g sacharozy na dawkę dla dorośli (ilość w 1 saszetce 10 g). Ostrożność jest wymagana u pacjentów z cukrzycą.

Ten lek zawiera 41 mg sodu (ważny składnik preparatu z sól kuchennasól stołowa) na dawkę dla dorosłych (ilość w 1 saszetce o masie 10 g). To odpowiada 2% zalecanej maksymalnej dziennie ilości sodu ilość sód w odżywianie dla dorosłego dorosłego.

### 3. Jak przyjmować Pan/Pani Normacol ?

Stosuj ten lek zawsze dokładnie tak jak tej ulotce stan lub jak twój lekarz lub farmaceuta ci to powiedział .. prawidłowego użycia ? Skontaktuj się z twoimlekarzem lub farmaceutą .  
farmaceuta. Jeśli nie nastąpi poprawa po 4 4 ,skonsultuj się ze swoim lekarzem ponownie.

#### Instrukcja użycia Normacol

Do stosowania doustnego : umieść: połóż granulki suchy na języku i połknij je bez żucia lub miażdżenia natychmiast popijając szklanką dużą ilością wody lub szklanką chłodnego napoju. Możesz możesz na też na miękkim pokarmie takim jak jogurt posypać i tak przyjąć. Wypij następnie natychmiast dużo wody lub inny chłodny napój. W przypadku napój. W przypadku dzieci można można zalecaną dawkę wymieszać z dżemem lub pozostawić do napęcznienia w trochę mało wody lub innego płynu. Wypij natychmiast po przyjęciu jeszcze trochę duży szklanka wody lub jedna inna ciecz.

#### Nastolatki i dorośli:

1 do 2 łyżeczek lub 1 saszetka, 2 do 3 razy dziennie po posiłkach de posiłki

#### Użycie u dzieci w wieku 6 do 12 lat:

½ do 1 łyżeczki lub ½ saszetki, 2 do 3 razy dziennie po posiłkach de posiłkach

Substancja czynna efekt Sterculia urens Roxb., guma jest obserwowany między 1 a 3 dniami po spożyciu, tak jak to jest przypadek w przy wszystkie włókna.

#### Czy Pan/Pani za dużo z Normacol zażył(a)?

Kiedy Pan/Pani za dużo z Normacol zażył(a) , proszęskontaktować się natychmiast skontaktuj się z swoim lekarzem, farmaceutą lub Centrum Zatruc (070/245.245).

Preparat może ,sucho przyjęty ,spowodować zablokowanie jelit prowadzić do przewodu pokarmowego zaparcia. Dlatego należy się przy przedawkowaniu dużo wody pić pić. Jeśli masz ciężką biegunkę masz, istnieje ryzyko odwodnienia odwodnienia en een niedobór elektrolitów. U powinien wtedy wystarczająco pić pić.

#### Czy zapomniałeś zapomnieć Normacol w wziąć brać?

Nie bierz żadnych podwójnych dawka om een zapomniana dawka in te halen, maar neem po prostu swoją następną dawkę w momencie jak to było przewidziane.

Czy u jeszcze inne pytania dotyczące stosowania tego leku ? Skontaktuj się zswim lekarzem lub farmaceutą ..

### 4. działania niepożądane Jak

każdy lek lekarstwo może również ten lek działania niepożądane mieć. Nie każdy je doświadcza . Zaburzenia układu odpornościowego.

Reakcje alergiczne:

- Alergiczne reakcje

Choroby układu pokarmowego:

- Wzdęcie z podbrzusza
- Zaparcie z przetyku
- Biegunka
- Nudności
- Ból brzucha
- Czasami występuje wzdęcia , które znikają przy dostosowaniu dawki ..
- Przypadki z zaparcia lub zatrzymania (zaparcia przez utwardzony kał) na wysokości jelita są również opisane . Towystępuje zazwyczaj ogólnie ogólny dla przy niewystarczającym spożyciu płynów u starszych pacjentów lub przy istnieniu zwężenia na poziomie układu trawiennego . To układ trawienny.

To zgłosić z działania niepożądane

Czy masz problemy z działaniami niepożądanymi, skontaktuj się z swoim lekarzem lub farmaceutą. To dotyczy również dla działań niepożądanych które nie w tej ulotce stać. U mozesz działania niepożądane również zgłosić przez:

Federalna agencja ds. leków i produktów zdrowotnych  
Dział Nadzoru

Galileelaan, 5/03  
1210 BRUKSELA

Skr. poczt. 97  
B-1000 BRUKSELA Madou

Strona internetowa: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)  
e-mail: [adr@fagg.be](mailto:adr@fagg.be)

Przez działania niepożądane zgłaszać ,pomogasz nam uzyskać więcej informacji o bezpieczeństwie tego produktu . bezpieczeństwo z to lek.

5. Jak przechowywać Pan/Pani Normacol?

Poza zasięgiem i dostępem dzieci trzymać ..

z 1 saszetką o masie 375 g: z 375 g:

Przechowywać poniżej 25 °C i w oryginalnym opakowaniu.

Pudełko dokładnie zamknięte trzymać w celu ochrony przed wilgocią ..

po na opening: 3 miesiące.

Pudełko z 30 saszetkami po 10 g:

Przechowywać poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Użycie ten lek nie dłużej po de ostatecznej dacie ważności. Die znajduje się na pudełku i de saszetkach po „EXP”. Tam znajduje się miesiąc miesiąc en jeden rok. Ostatni dzień tego miesiąca to ostateczna data ważności data ważności.

leków do zlewu ani do toalety i nie wyrzuć je do kosza na śmieci. Zapytaj swojego farmaceutę co zrobić z lekami których nie już używasz. Jeśli leki do właściwy sposób usuwa być one w jednym właściwy sposób zniszczone i nie trafiają one do środowiska dostać się.

## 6. Zawartość opakowania en inne informacje

Jakie substancje są w Normacol?

- Substancja czynna w Normacol to: Sterculia urens Roxb „guma” (62 g na 100 g granulat)
- De inne substancje w Normacol to: wodorowęglan sodu, talk, dwutlenek tytanu (E171), parafina (stała), wanilina, sacharoza (patrz punkt 2 „Normacol zawiera sacharozę en natrium”).

Jak wygląda Normacol i co zawiera opakowanie ? Normacol Granulat to małe białe , nieregularnie uformowane ziarna uformowane granulki aby w brać przyjmować przez usta.

Normacol jest dostępny w pudełku z 1 saszetką o masie 375 g granulat ( saszetka składająca się z papier/niski gęstość polietylen). Normacol jest również dostępny w pudełku z 30 saszetkami po 10 g (saszetki składające się z papier/niskiej gęstość polietylenaluminiumniska gęstość polietylen).

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu : Norgine: , N.V., Haasrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee

Producent:

Norgine Pharma, 29 Rue Ethé Virton, 28100 Dreux, Francja

Numery zezwolenia na wprowadzenie do obrotu ::

Normacol w jedno pudełko z 1 saszetka po 375 g: BE016484

Normacol w jedno pudełko z 30 saszetek po 10 g: BE498604

Sposób wydawania: Wolna dystrybucja

Ta ulotka jest dla to ostatnio zatwierdzony w 01/2021.