

Packungsbeilage: Information für den Anwender

Nystatin Orifarm 100000 I.E./ml orale Suspension

Nystatin

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, da sie wichtige Informationen für Sie enthält.

- Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie sie später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das Pflegepersonal.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es könnte ihnen schaden, auch wenn deren Krankheitszeichen dieselben sind wie Ihre.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das Pflegepersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4. Was in dieser Packungsbeilage steht

Was Nystatin

1. Orifarm Orifarm Was Sie vor der Einnahme von Nystatin
2. beachten müssen Orifarm
3. Wie man Nystatin einnimmt Orifarm
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie man Nystatin aufbewahrt Orifarm
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was Nystatin Orifarm ist und wofür es angewendet wird

Nystatin Orifarm gehört zur Gruppe der Antimykotika. Es enthält den Wirkstoff Nystatin. Es wirkt lokal auf die Schleimhaut und wird nicht in den Körper aufgenommen.

Nystatin Orifarm wird zur Behandlung von Pilzinfektionen im Mund und Darm eingesetzt.

2. Was Sie vor der Einnahme von Nystatin Orifarm

Nehmen Sie Nystatin Orifarm

- nicht ein, wenn Sie allergisch gegen Nystatin oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind (aufgeführt in Abschnitt 6).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Ihrer Krankenschwester, bevor Sie Nystatin Orifarm

einnehmen. Orifarm

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich eingenommen haben oder möglicherweise einnehmen werden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fruchtbarkeit

Schwangerschaft, Stillzeit und Fruchtbarkeit

Schwangerschaft

Schwangerschaft Potenzial potenzielle Risiko für den.

Stillen

Stillzeit Es ist nicht bekannt, ob Orifarm geht in die Muttermilch über. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie während der Einnahme dieses Medikaments stillen.

Fahren und Bedienen von Maschinen

Es ist keine Wirkung dieses Medikaments auf die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu führen oder Maschinen zu bedienen, bekannt.

Nystatin Orifarm enthält enthält Methyl Parahydroxybenzoat und Natrium-Methyl Parahydroxybenzoat kann allergische Reaktionen hervorrufen (möglicherweise verzögert). Dieses Arzneimittel enthält 1,2 mg Natrium pro ml orale Suspension, was weniger als 23 mg pro Dosis entspricht, d.h. im Wesentlichen „natriumfrei“.

3. Wie ist Nystatin Orifarm

Dieses Arzneimittel immer genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers einnehmen. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Ihr Arzt oder Zahnarzt entscheidet über die Dosis und sie wird individualisiert für Sie.

Die Flasche sollte vor Gebrauch gut geschüttelt werden.

Pilzinfektion der Mundhöhle: Die empfohlene Dosis für Erwachsene beträgt 1 ml, 4-mal täglich. Nehmen Sie die Suspension vorzugsweise nach den Mahlzeiten ein und behalten Sie sie so lange wie möglich im Mund, bevor Sie sie schlucken.

Anwendung bei Kindern, Säuglingen und Neugeborenen

Die empfohlene Dosis für Kinder (über 2 Jahre), Säuglinge (von 1 Monat bis 2 Jahre) und Neugeborene (von der Geburt bis 1 Monat) beträgt 1 ml, 4-mal täglich. Die Suspension sollte vorzugsweise nach den Mahlzeiten eingenommen und so lange wie möglich im Mund behalten werden, bevor sie geschluckt wird. Bei Säuglingen kann die Suspension in Tropfen verabreicht oder mit etwas Wasser verdünnt und in den Mund gestrichen werden.

Pilzinfektion des Darms: Die empfohlene Dosis für Erwachsene beträgt 5 ml 3-mal täglich. Schlucken Sie die Suspension direkt. Um ein Wiederauftreten der Infektion zu vermeiden, sollten Sie die Behandlung 2-3 Tage nach dem Verschwinden aller Infektionszeichen fortsetzen.

Anwendung bei Kindern und Säuglingen

Die empfohlene Dosis für Kinder (über 2 Jahre) und Säuglinge (1 Monat bis 2 Jahre) beträgt 1 ml, 4-mal täglich. Schlucken Sie die Suspension direkt. Um ein Wiederauftreten der Infektion zu vermeiden, sollten Sie die Behandlung 2-3 Tage nach dem Verschwinden aller Infektionszeichen fortsetzen.

Wenn Sie mehr Nystatin Orifarm eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel eingenommen haben oder ein Kind das Arzneimittel versehentlich eingenommen hat, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder die Notaufnahme, um das Risiko einzuschätzen und Rat zu erhalten.

Wenn Sie die Einnahme von Nystatin Orifarm vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, um eine vergessene Dosis auszugleichen.

4. Mögliche Nebenwirkungen

Mögliche Nebenwirkungen

Beenden Sie die Einnahme von Nystatin Orifarm und informieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie eines dieser Symptome entwickeln:

Schwere Haut- und Schleimhautveränderungen (sogenanntes Stevens-Johnson-Syndrom).

Dies ist eine seltene Nebenwirkung und kann bis zu 1 von 1000 Personen betreffen. Überempfindlichkeitsreaktionen und lokale Hautschwellungen (Angioödem), eine Reaktion, bei der Gesicht und Hals erheblich anschwellen können.

Überempfindlichkeitsreaktionen auf dieses Medikament sind sehr seltene Nebenwirkungen (können bis zu 1 von 10.000 Personen betreffen) oder unbekannt (Häufigkeit kann nicht aus den verfügbaren Daten abgeschätzt werden).

Ein roter, schuppiger, weit verbreiteter Ausschlag mit Beulen unter der Haut und Blasen, begleitet von Fieber. Die Symptome treten normalerweise zu Beginn der Behandlung auf (akute generalisiert exanthematische Pustulose). Die Häufigkeit kann nicht aus den verfügbaren Daten abgeschätzt werden.

Gelegentlich: kann bis zu 1 von 100 Personen betreffen
Allergische Hautreaktionen.

Hohe Dosen können Magenbeschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Krankenpfleger. Dies schließt alle möglichen Nebenwirkungen, die in dieser Packungsbeilage nicht aufgeführt sind. Sie können auch melden Nebenwirkungen direkt über das nationale Meldesystem gemäß Anhang V melden. Durch das Melden von Nebenwirkungen können Sie dazu beitragen, mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels bereitzustellen.

5. Orifarm aufzubewahren

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Ungeöffnete Flasche: Unter 25°C lagern.

Geöffnete Flasche: Unter 25°C bis zu 2 Monate lagern.

Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht nach dem Verfallsdatum, das auf dem Etikett nach EXP angegeben ist. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht über Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie Sie Arzneimittel entsorgen können, die Sie nicht mehr verwenden. Diese Maßnahmen helfen, die Umwelt zu schützen.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Nystatin Orifarm enthält

- Der Wirkstoff ist Nystatin. 1 ml Suspension enthält 100.000 Internationale Einheiten (IE) Nystatin.
- Die Weitere Bestandteile sind:
 - Xylitol
 - Carmellose Natrium
 - Methyl Parahydroxybenzoat (E218)
 - Pfefferminzöl
 - gereinigtes Wassergereinigtes Wasser
 - Natriumhydroxid (zur pH-Wert-Einstellung)Natriumhydroxid (zur pH-Wert-Einstellung)
 - Salzsäure (zur pH-Wert-Einstellung).

Die orale Suspension ist mit Xylitol gesüßt.

Wie Nystatin Orifarm aussieht und Inhalt der Packung
Nystatin Orifarm orale Suspension ist gelb und minzig aromatisiert und kommt in 100 ml Braunglasflaschen.

Marketing Autorisierungsinhaber und Hersteller
[Wird national vervollständigt]

Dieses Arzneimittel ist zugelassen in den Mitgliedstaaten des EWR unter den folgenden Namen:

Schweden, Island, Finnland, Dänemark und Norwegen: Nystatin Orifarm

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet am 16.04.2025