

Prospecto: Información para el usuario

Nistatina Orifarm 100000 UI/ml suspensión oral

nistatina

Lea todo este prospecto detenidamente antes de empezar a tomarse medicamento porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto. Puede que necesite leerlo de nuevo.
- Si tiene alguna pregunta adicional, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
- Este medicamento se le ha recetado solo a usted. No lo pase a otras personas. Puede perjudicarles, incluso si sus síntomas son los mismos que los suyos.
- Si experimenta algún efecto secundario, hable con su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido de este prospecto

1. Qué es Nistatina Orifarm y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de tomar Nistatina Orifarm
3. Cómo tomar Nystatin Orifarm
4. Posibles efectos secundarios
5. Cómo almacenar Nystatin Orifarm
6. Contenido del paquete y otra información

1. Qué es Nystatin Orifarm y para qué se utiliza

Nystatin Orifarm pertenece al grupo de medicamentos antifúngicos. Contiene el ingrediente activo nistatina. Tiene un efecto local en la mucosa y no se absorbe en el cuerpo.

Nystatin Orifarm se utiliza para tratar infecciones por hongos en la boca y los intestinos.

2. Lo que necesita saber antes de tomar Nystatin Orifarm

No tome Nystatin Orifarm

- si es alérgico a la nistatina o a cualquiera de los otros ingredientes de este medicamento (enumerados en la sección 6).

Advertencias y precauciones

Hable con su médico, farmacéutico o enfermero antes de tomar Nystatin Orifarm

Otros medicamentos y Nystatin Orifarm

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tomar otros medicamentos.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene previsto tener un bebé, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Embarazo

Debe tomar este medicamento solo si su médico considera que los beneficios para usted superan el potencial riesgo para el feto.

Lactancia

No se sabe si Nystatin Orifarm pasa a la leche materna. Consulte a su médico antes de amamantar mientras toma este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No se conoce ningún efecto de este medicamento sobre la capacidad para conducir o manejar maquinaria.

Nistatina Orifarm contiene metil parahidroxibenzoato y sodio Metil parahidroxibenzoato puede causar reacciones alérgicas (posiblemente retardadas). Este producto medicinal contiene 1.2 mg de sodio por ml de suspensión oral, lo que es menos de 23 mg por dosis, es decir, esencialmente "libre de sodio".

3. Cómo tomar Nistatina Orifarm

Tome siempre este medicamento exactamente como su médico o farmacéutico le haya indicado. Consulte a su médico o farmacéutico si no está seguro.

Su médico o dentista decide la dosis y será individualizada para ti.

El frasco debe agitarse bien antes de usar.

Infeción fúngica de la cavidad oral: La dosis recomendada para adultos es de 1 ml, 4 veces al día. Tome la suspensión preferiblemente después de las comidas y manténgala en la boca el mayor tiempo posible antes de tragar.

Uso en niños, lactantes y neonatos

La dosis recomendada para niños (mayores de 2 años), lactantes (de 1 mes a 2 años) y neonatos (desde el nacimiento hasta 1 mes) es de 1 ml, 4 veces al día. La suspensión debe tomarse preferiblemente después de las comidas y mantenerse en la boca el mayor tiempo posible antes de tragar. Para los lactantes, la suspensión puede administrarse en gotas o diluida con un poco de agua y cepillada en la boca.

Infeción fúngica del intestino: La dosis recomendada para adultos es de 5 ml 3 veces al día. Trague la suspensión directamente. Para evitar que la infección regrese, debe continuar su tratamiento durante 2-3 días después de que todos los signos de infección hayan desaparecido.

Uso en niños y lactantes

La dosis recomendada para niños (mayores de 2 años) y lactantes (de 1 mes a 2 años) es de 1 ml, 4 veces al día. Trague la suspensión directamente. Para evitar que la infección regrese, debe continuar el tratamiento durante 2-3 días después de que todos los signos de infección hayan desaparecido.

Si usa más Nystatin Orifarm de lo que debería

Si ha usado demasiado o un niño ha tomado el medicamento por error, contacte a su médico o unidad de emergencia para evaluar el riesgo y recibir consejo.

Si olvida usar Nystatin Orifarm

No tome una dosis doble para compensar una dosis olvidada.

Si tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede causar efectos secundarios, aunque no todas las personas los sufran.

Deje de tomar Nystatin Orifarm y comuníquese con su médico de inmediato si desarrolla alguno de estos síntomas:

Cambios graves en la piel y las mucosas (llamado síndrome de Stevens-Johnson).

Este es un efecto secundario raro y puede afectar hasta a 1 de cada 1000 personas.

Reacciones de hipersensibilidad e hinchazón local de la piel (angioedema), una reacción en la que la cara y el cuello pueden hincharse considerablemente.

Las reacciones de hipersensibilidad a este medicamento son efectos secundarios muy raros (pueden afectar hasta a 1 de cada 10,000 personas) o no se conocen (frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles).

Una erupción roja, escamosa y generalizada con protuberancias bajo la piel y ampollas acompañadas de fiebre. Los síntomas suelen aparecer al inicio del tratamiento (pustulosis exantemática aguda generalizada). La frecuencia no puede no puede Poco común: puede afectar hasta a 1 de cada 100 personas

Reacciones alérgicas en la piel.

Dosis altas pueden causar malestar estomacal como náuseas, vómitos y

diarrea ..

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto secundario, hable con su médico, farmacéutico o enfermero.

Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este prospecto. También puede informar efectos secundarios directamente a través del sistema nacional de notificación mencionado en el Apéndice V. Al informar sobre efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Cómo almacenar Nystatin Orifarm

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Botella sin abrir: Conservar por debajo de 25°C.

Botella abierta: Conservar por debajo de 25°C por hasta 2 meses.

No use este medicamento después de la fecha de caducidad que se indica en la etiqueta después de EXP. La fecha de caducidad se refiere al último día de ese mes.

No tire los medicamentos por el desagüe ni los deseche con los residuos domésticos. Pregunte a su farmacéutico cómo desechar los medicamentos que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase y otra información

Qué contiene Nystatin Orifarm contiene

- La sustancia activa es nistatina. 1 ml de suspensión contiene 100,000 Unidades Internacionales (UI) de nistatina.
 - El otros ingredientes son:
 - xilitol
 - carmelosa sodio
 - metil parahidroxibenzoato (E218)
 - aceite de menta
 - agua purificada
 - hidróxido de sodio (para ajuste de pH) ácido clorhídrico (para ajuste de pH).
- La suspensión oral está endulzada con xilitol.

Qué es Nystatin

Orifarm Orifarm Nystatin

Orifarm Orifarm la suspensión oral es amarilla y de menta saborizada y se presenta en frascos de vidrio ámbar de 100 ml.

Comercialización Titular de la autorización y Fabricante
[A completar a nivel nacional]

Este producto medicinal está autorizado en los Estados Miembros del EEE bajo los siguientes nombres:

Suecia, Islandia, Finlandia, Dinamarca y Noruega: Nystatin Orifarm

Este prospecto fue revisado por última vez el 2025-04-16