

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Nüstatiin Orifarm 100000 RÜ/ml suukaudne suspensioon

nüstatiin

Lugege see infoleht hoolikalt läbi enne, kui hakkate sedaravimit võtma, sest see sisaldab teile olulist teavet.

- Hoidke see infoleht alles. Teil võib olla vaja seda uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või õega.
- See ravim on määratud ainult teile. Ärge andke seda teistele. See võib neid kahjustada, isegi kui nende haigusnähud on samad mis teil.
- Kui teil tekivad kõrvaltoimed, rääkige oma arsti, apteekri või õega. See hõlmab kõiki võimalikke kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole loetletud. Vt lõik 4.

Mis on selles infolehes

1. Mis on Nüstatiin Orifarm ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Nüstatiini võtmist Orifarm
3. Kuidas Nystatini võtta Orifarm
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Nystatini säilitada Orifarm
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on Nystatin Orifarm ja milleks seda kasutatakse

Nystatin Orifarm kuulub seenevastaste ravimite rühma. See sisaldab toimeainena nüstatiini. Sellel on lokaalne toime limaskestale ja see ei imendu organismi.

Nystatin Orifarm kasutatakse suu ja soolte seeninfektsioonide raviks.

2. Mida on vaja teada enne Nystatini võtmist Orifarm

Ärge võtke Nystatini Orifarm

- kui olete allergiline nüstatiini või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arsti, apteekri või õega enne Nystatini Orifarm

Muud ravimid ja Nystatin Orifarm

Öelge oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või võite võtta mingeid muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui olete rase või toidate last rinnaga, arvate, et võite olla rase või plaanite last saada, küsige enne selle ravimi võtmist nõu oma arstilt või apteekrilt.

Rasedus

Te peaksite seda ravimit võtma ainult siis, kui teie arst leiab, et kasu teile kaalub üles potentsiaalse riski lootele.

Ei ole teada, kas

Nystatin Nüstatiin Orifarm eritub rinnapiima. Konsulterige oma arstiga enne rinnaga toitmist selle ravimi võtmise ajal.

Autojuhtimine ja masinate kasutamine

Sellel ravimil ei ole teadaolevat mõju autojuhtimise või masinate käsitlemise võimele.

Nüstatiin Orifarm sisaldab sisaldab metüül parahüdroksübensoaat ja naatrium Metüül parahüdroksübensoaat võib põhjustada allergilisi reaktsioone (võimalik, et hilinevad).

See ravimpreparaat sisaldab 1,2 mg naatriumi ml suukaudse suspensiooni kohta, mis on vähem kui 23 mg annuse kohta, st sisuliselt „naatriumivaba“.

3. Kuidas võtta Nüstatiini Orifarm

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile öelnud. Kui te ei ole kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst või hambaarst määrab annuse ja see on individualiseeritud teile.

Pudelit tuleb enne kasutamist korralikult loksutada.

Seennakkus suuõõnes: Soovitatav annus täiskasvanutele on 1 ml, 4 korda päevas. Võtke suspensioon eelistatavalt pärast sööki ja hoidke seda suus nii kaua kui võimalik enne allaneelamist.

Kasutamine lastel, imikutel ja vastsündinutel

Soovitatav annus lastele (üle 2 aasta vanused), imikutele (1 kuu kuni 2 aastat vanad) ja vastsündinutele (sünnist kuni 1 kuu vanad) on 1 ml, 4 korda päevas. Suspensiooni tuleks eelistatavalt võtta pärast sööki ja hoida suus nii kaua kui võimalik enne allaneelamist. Imikutele võib suspensiooni manustada tilkadena või lahjendada vähese veega ja kanda suhu.

Seennakkus soolestikus: Soovitatav annus täiskasvanutele on 5 ml 3 korda päevas. Neelake suspensioon otse alla. Et vältida nakkuse tagasitulekut, peaksite jätkama ravi 2-3 päeva pärast kõigi nakkuse tunnuste kadumist.

Kasutamine lastel ja imikutel

Soovitatav annus lastele (üle 2 aasta vanused) ja imikutele (1 kuu kuni 2 aastat vanad) on 1 ml, 4 korda päevas. Neelake suspensioon otse alla. Et vältida nakkuse tagasitulekut, peaksite jätkama ravi 2-3 päeva pärast kõigi nakkuse tunnuste kadumist.

Kui kasutate rohkem Nystatini Orifarm kui peaksite

Kui olete kasutanud liiga palju või laps on ravimit kogemata võtnud, võtke ühendust oma arsti või erakorralise meditsiini osakonnaga, et hinnata riski ja saada nõu.

Kui unustate Nystatini kasutada Orifarm

Ärge võtke kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha.

Kui teil on selle ravimi kasutamise kohta lisaküsimusi, küsige oma arstilt, apteekrilt või õelt.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Nystatini võtmine Orifarm ja teavitage oma arsti kohe, kui teil tekivad mõni neist sümptomitest:

Tõsised naha ja limaskestade muutused (nn Stevensi-Johnsoni sündroom).

See on harv kõrvaltoime ja võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st.

Ülitundlikkusreaktsioonid ja kohalik naha turse (angioödeem), reaktsioon, mille korral nägu ja kael võivad märkimisväärselt paisuda.

Ülitundlikkusreaktsioonid sellest ravimist on väga harvad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st) või teadmata (sagedus ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal).

Punane, ketendav laialdane lööve koos nahaaluste punnide ja villidega, millega kaasneb palavik. Sümptomid ilmnevad tavaliselt ravi alustamisel (äge üldine eksanteemne pustuloos). Sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal.

Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st

Allergilised nahareaktsioonid.

Suured annused võivad põhjustada maoärritust, nagu iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.

Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekib mingeid kõrvaltoimeid, rääkige oma arsti, apteekri või õega. See hõlmab kõiki võimalikke kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole loetletud. Samuti saate kõrvaltoimetest teatada otse riikliku teavitussüsteemi kaudu, mis on loetletud lisa V. Kõrvaltoimetest teatamine aitab anda rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas Nystatin Orifarmi

säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Avamata pudel: Hoida temperatuuril alla 25°C.

Avatud pudel: Hoida temperatuuril alla 25°C kuni 2 kuud.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil pärast EXP.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Pakendi sisu ja muu teave Mida Nystatin Orifarm

- Toimeaine on nüstatin. 1 ml suspensiooni sisaldab 100 000 rahvusvahelist ühikut (RÜ) nüstatini.
- Toimeaine on nüstatin. 1 ml suspensiooni sisaldab 100 000 rahvusvahelist ühikut (RÜ) nüstatini. teised koostisosad on:
 - ksülitool
 - karmelloos naatrium
 - metüül parahüdroksbensoaat (E218)

piparmündiõli
puhastatud vesipuhastatud vesi
naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)naatriumhüdroksiid (pH
reguleerimiseks)
vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks).

Suukaudne suspensioon on magustatud ksülitooliga.

Milline Nystatin Orifarm välja näeb ja pakendi sisu
Nystatin Orifarm suukaudne suspensioon on kollane ja piparmündi maitseline ja on saadaval
100 ml merevaiguklaasist pudelites.

Turustamise Lubaomanik ja tootja [Täidetakse riiklikult]
See ravimpreparaat on

luba saanud volitatud Rootsi, Island, Soome, Taani ja Norra: Nystatin Orifarm
Seda infolehte uuendati viimati 2025-04-16 1

Seda infolehte uuendati viimati 2025-04-16