

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Nystatin Orifarm 100000 IU/ml oraalisuspensio

nystatiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämänlääkkeen käytön, koska se sisältää tärkeää tietoa sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle. Älä anna sitä muille. Se voi vahingoittaa heitä, vaikka heidän sairautensa oireet olisivat samat kuin sinulla.
- Jos saat haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Katso kohta 4.

Mitä tämä pakkausseloste sisältää

1. Mitä Nystatin Orifarm on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Nystatin Orifarm
3. Kuinka ottaa Nystatin Orifarm
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Kuinka säilyttää Nystatin Orifarm
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Nystatin Orifarm on ja mihin sitä käytetään

Nystatin Orifarm kuuluu sienilääkkeiden ryhmään. Se sisältää vaikuttavana aineena nystatiinia. Sillä on paikallinen vaikutus limakalvoon eikä se imeydy elimistöön.

Nystatin Orifarm käytetään suun ja suoliston sienitulehdusten hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Nystatin Orifarm

Älä ota Nystatin Orifarm

- jos olet allerginen nystatiinille tai jollekin tämän lääkkeen muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärisi, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Nystatin Orifarm

Muut lääkkeet ja Nystatin Orifarm

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Sinun tulisi ottaa tätä lääkettä vain, jos lääkärisi katsoo, että hyödyt sinulle ovat suuremmat kuin mahdollinen riski sikiölle.

Ei tiedetä, erittyykö

Nystatin rintamaitoon. Orifarm erittyy rintamaitoon. Keskustele lääkärisi kanssa ennen imettämistä tämän lääkkeen käytön aikana.

Ajoneuvojen ja koneiden käyttö

Tällä lääkkeellä ei ole tunnettuja vaikutuksia ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Nystatin Orifarm sisältää sisäisesti metyyli parahydroksibentsoaatti ja natriummetyyli parahydroksibentsoaatti voi aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä). Tämä lääkevalmiste sisältää 1,2 mg natriumia per ml oraalisuspensiota, mikä on vähemmän kuin 23 mg per annos, eli käytännössä "natriumiton".

3. Kuinka ottaa Nystatin Orifarm

Ota tätä lääkettä aina juuri siten kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista lääkäritäsi tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkärisi tai hammaslääkärisi päättää annoksen, ja se on yksilöllinen sinulle.

Pulloa tulee ravistaa hyvin ennen käyttöä.

Suun sieni-infektio: Suositeltu annos aikuisille on 1 ml, 4 kertaa päivässä. Ota suspensio mieluiten aterioiden jälkeen ja pidä sitä suussa mahdollisimman pitkään ennen nielemistä.

Käyttö lapsilla, imeväisillä ja vastasyntyneillä

Suosittelun annos lapsille (yli 2-vuotiaille), imeväisille (1 kuukaudesta 2 vuoteen) ja vastasyntyneille (syntymästä 1 kuukauteen) on 1 ml, 4 kertaa päivässä. Suspensio tulisi ottaa mieluiten aterioiden jälkeen ja pitää suussa mahdollisimman pitkään ennen nielemistä. Imeväisille suspensio voidaan antaa tippoina tai laimentaa hieman vedellä ja sivellä suuhun.

Suoliston sieni-infektio: Suositeltu annos aikuisille on 5 ml 3 kertaa päivässä. Niele suspensio suoraan. Jotta infektio ei palaisi, hoitoa tulisi jatkaa 2-3 päivää sen jälkeen, kun kaikki infektion merkit ovat hävinneet.

Käyttö lapsilla ja imeväisillä

Suosittelun annos lapsille (yli 2-vuotiaille) ja imeväisille (1 kuukaudesta 2 vuoteen) on 1 ml, 4 kertaa päivässä. Niele suspensio suoraan. Jotta infektio ei palaisi, hoitoa tulisi jatkaa 2-3 päivää sen jälkeen, kun kaikki infektion merkit ovat hävinneet.

Jos käytät enemmän Nystatin Orifarm kuin sinun pitäisi

Jos olet käyttänyt liikaa tai lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota yhteyttä lääkäriin tai päivystykseen riskin arvioimiseksi ja neuvojen saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Nystatin Orifarm

Älä ota kaksinkertaista annosta unohtuneen annoksen korvaamiseksi.

Jos sinulla on kysyttävää tämän lääkkeen käytöstä, kysy lääkäriltäsi, apteekista tai sairaanhoitajalta.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämä lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia, vaikkakaan kaikki eivät niitä saa.

Lopeta Nystatin käyttö Orifarm ja kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulle kehittyy jokin näistä oireista:

Vakavat iho- ja limakalvomuutokset (ns. Stevens-Johnsonin oireyhtymä).

Tämä on harvinainen sivuvaikutus ja saattaa vaikuttaa enintään 1:een 1000:sta henkilöstä.

Yliherkkyysoireet ja paikallinen ihon turvotus (angioedeema), reaktio, jossa kasvot ja kaula voivat turvota huomattavasti.

Yliherkkyysoireet tästä lääkkeestä ovat erittäin harvinaisia sivuvaikutuksia (saattaa vaikuttaa enintään 1:een 10 000:sta henkilöstä) tai tuntemattomia (yleisyys ei voida arvioida saatavilla olevien tietojen perusteella).

Punainen, hilseilevä laajalle levinnyt ihottuma, jossa on ihon alla kyhmyjä ja rakkuloita, johon liittyy kuumetta. Oireet ilmenevät yleensä hoidon alussa (akuutti yleistynyt eksanteeminen pustuloosi). Yleisyys ei voida arvioida saatavilla olevien tietojen perusteella.

Harvinainen: saattaa vaikuttaa enintään 1:een 100:sta henkilöstä
Allergiset ihoreaktiot.

Suuret annokset voivat aiheuttaa vatsavaivoja, kuten pahoinvointia, oksentelua ja ripulia.

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos saat haittavaikutuksia, keskustele lääkärisi, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan kansallisen raportointijärjestelmän kautta, joka on lueteltu liitteessä V. Haittavaikutuksista ilmoittamalla voit auttaa antamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

5. Nystatin Orifarm

Säilytä tämä lääke lasten ulottumattomissa ja näkyvissä.

Avaamaton pullo: Säilytä alle 25 °C.

Avattu pullo: Säilytä alle 25 °C enintään 2 kuukautta.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on merkitty etikettiin merkinnän EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä viittaa kuukauden viimeiseen päivään.

Älä hävitä lääkkeitä viemäriin tai talousjätteisiin. Kysy apteekista, miten hävittää lääkkeet, joita et enää käytä. Nämä toimenpiteet auttavat suojelemaan ympäristöä.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nystatin Orifarm sisältää

- Vaikuttava aine on nystatiini. 1 ml suspensiota sisältää 100 000 kansainvälistä yksikköä (IU) nystatiinia.
- The muut aineet ovat:
 - ksylitoli
 - karmelloosi natrium
 - metyyli parahydroksibentsoatti (E218)
 - piparminttuöljy
 - puhdistettu vesipuhdistettu vesi
 - natriumhydroksidi (pH:n säätöön)natriumhydroksidi (pH:n säätöön)
 - suolahappo (pH:n säätöön).

Oraalisuspensio on makeutettu ksylitolilla.

Miltä Nystatin Orifarm näyttää ja pakkauksen sisältö

Nystatin Orifarm oraalisuspensio on keltainen ja mintun makuinen ja se toimitetaan 100 ml:n meripihkanvärisissä lasipulloissa.

Markkinointi Lupahaltija ja valmistaja [Täytetään kansallisesti]

Tämä lääkevalmiste on

hyväksytty Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa seuraavilla nimillä: Ruotsi, Islanti, Suomi,

Tanska ja Norja: Nystatin

Orifarm Orifarm

Tätä esitettä on viimeksi tarkistettu 2025-04-16